


insert






S. H.

24.161/1





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29332096_0002

AGROSTOLOGIA
HELVETICA.

~~~~~  
II.  
~~~~~



AGROSTOLOGIA HELVETICA,

DEFINITIONEM DESCRIPTIONEMQUE
GRAMINUM ET PLANTARUM EIS
AFFINIUM IN HELVETIA SPONTE
NASCENTIUM COMPLECTENS.

AUCTORE J. GAUDIN;

ECCLÆSIÆ Germanicæ Nevidunensis Pastore,
Societatis æmulationis Pagi Vaudensis, Societatis
botanicæ Altenburgensis, etc. socio.

~~~~~  
TOMUS SECUNDUS.  
~~~~~

PARISIIS,

Apud J. J. PASCHOUD, Bibliopōlam,
Via dicta Augustinorum-Minorum; n.º 5.

GENEVÆ,

EX TYPIS J. J. PASCHOUD.

1811.



AGROSTOLOGIA

HELVETICA.

ORDO II. CYPERACEÆ.

G. 37. SCHÆNUS. L.

Cal. Glumæ fasciculato-congestæ; exteriores steriles (quandoque bracteiformes). Cor. 0. Semen nudum vel villis cinctum. (In Sp. 2. Drupa sicca). Flores hermaphroditi.

Analysis.

- | | |
|--|--|
| Folia plana, sesquilineam lata, vel ultra. — 1. | Folia semiteretia vel canaliculata, vix lineam diuudiam lata. — 4. |
| 1. Spica composita, compressa, disticha. Folia margine læviscula. — 2. | Flores corymbosi. Folia margine scaberrima, secantia. — 3. |
| 2. SCHÆNUS <i>compressus</i> . Sp. 1. | |
| 3. SCHÆNUS <i>Mariscus</i> . S. 2. | |
| 4. Culmi superne bifidi. Capitula plerumque bina, alba, vel subfusca. — 5. | Culmi simplicissimi. Capitulum unicum, nigricans. — 8. |
| 5. Capitulum album, demum subfuscum, folium florale fere æquans. — 6. | Capitulum semper subfuscum, folio florali multo brevius. — 7. |
| 6. SCHÆNUS <i>albus</i> . Sp. 3. | |
| 7. SCHÆNUS <i>fuscus</i> . Sp. 4. | |
| 8. Capitulum ovatum, obesum, ex pluribus spiculis constans. — 9. | Capitulum oblongum, gracile. Spiculæ paucissimæ. — 10. |
| 9. SCHÆNUS <i>nigricans</i> . Sp. 5. | |
| 10. SCHÆNUS <i>ferrugineus</i> . Sp. 6. | |

1. *SCHÆNUS compressus* L. — Sch. culmo teretiusculo, spica composita disticho-compressa, foliis planis. N. (Gall. *Choin comprimé*.)

Mariscus Hall. *helv.* 1342. *Scheuchz. Gram.* 490.

Sch. compressus. *Sut. Fl. helv.* 1. p. 22.

~~~~~

Sch. compressus. *L. Sp. pl.* 65. *Smith brit.* 44. *Vill.*

*delph.* 2. p. 186. *Lam. Enc. meth.* 1. p. 741.

*Carex uliginosa* L. *Sp. pl.* 1381. (auctore Cl. SMITHIO.)

*Scirpus Caricis* Willd. *Sp. pl.* 1. p. 292. *Decand.*

*Fl. fr.* 1781.

*Scirpus compressus* Pers. *syn.* 1. p. 66.

*Scirpus caricinus* Schrad. *germ.* 1. p. 132.

~~~~~

Sch. compressus *Leers herb.* 9. tab. 1. fig. 1. *Krock.*

siles. 1. p. 59. tab. 9. *Scirpus Caricis* Host *Gram.*

austr. 3. tab. 57.

~~~~~

Sch. compressus *Thom. l. c.* p. 14. *Scirpus caricinus*

*Schleich. l. c.* p. 23.

RADIX (pace SMITHII) repens et stolonifera.

CULMI teretiusculi, superne tantum obsolete trigoni, basi foliosi, glabri, læves, semipediales et ultra, erecti.

FOLIA ad sesquilineam lata, plana, sed canaliculata nec carinata, utrinque lævia, margine vix scabriuscula. *Vaginæ* breves, sese invicem tegentes. *Ligula* truncato-arcuata, brevissima.

SPICA erecta, nitida, ex fusco et flavescenti variegata, composita, compressa, disticha, ad 9 lineas longa. *Bractea* communis basi ovata vel subrotunda,



apice et margine scariosa, desinens in foliolum viride, angustum, scabrum, canaliculatum, spicam sæpius superans.

SPICÆ *partiales* numerosæ, contiguæ, alternæ, sessiles, ellipticæ, nitidæ, *rachi* flexuosæ et lævi insidentes, compositæ, ad basin *bractea* plerumque sterili, reliquis glumis simili, sed majore stipatæ: juniores valde compressæ, distichæque.

SPICULÆ oblongæ, multifloræ, acutiusculæ.

GLUMÆ congestæ nec inubricatæ, concavæ, carinatae, fuscae, carina viridi vel flavescenti, apice et margine scariosæ et sordide albidæ: infima plerumque sterilis.

SEMEN ovatum, compressum, basi setis paucis\*) stamina fere æquantibus glumaque longioribus cinctum. (D, v.)

In locis uliginosis. *Bernæ* in insula *Hunzickerau*. *A Noville*. Prope *Crenzach*, *Friedlingen*, *Ferrière*. *Turici*. Prope *Nevidunum* in paludibus circa *Trélez*, *Coinsins*, *Bonmont*, *le bois de Prangins*, etc. Etiam in alpibus, v. g. in *M. Gotthardo*, *Fouly*, cet. — Perennis. Fl. Jun. et Julio.

Obs. Hæc species certe inter *Schœnum* et *Scirpum* ambigit. Commode tamen in nostro genere manere potest.

2. *SCHÆNUS Mariscus* L. — Sch. culmo tereti, foliis carina margineque aculeatis L. (Gall. *Choin Marisque*.)

---

\*) *Setæ* seminales in hac specie et in plerisque ceteris *Cyperaceis* in quibus adsunt, lentis validioris ope facile a staminum filamentis distinguuntur, cum hæc lævissima, illæ autem aculeis minutissimis reflexis exasperatæ sint.

*Mariscus* *Hall. helv.* 1343. *Sut. Fl. helv.* 1. p. 21.  
*Scheuchz. Gram.* 375. tab. 8. fig. 7 — 11.

~~~~~

Sch. *Mariscus* *L. Sp. pl.* 62. *Willd. Sp. pl.* 1.
 p. 259. *Vill. delph.* 2. p. 185. *Smith brit.* 43.
Lam. Enc. méth. 1. p. 739.

Decand. Fl. fr. 1796. *Pers. syn.* 1. p. 58.

~~~~~

*Cladium germanicum* *Schrad. germ.* 1. p. 75. tab. 5.  
 fig. 7.

~~~~~

Schoenus Mariscus *Thom. l. c.* p. 14. *Schleich. l. c.*
 p. 23.

RADIX repens, lignosa.

CULMI fistulosi, ad vaginarum ortum tumidi et quasi nodosi (quod huic speciei proprium), teretes, foliosi, superne ramosi, 5-5-pedales.

FOLIA arida, firma, longissima, plana, lineari-lanceolata, superne longe triquetra, inferne 5-4 lineas lata, marginibus et carina asperrime aculeata et secantia. *Vaginæ* breves, lævissimæ. *Ligula* nulla.

CORYMBI numerosi, plerumque gemini, axillares et terminales, *pedunculis* communibus compressis, lævibus, ad angulos vix scabrinsculis, longis, inæqualibus, erectis insidentes. *Bractea* communis una alterave e basi ovata in acumen viride vel spadiceum, corymbo modo longius, modo brevius producta. *Pedicelli* breves, inæquales.

SPICULÆ cinnamomeæ, nitentes, bifloræ, ovato-acute, congestæ, numerosæ, in pedicellis terminales, demum tumidiusculæ,

GLUMÆ totæ coloratæ, ovatæ, obtusiusculæ, nervo dorsali parum conspicuo, excurrente, numerosæ: inferiores parvæ, inanes.

DRUPA ossea, spiculam superans, ovato-acuta, obsolete trigona, rufa, nitida, *putamine* fragili, extrinsecus duro, intus pulposo-farinaceo, tenui. *Nux* ossea, elliptica, obsolete 4-sulca, nigra, absque nitore, superne drupam non implens. *Nucleus* albus, ovato-acutus.

STIGMATA duo, tria et rarius quatuor. (D. v.)

In paludibus passim. Ad lacum *Felinum*. Inter *Vervey* et le *Furet* prope *Roche*. Ad lacum *Neocomensem* versus *Granson*. In agro *Nevidunensi* circa *Coinsins*, *Duilliers* et *Clarens*, cet. — Perennis. Fl. Julio et Aug.

Obs. Cf. que de hac planta in nostra præfatione diximus. — Germen alterutrum in omnibus quas vidimus spiculis abortit. Persistit tamen et inter squamas sollicite quæsitum reperitur.

5. *SCHÆNUS albus* L. — Sch. culmis trigonis, divisis, foliis carinatis angustissimis, floribus fasciculatis, radice fibrosa. N. (Gall. *Choin blanc*.)

Scirpus Hall. *helv.* 1341. *Scheuchz. Gram.* 503. Sch. albus *Sut. Fl. helv.* 1. p. 22.



Sch. albus L. *Sp. pl.* 65. Willd. *Sp. pl.* 1. p. 267. *Smith brit.* 46. *Lam. Enc. méth.* 1. p. 741. *Pers. syn.* 59. *Decand. Fl. fr.* 1794. *Schrad. germ.* 1. p. 111.



Fl. dan. tab. 320. *Schkuhr Handb.* tab. 7. *Krock. Fl. siles.* 1. p. 60. tab. 10 (*mediocris*).



Ehrh. Gram. exs. Dec. 1. n.º 1. Schleich. l. c. p. 23.
Thom. l. c. p. 14.

RADIX fibrosa (nequaquam repens), fibris capillaribus, albis, multiceps.

CULMI fasciculati, cespitosi, erecti, foliosi, superne divisi, obtusiusculi, trigoni, ad angulos superne scabriusculi, infra vaginas tumidiusculi, graciles, trientales vel pedales.

FOLIA vix lineam integram lata, culmis breviora, plano-carinata, margine scabriuscula, erecta. *Vaginae* triquetrae, laeves, albidæ. *Ligula* truncata, subnulla.

RAMI floriferi plerumque duo, erecti, graciles: inferior axillaris, brevior: superior terminalis est prolongatio culmi.

SPICULÆ quasi in corymbum dispositæ, fasciculatæ, breviter pedicellatæ, terminales in culmo et ramulo, erectæ, oblongæ, acutæ, albidæ, demum subfuscae. *Folium* florale fasciculi inferioris spiculis plerumque multo longius, in terminali corymbo paulo longius vel sæpe etiam brevius. *Bractea* partiales ad basin spicularum breves, lineares, virides.

GLUMÆ semipellucidæ, ovatæ, concaviusculæ, acutæ, uninerviæ, nervo valido sæpius in mucronulum producto. Exteriores ceteris multo minores, steriles.

SEMEN albidum, lenticulare, rostratum, hinc convexum, inde complanatum, setis numerosis (optime monente SCHEUCHZERO), fere dens, gluma paulo brevioribus cinctum. (D. v.)

Hab in uliginosis, torfaccis, non ubique. Circa *Seedorf im Lôhr*, prope *Fervey*, à la *Brevine*. Trans Alpes inter *Ponte di Tresa et Luino*. — Perennis. Fl. Jul. et Aug.

Obs. « Stigmata stylo breviora. » SCHRAD. l. c. Numerum stigmatum Vir Cl. non designat, nec nobis contigit ea videre. Plantæ nostræ KROCKERUS 2, multo autem accuratior SCHUMER 3 stigmata tribuit. V. ejus iconem laudatam.

4. *SCHÆNUS fuscus*. L — Sch. culmo teretiusculo diviso, foliis canaliculatis setaceis, spiculis fasciculatis, radice repente. N. (Gall. *Choin brun.*)

Sch. fuscus. *Sut. Fl. helv.* 1. p. 22.

~~~~~  
L. *Sp. pl.* 1664. Willd. *Sp. pl.* 1. p. 262. Lam. *Enc. méth.* 1. p. 739. Pers. *syn.* 1. p. 58. Decand. *Fl. fr.* 1795. Schrad. *germ.* 1. p. 110.

~~~~~  
Schleich. l. c. p. 23. Thom. l. c. p. 14.

RADIX dura, repens, culmos per intervalla singulos spargens.

CULMI solitarii, pæne nudi, basi nempe tantum (exceptis foliis floralibus) foliosi, teretiusculi, infra fasciculum terminalem convexo-plani, ceterum fere ut in *albo*.

FOLIA duplo angustiora, setacea, canaliculata, nonnisi superne asperiuscula. *Vaginæ* teretes. *Ligula* nulla.

SPICULÆ, fere ut prioris, in *ramulo* axillari et in culmo terminales, sed vix corymbosæ, et potius in spicas compositas, subcapitatas et breviter pedicellatas dispositæ, in quavis spica numerosæ, imbricato-congestæ, exacte sissiles, semper subfuscæ, oblongæ,

acutæ. *Folium* florale supremum fasciculo multo longius, erectum, ceteris foliis sæpe latius.

GLUME fuscæ, ovatæ, valde concavæ, ad oras anguste scariosæ, sæpe etiam mucronatæ.

SEMEN subrotundum, utrinque valde convexum, nitidum, longe rostratum, setis fere ut in priori cinctum. (D. v.)

In uliginosis *Helvetiæ insubricæ* promiscue cum *Sch. albo*. Circa *Locarnum* et in *M. Cenere*. SCHLEICHER. Inter *P'Osteria della Madonna del Piano et Luino*.—Perennis. Fl. Junio et Julio.


Obs. « Stigmata 2 stylo longiora. » SCHRADER. Optime. Species priori utique affinis, ab ea tamen certissime distincta. Cum *Sch. albo* in paludibus inter *Ponte di Tresa et Luino* invento magnæque cura comparato, nullus dubio quin *Sch. fuscus* veram et geminam speciem constituat.

5. *SCHÆNUS nigricans* L. — Sch. culmo subnudo tereti, capitulo ovato, spiculis numerosis, involucrio diphylo. N. (Gall. *Choin noirâtre*.)

Cyperus Hall. helv. 1347. *Scheuchz. Gram.* 349. tab. 7. fig. 12—14. *Sch. nigricans Sut. Fl. helv.* 1. p. 21.



Sch. nigricans L. Sp. pl. 64. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 261. *Smith brit.* 43. *Lam. Enc. méth.* 1. p. 739. *Vill. delph.* 2. p. 185. *Pers. syn.* 1. p. 58. *Decand. Fl. fr.* 1792.



Lam. illustr. n.º 626. tab. 38. fig. 1. (Ex *Candolliæ*).



Ehrh. Gram. exs. Dec. 11. n.º 101. *Schleich. l. c.* p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX fibrosa, multiceps.

FOLIA omnia radicalia, cespitosa, sese invicem et culmorum basin vaginis amplexantia, setacea, rigida, hinc convexa, inde plana, margine superne scabriuscula, culmis breviora. *Vaginæ* foliis multo latiores, usque ad basin fissæ, subcompressæ, nigricantes, nitidæ, firmæ, margine subscarioso albidoque. *Ligula* brevissima.

CULMI versus basin foliis tecti, ceterum nudi, teretes, læves, simplicissimi, apice incrassati, erecti, semipedales et pedales.

CAPITULUM terminale, ovatum, obesum, nigricans, spiculis numerosis constans. *Involucrum* diphyllum : *bractea inferior* late ovata, concava, amplexicaulis, nigricans, spiculas amplexans, apice emarginata, cartilaginea, nitida, nervosa, opaca, carinata, nervo dorsali in mucronem viridem, subulatum, capitulo plerumque multo longiorem producto; *superior* minor, ceterum priori consimilis, mucrone tamen nullo vel multo breviori.

SPICULÆ congestæ, subpedicellatæ, ovato-oblongæ, acutæ, ex nigro et fusco variæ, nitidæ.

GLUMÆ ovato-lanceolatæ, concavæ, acutæ, carina scabriusculæ, margine et basi pallidiores : *exteriores* 4-5 steriles, minores; *interiores* paucæ, fertiles.

SEMEN nitidum, albidum, ex triquetro subrotundum, selis paucis, adpressis, brevissimis, vix conspicuis, sæpe etiam deficientibus cinctum. *Stigmata* tria. (D. v.)

In paludibus spongiosis totius *Helvetiæ* frequens, — Perennis;
Fl. Majo et Junio.

6. *SCHÆNUS ferrugineus*. L. — Sch. culmo tereti nudo, capitulo lineari-elliptico subdistachyo, involuero subdiphyлло capitulum æquante. N. (Gall. *Choin ferrugineux*.)

Sch. ferrugineus *Hall. fl. in Rôm. Arch.* tom. 1.
fasc. 1. et sqq. n° 35. Sut. Fl. helv. 1. p. 27.

~~~~~

L. *Sp. pl.* 64. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 361. *Pers. syn.*  
1. p. 58. *Vill. delph.* 2. p. 186. *Decand. Fl. fr.*  
1793.

~~~~~

Schrad. germ. 1. p. 115. tab. 1. fig. 4.

~~~~~

*Schleich. l. c.* p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

Priori similis. FOLIA tenuiora, setacea, hinc convexa, inde canaliculata, brevissima, tota lævia. *Vaginæ* minus cartilagineæ, apice emarginatæ, laciniis obtusis, fuscis.

CULMI graciles, basi squamis vaginisque tecti, ceterum nudi, 4-6-12 uncias longi.

CAPITULUM nigricans, gracile, elliptico-lineare, acutum, ex spiculis distinctis 2 vel rarius 3 constans. *Bractea* ad basin spiculæ infimæ glumis major, ovato-lanceolata, subquinenervia, dorso lævi, apice breviter bifida, capitulo plerumque multo brevior: nervus dorsalis in mucronem capitulum fere æquantem, viridem, apice fuscum productus. *Bractea* ad basin spiculæ superioris priori similis, eidem modo æqualis, modo autem minor, mucrone

semper multo brevior, fusco, parum conspicuo ut *incolucrum* commune monophyllum esse videatur.

SPICULÆ pedicellatæ, ellipticæ, acutæ.

GLUMÆ inferiores inanes, reliquis multo minores: fertiles pauciores, lanceolatæ, concavæ, margine anguste scarioso, albido.

SEMEN minutum, albidum, trigono-ovatum; setæ seminales, ternæ, adpressæ, semen æquantes, parum conspicuæ. *Antheræ* mucronatæ; *stigmata* tria. (D. v.)

In paludibus torfaceis. Primus omnium in Helvetia detexit ampliss. HALLERUS filius circa *Seedorf*. Prope *Vervey*. SCHLEICHER et THOMAS. In paludibus *Juranis*. Cl. CHAILLET. Circa *Nevidunum* haud infrequens. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

## G. 58. SCIRPUS. L.

*Cal.* Glumæ undique imbricatæ, plerumque omnes fertiles. *Cor.* o. *Semen* nudum vel setis brevibus cinctum.

### *Analysis.*

Spica unica. — 1.

Spicæ una plures. — 12.

1. Spica pauciflora, vix unquam 10-flora. — 2.

Spica glumis decem pluribus constans. — 9.

2. Culmi capillares, exacte teragoni, vix biunciales. — 3.

Culmi filiformes vel crassi, teretes, striati, plerumque multo altiores. — 4.

3. SCIRPUS *acicularis*. Sp. 1.

4. Vaginæ in foliolum breve productæ. Culmi ad basin squamis numerosis tecti. — 5.

Vaginæ truncatæ, aphyllæ. Culmi ad basin vix squamosi. — 6.

5. SCIRPUS *cespitosus*. Sp. 2.

6. Radix subfibrosa. Glumæ inferiores ceteris majores. — 7. Radix valde repens. Glumæ omnes fere æquales. — 8.
7. *Scirpus Bæothryum*. Sp. 3.
8. *Scirpus palustris* minor. Sp. 4.
9. Culmi valde cespitosi; spicæ ovata; radix fibrosa. — 10. Spicæ oblongæ; radix valde repens. — 11.
10. *Scirpus ovatus*. Sp. 5.
11. *Scirpus palustris*. Sp. 4.
12. Culmi teretes. — 13. Culmi triquetri. — 20.
13. Paniculæ terminales; culmi validi, cubitales et altiores. — 14. Spicæ laterales; culmi graciles, vix triantales. — 17.
14. Panicula decomposita. Spiculæ ovata. — 15. Panicula simplex, umbellata. Spiculæ globosæ. — 16.
15. *Scirpus lacustris*. Sp. 6.
16. *Scirpus Holoschoenus*. Sp. 7.
17. Spiculæ paulo infra apicem culmi erumpentes. Semen longitudine striatum. — 18. Spiculæ medio fere culmo incidentes. Semen per lentem transverse rugosum. — 19.
18. *Scirpus setaceus*. Sp. 8.
19. *Scirpus supinus*. Sp. 9.
20. Culmus foliosus. — 21. Culmus nudus vel tantum basifoliosus. — 24.
21. Panicula ramosissima; pedunculi corymbiferi. Spiculæ vix diutiusculæ, vix 2 lineas longæ. — 22. Panicula fere simplex; pedunculi indivisi, 1-5-flori. Spiculæ badiæ, ad 6 lineas longæ. — 23.
22. *Scirpus sylvaticus*. Sp. 10.
23. *Scirpus maritimus*. Sp. 11.
24. Culmus gracilis, humilis, cum foliis inferne pubescens. — 25. Culmus pedalis, cubitalis, glaberrimus. — 26.
25. *Scirpus annuus*. Sp. 12.
26. Stigmata duo. Culmus trigonus, faciebus planis. Vaginæ in folium planum productæ. — 27. Stigmata tria. Culmus triquetus, faciebus subconcavis. Vaginæ apophyllæ, apice rotundatæ. — 28.
27. *Scirpus triquetus*. Sp. 13.
28. *Scirpus mucronatus*. Sp. 14.



## \* Spica unica.

1. *SCIRPUS acicularis* L. — Sc. culmo tetragono vagina aphylla instructo, spica ovata acuta, glumis inferioribus paulo majoribus. Sm. (Gall. *Scirpe épingle*.)

*Mariscus* Hall. *helv.* 1346. *App. ad Scheuchz. Gram.*

39 n.º 2. Sc. *acicularis* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 25.

~~~~~

Sc. *acicularis* L. *Sp. pl.* 71. *Smith brit.* 51. *Poiret Enc.*

méth. 6. p. 752. *Pers. syn.* 1. p. 66. *Vill. delph.*

2. p. 187. *Decand. Fl. fr.* 1784. *Schrad. germ.* 1.

p. 130.

~~~~~

*Host Gram. austr.* 3. tab. 60. *Fl. dan.* tab. 287.

*Sturm. Fl. germ.* 1. *Abth.* 10. *Heft*, tab. 4.

~~~~~

Schleich. l. c. p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX annua, multiceps, fibris tenuissimis.

CULMI tenuissimi, molles, vix 2 uncias longi, per lentem exacte tetragoni, faciebus planis, vix striatis, ad basin vagina brevi, truncata aphyllaque vestiti.

FOLIA nulla, nisi culmos steriles velis, floriferis omnino similes, apice macula fusca notatos, obtusos.

SPICA exigua, ovato-acuta, 4-5-flora, ex viridi purpurascens vel ferruginea, demum nigricans.

GLUMÆ imbricatæ, omnes fertiles: duæ inferiores amplexicaules, dorso virides, carinatæ, obtusæ, apice anguste scariosæ; reliquæ minores, ceterum consimiles.

SEMEN minimum, subtrigonum, apud nos basi nudum nec setis cinctum. *Stigmata* tria. (D. v.)

Ad lacuum stagnorumque oras, in terra argillosa. Prope *Herzogenbuchsee. Aux Granges. A St. Sulpi* prope *Lausannam. Neviduni à l'embouchure du Boiron.* Prope *Spietz* ad lacum *Thunensem*, cet. — Annuæ. Fl. Jun. — Aug.

OBS. *Scirpus* omnium longe minimus. — STURMIUS sæpe 4 setas seminales longas divergentesque observavit ac fig. citata depinxit. Nos autem ut plerique auctores semen semper nudum vidimus. — « Setæ plerumque nullæ. » SCHRADER. l. c.

2. *SCIRPUS cespitosus*. L. — Sc. culmo tereti striato basi multiplici-squamoso, vaginis mucronatis, glumis exterioribus maximis. N. (Gall. *Scirpe gazonnant.*)

Scirpus Hall. helv. 1334. *Scheuchz. Gram.* 363. tab. 7. fig. 18. Sc. *cespitosus Sut. Fl. helv.* 1. p. 31.

~~~~~

Sc. *cespitosus L. Sp. pl.* 71. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 292. *Smith brit.* 49. *Poiret. Enc. méth.* 6. p. 750. *Pers. syn.* 1. p. 66. *Vill. delph.* 2. p. 187. *Decand. Fl. fr.* 1775. *Schrad. germ.* 1. p. 123.

~~~~~

Host Gram. austr. 3. tab. 59. *Sturm Fl. germ.* 1. *Abth.* 10. *Hefst*, tab. 2. *Krock. siles.* 1. p. 67. tab. 14.

~~~~~

*Ehrh. Gram. exs. Dec.* 11. n.º 102. *Schleich. l. c.* p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX fibrosa, valde cespitosa, fibris validis, numerosis, intertextis.

CULMI dense fasciculati, lævissimi, teretes, striati,

fere æquales, duri, rigidi, 2-10 uncias longi, basi vaginati, *vagina* una alterave laxiuscula, tubulosa, apice obliqua et in *foliolum* breve canaliculatum, apice crassinseculo obtuso, producta. *Squamæ* numerosæ, imbricatæ, stramineæ, concavæ, neuti-quam tubulosæ, obtusæ, aphyllæ, culnum infra vaginas undique amplexantes.

FOLIA nulla.

SPICA parva, ovata, brevis, subquinqueflora.

GLUMÆ omnes fertiles; *inferiores* duæ paulum inæquales, ovatæ, rufæ, apice et marginibus scariorse, obtusæ: *major* spicam fere æquans vel superans, 5-5-nervia, in mucronem albidum, crassum, obtusum apiceque callosum desinens.

SEMEN subfuscum, nitidum, obovatum, obsolete trigonum. *Setæ* seminales circiter senæ, semine longiores, lævissimæ! *Stigmata* tria. (D. v.)

In paludibus torfaceis montanis et alpinis. In M. *Fouly*.  
*Au Pont de Martel. A la Chaux du milieu.* In M.  
*Grimsel.* SERINGE. *Aux marais des Rousses*, cet. —  
 Perennis. Fl. Jul. et Aug.

5. *SCIRPUS Bæothryon* L. — Sc. culmo tereti basi vagina aphylla instructo, glumis majoribus spica brevioribus, radice viticulosa. N. (Gall. *Scirpe pauciflore*.)

*Scirpus* Hall. *helv.* 1335. *Scheuchz. Gram.* 364.  
 tab. 7. fig. 19. Sc. *Bæothryon* Sut. *Fl. helv.* 1.  
 p. 25. et Sc. *campestris* *Ejusd.* *ibid.*



Sc. *Bæothryon* *Schrad. germ.* 1. p. 125.

*Sc. pauciflorus* *Smith brit.* 50.

*Sc. Halleri* *Vill. delph.* 2. p. 188.

*Sc. Bæothryon* *Decand. Fl. fr.* 1776. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 293. *Pers. syn.* 1. p. 66. *Poir. Enc. méth.* 6. p. 750.

*Sc. campestris* *Roth catalect. bot.* 1. p. 5 et 2. p. 2. *Decand. Fl. fr.* 1777. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 293. *Pers. syn.* 1. p. 66. *Poir. Enc. méth.* 6. p. 751.

~~~~~

Sc. pauciflorus *Host Gram. austr.* 3. tab. 58?*)

Sc. Bæothryon *Sturm Fl. germ.* 2. *Abth.* 10. *Hefst.* tab. 3.

Sc. Bæothryon *Schleich. l. c.* p. 23. *major et minor.* *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX subfibrosa, viticulis nempe tenuissimis, repentibus paucisque, vix a fibris ceteris distinguendis. Hi viticuli autumnio temporis bulbillos novam eduturos progeniem protrudunt.

CULMI numerosi, teretes, erecti, striati, inæquales, 2-6 uncias longi, basi vagina substriata, tubulosa, aphylla, oblique truncata, inferne apiceque fusca tecti.

FOLIA nulla, nisi culinos steriles dicas.

SPICA florens lanceolata, fructifera rotundato-ovata, inconcinne imbricata, ætate quasi lobata, fusca, brevis, 4-6-flora.

*) Propter radicem nimis repentem quam sistit icon citata dubitamus eam huc pertinere. — *Scirpum* Scheuchz. *Gram.* 366. quem summus HALLERUS in hist. stirp. ad an. 1555. et in app. 1. ad agrostogr. cum dubio tamen ad *Juncum triglumem* retulit, ut pote obscurius descriptum ac depictum, nobisque plane ignotum, omittimus.

GLUMÆ omnes fertiles : duæ *exteriore*s ceteris majores, spica paulo breviores, inter se fere æquales, concavæ, apice scarioso, minime calloso, carina nervosa exstante, dorso duro, fusco, margine late scarioso; *reliquæ* minores teneriores.

SEMEN triquetra-obovatum, crassum, mucronatum, nitidulum; *setæ* subsenæ, senine vix longiores, aculeis reflexis exasperatæ, *Stigmata* tria. (D. v.)

Hab. in palustribus torfaceis et argillosis. *Neviduni* circa *Crens* et *Trélex*. Ad lacum *Felinum*. In villa *Bodenacker*. In insula *Hunzickerau*. In M. *Gotthardo*. In alpibus tum *helveticis*, tum *rhaeticis*. SCHEUCHZER. — Perennis. Fl. Jul. et Aug.

Obs. An vere noster à *Sc. Bæothryo* Ehrh. differat diu dubius hæsi. Nam omnia quæ inveni ac mihi sub hoc nomine missa fuerunt specimina omnino melius cum descriptionibus *Sc. campestris* ROTHII convenire videbantur. Auctore autem Cl. SCHRADERO *Sc.* hic *campestris* nonnisi varietas est minor *Sc. Bæothryi*. SMITHIUS etiam et *Sc. Bæothr.* Ehrh. et *Sc. Schenckiz.* 361. quem ad *campestrum* referunt, absque omni hæsitacione citat. Characteres qui utrique plantæ tribuuntur tam fallaces mihi visi sunt ut eas ne quidem ut veras varietates distinguere valeam.

4. *SCIRPUS palustris* L. — *Sc.* culmo tereti basi vagina aphylla instructo, spica oblonga imbricata, radice repente. N. (Gall. *Scirpe des marais*.)

Scirpus Hall. helv. 1336. *Scheuchz. Gram.* 360.

Sc. palustris Sut. Fl. helv. 1. p. 24.



Scirpus palustris L. Sp. pl. 71. *Willd. Sp. pl.* 70.

Poir. Enc. méth. 6. p. 745. *Pers. syn.* 1. p. 65.

Smith brit. 48. *Will. delph.* 2. p. 187. *Decand. Fl.*
fr. 1773. *Schrad. germ.* 1. p. 127.

~~~~~

*Host Gram. austr.* 5. tab. 55. *Leers herb.* 10. tab. 1.  
*fig.* 3. *Sturm Fl. germ.* 1. *Abth.* 10. *Hest*, tab. 5.

~~~~~

Schleich. l. c. p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

β. Minor, spica ovato-lanceolata, pauciflora.

Scirpus Scheuchz. Gram. 361 *nonnisi spica magis*
multiflora ab ea var. differre videtur.

RADIX horizontalis, repens, stoloniifera.

CULMI inæquales, cespitosi, in aqua crescentes sæpe altissimi, in solo humidiusculo semipedales et trientales, spongioso-medullosi, lævissimi, crassi, non raro compressi (in β. graciles utrique), basi vagina tubulosa, aphylla, inferne colorata, apice fusca, suboblique truncata.

FOLIA nonnisi culmi steriles.

SPICA fusca, quandoque fere cylindrica, sæpius ovato-oblonga, multiflora, concinne imbricata, in var. β ovata, pauciflora.

GLUMÆ omnes fertiles, fere æquales; ima brevis, apice sæpius rotundato, late scarioso; ceteræ modo acutæ, modo obtusæ, fuscæ, marginibus augustis, scariosis, nervo dorsali viridi vel luteolo instructæ.

SEMEN flavum, nitidum, paulo compressum, utrinque convexum, obsolete mucronatum. Setæ adpressæ, paucæ («quaternæ» LEERS, SCHRADER; ægre dinumerari possunt), semine longiores, acutis reflexis exasperatæ. *Stigmata* duo. (D. v.)

α. Ubique in palustribus limosis. β. Locis humidis arenosis, ad oras lacuum. *Tiguri*, *Nevidani* circa *Sadex*, etc. — Perennis. Fl. Majo — Julio.

Obs. Varietas pauciflora similis est *Sc. pauciflora* Host 3, tab. 58. Differt tamen stigmatum numero, ut omnino ab eo diversa sit.

5. *SCIRPUS ovatus* Roth. — *Sc. culmo tereti* basi vagina aphylla instructo, spica ovata, floribus diandris, radice fibrosa. N. (*Gall. Scirpe ovoïde.*)

Sc. ovatus *Sut. Fl. helv.* 1. p. 29.

~~~~~

*Roth catalect.* 1. p. 5. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 294.

*Poir. Enc. méth.* 6. p. 754. *Decand. Fl. fr.* 1774.

*Pers. syn.* 1. p. 66. *Schrad. germ.* 1. p. 129.

~~~~~

Host Gram. austr. 3. tab. 56. *Sturm Fl. germ.*

Abth. 1. *Hefst* 1. tab. 1.

~~~~~

*Schleich. l. c.* p. 23.

RADIX fibrosa, minime repens, gracilis, annua \*).

CULMI plerumque numerosissimi, divergentes, valde inæquales, subcompressi, vix striati, graciles, trientales, basi ut in priore vaginati. *Vagina* unica, stricta, truncata, sæpe mucronulata.

FOLIA nulla præter *culmos* steriles paucos.

SPICA parva, ovata vel subrotunda, concinne imbricata, ex viridi et ferrugineo varia.

GLUMÆ omnes fere æquales et (in nostris) fertiles. Inferiores duæ scariosæ, tenuiores (« steriles »

---

\*) Nec ut vult *WILDENOVIVS* perennis. *POIRET*, *SCHRADER*, *HOST*, *THUILIER*.

SCHRADER ). Celeræ late ovatæ, obtusæ et rotundatæ, subconcaavæ, nervo dorsali viridi vel luteo, dorso fuscæ, apice marginibusque subscariosæ.

STAMINA duo. *Filamenta* per exsiccationem fusciscentia, lævia, setis seminalibus crassiora.

SEMEN parvum, ovatum, subcompressum, utrinque convexum, nitidulam. *Setæ* senæ vel octonæ, valde graciles, exasperatæ, albæ, semine longiores. *Stigmata* duo. (D. v.)

In pratis uliginosis, torfaceis *Helvetice transalpinae*. Plantam rarissimam infra *Bironico* ad viam qua *Luganum* itur invenimus. Circa *Bilitionum*. SCHLEICHER. *Annua*. Fl. Jul. et Augusto. \*)

\* \* Spicæ una plures : culmi teretes.

6. *SCIRPUS lacustris* L. — Sc. culmo tereti nudo, panicula decomposita corymbosa, spiculis ovatis. N. (Gall. *Scirpe des étangs*.)

*Hall. helv.* 1337. *Scheuchz. Gram.* 354 et 356. Sc. lacustris *Sut. Fl. helv.* 1. p. 26.

~~~~~  
Sc. lacustris L. *Sp. pl.* 72. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 296. *Smith brit.* 52. *Pers. syn.* 1. p. 67. *Poir. Enc. méth.* 6. p. 777. *Decand. Fl. fr.* 1778. *Schrader germ.* 1. p. 133.

~~~~~  
*Host Gram. austr.* 3. tab. 61.

~~~~~  
Ehrh. Gram. exs. Dec. 12. n.º 112. *Schleich. l. c.* p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

*) » *Sc. multicaulis* Sm. *brit.* 48. ab *ovato* radice crassiore pereuni et stigmatibus ternis differt. « *SCHRADER. l. c.*

RADIX valida, in limo sub aquis valde repens, articulata, et quasi annulata.

CULMI solitarii, erecti, medulla spongiosa, arida albaque farcti, præcipue inferne crassi, lævissimi, teretes, plerumque altissimi, nudi, ad basin 2-5 vaginis instructi.

VAGINÆ fissæ, alternæ, culmum amplexantes, demum solutæ, margine scariosæ: superiores in *foliolum* solutum, breve, planiusculum, canaliculatum, marginibus scabrinseculum productæ: inferiores aphyllæ, squamiformes.

CULMI steriles nonnulli, floriferis similes.

PANICULA terminalis, supradecomposita, *pedunculis* valde inæqualibus, compressis vel plano-convexis, marginibus scabris, corymbiferis.

INVOLUCRUM commune 5-4-phyllum: *bractea* inferior basi dilatata, amplexicauli et margine late scariosa, ceteris multo longior, in *foliolum* durum, viride vel spadiceum, ad 5 uncias longum, hinc convexum, inde canaliculatum, producta. *Bractea* propria ad basin cujusque pedunculi.

SPICÆ congestæ, ferrugineæ, ovatæ, parvæ, multifloræ.

GLUMÆ omnes fertiles, parvæ, imbricatæ, concavæ, obtusæ, mucronatæ, fuscæ, ad margines flavescens.

SEMEN parvum, hinc planum, inde convexum. *Setae* subsenæ, semine longiores, exasperatæ. *Stigmata* tria. (D. v.)

In aquis tranquillis lacuum, stagnorum et fluviorum vulgarissimus. — Perennis. Fl. Majo — Julio.

7. *SCIRPUS Holoschœnus* L.—Sc. culmo tereti, nudiusculo, panícula umbellata simplicissima, capitulis globosis, involuacro diphylllo. N. (Gall. *Scirpe à têtes rondes.*).

Sc. *Holoschœnus* *Sut. Fl. helv.* 2. p. 303, in add.

~~~~~  
L. *Sp. pl.* 72. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 297. *Pers. syn.* 1. p. 67. *Poir. Enc. méth.* 6. p. 764. *Smith brit.* 53. *Decand. Fl. fr.* 1788.

~~~~~  
Scirpus *Scheuchz. Gram.* 371. tab. 8. fig. 2-5. *)

~~~~~  
Sc. *Holoschœnus* *Schleich. l. o.* p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX horizontalis, valida, valde cespitosa.

CULMI numerosi, dense cespitosi, glaucescentes, rigidi, stricti, erecti, duri, nudi, versus basin tamen instructi *vaginis* 5-4ve alternis, fuscis vel purpurascensibus, fissis, modo aphyllis, striatis, acutis, apice rigidis, fere pungentibus, modo in *foliolum* bracteæ floralis erectæ simile, 1-2ve uncias longum productis.

---

\*) *Fl. dan.* tab. 454 non pertinet huc. Omitto etiam *Sc. Holosch.* *Host Gram. austr.* 3. tab. 63 qui ad *Sc. australem* vel *romanum* pertinere videtur. A nostro satis insigniter differt: *Bractea* erecta, longissima, culmis mollioribus, sæpe flexuosis, nutantibus, culmis sterilibus præsentibus, foliis vaginarum longioribus incurvis, denique situ et numero pauciori capitulorum. Totus habitus alienus. Convenit autem reliquis notis et præcipue fructificationis partibus quas icon citata sistit. Cl. SMITH *Sc. Holoschœnum, australem* et *romanum* conjungit.



FOLIA nulla, nisi vaginarum foliola velis; nec unquam culmos steriles vidimus.

PANICULA simplex, quasi umbellata, terminalis, *pedunculis* 1-2 uncias longis, valde inæqualibus, rigidis, divaricatis, utrinque complanatis, margine scabriusculis, vagina propria brevi scariosaque instructis.

INVOLUCRUM diphyllum: *bractea* inferior, erecta, stricta, prolongatum culmum mentiens ut panicula lateralis esse videatur, uncialis, bincialis, hinc convexa, inde profunde canaliculata, attenuato-acuta, pungens; superior etiam viridis, brevior, divaricata, planiuscula, profunde canaliculata, marginibus scabriusculis.

CAPITULA omnia, uno semper sessili excepto, pedunculata, plerumque 5-8, rarius duo vel tria, globosa, ex fusco virentia, quasi verrucosa, *spiculis* nempe numerosis, rotundatis, obtusis denseque congestis constantia.

GLUMÆ minutæ, coloratæ, breves, latæ, plerumque obtusissimæ, uninerviæ, subinde mucronatæ et pilis pellucidis ciliatæ. *Stamina* tria. *Anthere* lineares longæ, apice mucronatæ.

SEMEN minimum, *Setæ* seminales nullæ. *Stigmata* tria. (D. v.)

Ad littora lacus *Lemani* in arenis, nec unquam in aqua ipsa crescit. Ad ostium rivulorum *Dulire*, *Aubonne*, *Venoge*, prope *St. Sulpy* infra *Lusannam*, infra *Bossey*, à *Versoi* ad officinas lateritias. In littore *sabauda* à *Essevenex* prope *Aquariam*. → Perennis. Fl. Jun. — Sept.

8. *SCIRPUS setaceus*. L. — Sc. culmo setaceo nudiusculo, spicis subternis sessilibus, involucri monophyllo erecto culmo multo breviori. N. (Gall. *Scirpe sétacé*.)

*Mariscus Hall. helv.* 1345. *Scheuchz. Gram.* 358.

*Sc. setaceus Sut. Fl. helv.* 1. p. 26.

~~~~~

Sc. setaceus L. Sp. pl. 72. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 298.

Poir. Enc. méth. 6. p. 757. *Pers. syn.* 1. p. 67.

Smith brit. 54. *Vill. delph.* 2. p. 188. *Decand.*

Fl. fr. 1786. *Schrad. germ.* 1. p. 137.

~~~~~

*Leers herb.* 10. tab. 1. fig. 6. *Rottb. Gram. lib.* 1.

p. 47. tab. 15. fig. 4-5. (an etiam 6?) *Host Gram.*

*austr.* 3. tab. 65. *Krock. Fl. sil.* 1. p. 72. tab. 16.

~~~~~

Schleich. l. c. p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

β. Minima, culmis vix 9 lineas longis.

RADIX fibrosa, annua, cespitosa.

CULMI numerosi, setacei, tenerrimi, rigidiusculi, 3-6 uncias longi, erecti vel adscendentes, teretiusculi, nudi, inferne tantum una alterave vestiti *vagina* tereti, striata, tubulosa, in *foliolum* longitudine mire variabili, læve, setaceum, et profunde canaliculatum producta.

SPICÆ terminales, licet utique propter involucri erectum et prolongationi culmi simillimum, ex cujus basi erumpunt, laterales videantur, minutæ, ovatæ, 1-4, sæpius ternæ, in β 2-5-floræ, in var. vulgari 6-12-floræ sessiles, ex albedo, viridi et purpureo elegantissime variegatæ.

INVOLUCRUM monophyllum, erectum, terminale, culmo multoties brevius, vaginatum, foliolis similinum, apice sub lente obtusiusculum, basi utrinque in marginem scariosum dilatatum, et concavum ut spicarum basin foveat.

GLUMÆ omnes fertiles, concinne imbricatæ, ovatæ, obtusiusculæ, concavæ, margine scariosæ, dorso purpureæ, nervo dorsali valido, viridi, subinde in mucronulum producto.

SEMEN obovatum, minutissimum, hinc planum, inde convexum, sub bona lente striis secundum longitudinem percursum. *Setæ* seminales nullæ. *Stigmata* tria. (D. v.)

In solo argilloso humido rarius occurrit. In sylva *Urthan*, *Basileæ* prope *Neuhaus*, *Wyl* et in sylva *Hard* ad *Wiesam*. Prope *Crens*. J. GAY. In Helvetia *insubrica*. Circa *Ugogna* inter *Domo d'Ossola* et *Mergozzo*. β. In arvis humidis supra *Calève* prope *Nevidunum*. — Annua. Fl. Jul. et Aug.

9. *SCIRPUS supinus* L.—Sc. culmo nudo tereti, spicis subternis sessilibus, involucro monophyllo erecto culmo vix breviori. N. (Gall. *Scirpe ondulé*.)

Mariscus Hall. helv. 1344 *). *Ejud. app. ad Scheuchz. Gram.* p. 39. n.º 1. *Sut. Fl. helv.* 2. p. 303. *inter pl. novas.*

Sc. *supinus* L. *Sp. pl.* 73. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 299. *Pers. syn.* 1. p. 67. *Decand. Fl. fr.* 1787.

*) Utique huc, nec ut voluerunt auctores (v. g. Cl. SUTER Fl. helv. 1. p. 26. ad *Sc. setaceum*) ad priorem spectare videtur. Nobiscum etiam sentit Cl. CHAILLET. V. Fl. fr. 1. c.

~~~~~  
*Host Gram. austr.* 3. tab. 64. \*) *Schrad. germ.* 1.  
 p. 139. tab. 1. fig. 1.

~~~~~  
Schleich. l. c. p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX annua, fibrosa, minus quam in priori cespitosa.

CULMI (cum involucrio) unciales, semipedales et altiores, erecti vel adscendentes, crassiusculi, nudi, basi tamen instructi *vagina* brevi tubulosa, dorso purpurea, margine interiori scariosa, in *foliolum* brevissimum læve compressum hinc convexum, inde canaliculatum, apice obtusiusculum producta.

SPICÆ ut in priori in culmo terminales sessilesque, sed majores, ad 5 lineas longæ, ventricosæ, ovato-oblongæ, 1-8, sæpius ternæ, 7-15-floræ.

INVOLUCRUM fere ut in *Sc. setaceo*, sed culmum plerumque æquans, vel eo longius, compressum, versus spicas distincte canaliculatum, ceterum foliolis vaginarum simile, sed multo longius.

GLUMÆ omnes fertiles, ovato-oblongæ, valde concavæ, primum purpurascentes, dein ferrugineæ, demum fuscæ, uninerviæ, nervo dorsali viridi.

SEMEN subtrigonum, basi attenuatum, apice mucronatum, cortice sub lente transverse rugoso-undulatum. *Setæ* nullæ. *Stamina* 5 filamentis persistentibus. *Stigmata* tria. (D. v.)

In paludibus ad littora lacus *Lemani*. *Aux Granges* prope *Villeneuve*. HALLER. *A St. Sulpy* infra *Lausannam*.
 Ad ostium rivuli *Boiron*, in sinistra ripa, prope *Neridunum*. — Annua. Fl. Aug. — Nov.

*) Icon optima!

* * * Spicæ una plures : culmi triquetri.

10. *SCIRPUS sylvaticus* L. — Sc. culmo trigono folioso, panicula terminali supradecomposita corymbosa foliacea, spicis confertis. N. (Gall. *Scirpe des bois.*)

Scirpus Hall. helv. 1340. *Scheuchz. Gram.* 392.

Sc. sylvaticus Sut. Fl. helv. 1. p. 27.

~~~~~

*Scirpus sylvaticus L. Sp. pl.* 75. *Willd. Sp. pl.* 1.

p. 307. *Pers. syn.* 1. p. 69. *Poir. Enc. méth.* 6.

p. 768. *Smith brit.* 56. *Decand. Fl. fr.* 1783.

*Schrad. germ.* 1. p. 145.

~~~~~

Host Gram. austr. 3. tab. 68. *Leers herb.* 11. tab. 1.

fig. 4. *Fl. dan.* tab. 307.

~~~~~

*Schleich. l. c.* p. 23. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX horizontalis, valida, lignescens.

CULMI solitarii, erecti, læves, trigoni, foliosi, fistulosi, ad ortum vaginarum quasi nodosi, 1-5-pedales.

FOLIA lata, plana, carinata, longa, erectiuscula, superne recurva, læte viridia, marginibus scabra : radicalia fasciculato-cespitosa. *Vaginæ* foliis multo breviores et pallidiores, læves. *Ligula* ovata, obtusa, tenuissima, folio tota adglutinata.

PANICULA terminalis, supradecomposita, corymbosa, *pedunculis* inferioribus reliquis multo longioribus, apice corymbiferis : omnibus trigonis, scabris, ad basin *bractea* oblonga, acutiuscula scariosaque instructis.

INVOLUCRUM universale , *foliolis* 5-4 viridibus valde inæqualibus, foliis similibus, sed multo minoribus, subsessilibus constans, quorum maxima umbellam æquant vel superant.

SPICULÆ in ultimis pedunculorum divisionibus plerumque congestæ, pauciores solitariae, parvæ, ovatae, obtusiusculæ, fusco-virides, multifloræ.

GLUMÆ imbricatæ, ovatae, integræ, obtusæ, concavæ, uninerviæ, carinatae, marginibus scariosæ. Duæ inferiores ceteris minores, fuscae; ima quandoque sterilis.

SEMEN minimum, triquetrum. *Setæ* paucæ, exasperatæ, semine longiores. *Stigmata* tria. (D.v.)

Vulgatissimus in locis aquaticis, ubique. — Perennis. —  
Fl. Majo et Junio.

11. *SCIRPUS maritimus* L. — Sc. culmo triquetro folioso, panícula cymosa simplici foliacea, spicis sessilibus subternis terminalibus. N. (Gall. *Sc. maritime.* )

*Scirpus Hall. helv.* 1339. *Scheuchz. Gram.* 398 et 400. tab. 9. fig. 9. (*bona*; fig. 7. *minus apte cum nostris quadrat*). *Sc. maritimus Sut. Fl. helv.* 1. p. 27.

~~~~~  
Sc. maritimus L. Sp. pl. 74. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 306. *Pers. syn.* 1. p. 66. *Poir. Enc. méth.* 6. p. 768. *Smith brit.* 56. *Decand. Fl. fr.* 1782. *Schrad. germ.* 1. p. 143.

~~~~~  
*Host. Gram. austr.* 3. tab. 67.  
~~~~~


Ehrh. Gram. exs. Dec. 2. n^o. 12. Schleich. l. c. p. 26. Thom. l. c. p. 14.

β. Spicis omnibus sessilibus.

RADIX repens, crassa, fusca, subinde nodosa.

CULMI cespitosi, acute triquetri, erecti, læves, foliosi, superne tantum nudi, spongiosi, infra vaginas tumidiusculi, cubitales et bicubitales.

FOLIA longissima, 2-5ve lineas lata, plana, carinata, linearia, superne tantum marginibus scabriuscula. *Vaginae* breves, læves, triquetrae, ad orificium antice scariosae. *Ligula* nulla.

PANICULA brevis, subumbellata; *pedunculi* pauci, valde inæquales, trigoni, læves, simplicissimi, biunciales vel breviores; in var. β nulli.

FOLIA floralia 5-4, inæqualia, pleraque umbellam superantia, fere sessilia, basi bracteiformi, concava et margine scariosa. *Bractea* etiam oblonga, obtusa, scariosa ad basin cujusque pedunculi adest.

SPICÆ ad 6 lineas longæ, ovatae, crassae, nitidae, badiae, multiflorae, nonnullae in sinu involucri congestae et subsessiles, ceterae summis pedunculis insidentes, geminae aut ternae, rarius solitariae.

GLUMÆ concinne imbricatae, magnae, ovatae, concavae, carinatae, nervo dorsali valido in aristam brevem scabriusculamque producto, apice trifidae, subciliatae, pilis paucis distantibus et brevissimis conspersae.

SEMEN triquetrum-obovatum. *Setae* ternae vel quaternae, exasperatae, semine vix longiores. *Stigmata* tria (D. s.)

In paludibus rarissime. In Helvetia nusquam hanc speciem invenit SCHEUCHZERUS. Circa *Roche* et *Michelfelden*. HALLER. In *Valesia inferiori*. Rev. MURITH. β. *Ebroduni*. J. GAY. Fl. Jul. et Aug.

12. *SCIRPUS annuus*. All. — Sc. culmo longe nudo triquetro, panicula corymbosa terminali foliacea, foliis setaceis pubescentibus. N. (Gall. *Scirpe annuel*.)

Scheuchz. *Gram.* 395. tab. 9. fig. 6. Sc. annuus *Sut.*
Fl. helv. 1. p. 28.

~~~~~  
Sc. annuus. *Pers. syn.* 1. p. 68. *Poir. Enc. méth.*  
6. p. 774. *Decand. Fl. fr.* 1791. *Schrad. germ.*  
1. p. 418. *in add.*

Sc. dichotomus *L. Sp. pl.* 74 ? *Willd. Sp. pl.* 1. p. 304.

~~~~~  
Sc. annuus *All. Fl. pedem.* 2371. tab. 88. fig. 5.
Host Gram. austr. 3. tab. 63. Sc. dichotomus
Rottb. Gram. 57. tab. 13. fig. 1 ? *)

~~~~~  
Sc. annuus *Schieich. l. c.* p. 23.

RADIX fibrosa, annua.

CULMI cespitosi, 4-6 uncias longi, erecti, setacei, triquetri, superne vix scabriusculi, inferne autem setulis distantibus patentibusque conspersi, infra paniculam longe nudi, versus basin instructi *vagina* una alterave superne fissa, inferne tubulosa, pubescenti, in *folium* producta planiusculum,

---

\*) *Sc. dichotomum* L. et *Rottb.* ab *annuo* distinguit. Cl. PERSOON.

canaliculatum, angustissimum, lineare, dorso pubescens, marginibus scabrum, modo brevissimum, modo culmum fere æquans.

PANICULA corymbosa, terminalis: *pedunculi* 3 ad 8, valde inæquales; centralis brevissimus, simplex; reliqui longiores, triquetri, basi vaginali, modo uniflori, modo ipsi corymbiferi.

INVOLUCRUM constans ex *foliolis* paucis valde inæqualibus, pubescentibus, sessilibus, ad basin bracteiformibus; inferius panicula longius.

SPICULÆ in pedunculis pedicellisque solitariae, parvæ, ovato-acutiusculæ, ex viridi et purpureo variæ, demum fuscae.

GLUMÆ imbricatæ, ventricosæ, falcatae, ovato-acutæ, subtrinerviæ.

SEMEN obovatum, compressum, utrinque convexum, secundum longitudinem striatum, sulcis crenato-rugulosis. *Setæ* seminales nullæ. (D. s.)

In *Helvetia transalpina* invenit SCHLEICHERUS. — Annuæ.

« Fl. Aug. et Sept. » Host.

OBS. In specimenibus meis siccis stigmatum numerum rite investigare non potui. Tria observavit Cl. SCHRADER et Host, ROTTBÖLLIUS autem suo *dichotomo* 2. stigmata tribuit.

15. *SCIRPUS triqueter* L. — Sc. culmo trigono nudo, spicis lateralibus pedunculatis sessilibusve, stigmatibus duobus, radice repente. N. (Gall. *Scirpe triangulaire*.)

*Scirpus* Hall. *helv.* 1338 \*) *Sc. triqueter* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 26.

---

\*) Huc enim hoc synonymon, invitis auctoribus, ipsoque sum-



*Sc. triquetus* L. *Sp. pl. ed. Gilib.* 1. p. 59. Willd.  
*Sp. pl.* 1. p. 362. Poir. *Enc. méth.* 6. p. 775.  
*Pers. syn.* 1. p. 68,  $\alpha$  et  $\beta$ . *Smith brit.* 55. *Schrad.*  
*germ.* 1. p. 140. *Decand. Fl. fr.* 1779.



*Sc. mucronatus* Host *Gram. austr.* 3. tab. 66.  
 (excl. *synon.*)



*Sc. triquetus* Schleich. *l. c.* p. 23. Thom. *l. c.* p. 14.  
 $\beta$ . *Spicis omnibus sessilibus, glomeratis.*

*Sc. mucronatus* Roth *germ.* 1. p. 23 et 2. p. 60.

RADIX repens, nodosa, squamosa, fusco-lutea, per intervalla culmos plerumque solitarios spargens.

CULMI trigoni, faciebus omnibus planis, plerumque duriusculi, medulla compacta faretii, pedales et tripedales, læves, nudi, ad basin cincti *squama* una alterave *aphylla*, fissa, membranacea, et paulo altius instructi *vagina* unica tubulosa, triquetra in *foliolum* planum producta, carinatum, unciale vel binunciale, ad 2 lineas latum, lanceolatum, rigidum. *Ligula* soluta, brevis, ovata, obtusa.

FOLIA nulla præter *foliolum* culmeum.

PANICULA reipsa terminalis, lateralis tamen utique esse videtur propter involucrium erectum, culmi

---

MO HALLERO referendum esse censemus. Sed *Scirpo-Cyperus* Scheuchz. *Gram.* 402 quem ad suum *Scirpum* 1538 (app. 1 ad Scheuchz. *Agrostis*. p. 31.) trahit neque ad *triquetrum*, neque ad *mucronatum* pertinere potest.

prolongationi simillimum, *pedunculis* paucis inæqualibus, triquetris, margine scabris, plerumque simplicibus.

INVOLUCRUM monophyllum, trigonum, acutum, panicula duplo triplove longius, apud nos semper erectum.

SPICULÆ ferruginæ, in eadem panicula duæ vel tres in culmo sessiles, ceteræ solitariae, geminae vel ternæ in apice pedunculi, (in  $\beta$  omnes sessiles), multifloræ, ovatae, obtusiusculæ.

GLUMÆ imbricatae, ovatae, concavae, mucronatae, ferruginæ, margine scariosæ, apice obtusiusculæ, subbiduæ vel laceræ, breviter ciliatae.

SEMEN obovatum, mucronatum. *Setæ* sentine paulo longiores, perpaucae, aculeis paucis, mollibus reflexisque hispidulæ. *Stigmata* duo. (D. v.)

In paludibus, non ubique. *A Noville*. Circa *Vervej*. *Aux isles de la Tour*. *Basileæ* ad *Rhenum* inter *Neudorf* et *Hünningen*. *HALLER*. *Aux Grangettes* ad caput lacus *Lemani*. Circa *Dorigny* infra *Lausannam*. — *Perennis*. Fl. Aug.

*Obs.* Auctore *Cl. Host*, l. c. involacrum quandoque reflectitur, quod quidem nunquam observavimus. Radice (pace *SMITHII*) semper repit.

14. *SCIRPUS mucronatus* L. — Sc. culmo triquetro apice demum reflexo, spicis sessilibus lateralibus, stigmatibus tribus, radice fibrosa. N. (Gall. *Scirpe mucroné*.)

Sc. mucronatus? *Sut. Fl. helv.* 1. p. 27. *Scheuchz. Gram.* 404. tab. 9. fig. 14. (*Bona*.)



*Sc. mucronatus* *L. Sp. pl.* 73. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 303. *Poir. Enc. méth.* 6. p. 762. *Pers. syn.* 1. p. 68. *Decand. Fl. fr.* 1780. *Schrad. germ.* 1. p. 139.



*Schleich l. c.* p. 23.

**RADIX** fibrosa, minime repens, perennis.

**CULMI** triquetri, angulis nempe acutis et fere alatis, ut facies omnes plus minusve excavatæ sint, medulla spongiosa et facile comprimenda farcti, crassi, nudi, prope basin *vagina* aphylla, scariosa, tenuissima, tubulosa, apice rotundata, et inferius *squamis* vagis tecti.

**FOLIA** nulla.

**SPICÆ** 5-8, semper sessiles, conglomeratæ, pallidæ, ovalæ, multifloræ, ut in priori quasi laterales.

**INVOLUCRUM** monophyllum, triquetrum, culmi prolongationi simillimum, spiculis multoties longius, erectum, demum plerumque reflexum.

**GLUMÆ** ventricosæ, ovalæ, acutæ, mucronulatæ, integræ, vix ciliatæ, nec scariosæ, pallidæ, marginibus tantum fuscae vel purpurascens.

**SEMEN** magnum, obovato-trigonum, albidum; *setæ* semine paulo longiores, senæ vel octonæ, valde exasperatæ. *Stigmata* tria. (D. v.)

In paludibus rarius. *Tiguri* præcipue in promontorio lacus quod *das Horn* vocatur, circa Monasterium *Rüti* in pago *tigurino*, et in pratis udis ad *Lintham* secus viam qua *Wesenum* itur. SCHEUCHZER. In *Helvetia transalpina* prope *Locarno* et in agro *aquilejensi*. SCHLEICHER. Circa *Luganum*. REV. VERDA. Inter *Chiavennam* et *Ripam* copiose. — Perennis. Fl. Jul. et Aug.



Obs. Species priori affinis, quamvis omnino abunde distincta. Characteres tamen ab auctoribus omnibus (Cl. SCHRADERO excepto) indicati, plerique nimis læves et inconstantes esse videntur.

## G. 39. ERIOPHORUM. L.

*Cal. Glumæ* undique imbricatæ. *Cor. o.*  
*Semen* setis numerosis, longissimis, lævissimis cinctum.

Obs. *Eriophorum* ab omnibus fere Cyperaceis non solum numero et longitudine setarum, sed etiam iisdem lævissimis egregie differt.

### *Analysis.*

- |                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spica unica. — 1.                                                                   | Spicæ una plures. — 6.                                                                      |
| 1. Culmus lævissimus vaginatus. Setæ rectæ, densissimæ. Glumæ scarioso-lividæ. — 2. | Culmus scabriusculus, longè nudus. Setæ pauciores, crispulæ. Glumæ pulchre ferrugineæ. — 5. |
| 2. Culmus superne triquetrus, duriusculus. Vaginæ superne inflatæ, ventricosæ. — 3. | Culmus teretiusculus, spongiosus, mollis. Vaginæ parum inflatæ. — 4.                        |
| 3. ERIOPHORUM <i>vaginatum</i> . Sp. 1.                                             |                                                                                             |
| 4. ERIOPHORUM <i>capitatum</i> . Sp. 2.                                             |                                                                                             |
| 5. ERIOPHORUM <i>alpinum</i> . Sp. 3.                                               |                                                                                             |
| 6. Pedunculi scabri, quandoque divisi. — 7.                                         | Pedunculi læves, simplicissimi. — 8.                                                        |
| 7. ERIOPHORUM <i>polystachyon</i> . Sp. 4.                                          |                                                                                             |
| 8. ERIOPHORUM <i>angustifolium</i> . Sp. 5.                                         |                                                                                             |

1. *ERIOPHORUM vaginatum* L. — Ex. culmis vaginatis trigonis, spica ovata unica, antheris linearibus elongatis. N. (Gall. *Linaigrette à larges gaines.*)

*Eriophorum Hall. helv. 1332. Scheuchz. Gram. 302.*  
 tab. 7. fig. 1. 2. 3. *Er. vaginatum Sut. Fl. helv. 1.*  
*p. 28.*

~~~~~

Er. vaginatum L. Sp. pl. 76. Willd. Sp. pl. 1. p. 312.
Pers. syn. 1. p. 70. Lam. Enc. méth. 3. p. 526.
Smith brit. 58. Decand. Fl. fr. 1770.

~~~~~

*Er. cespitosum Schrad. germ. 1. p. 150.*

~~~~~

Er. vaginatum Fl. dan. tab. 236. Sturm Fl. germ. 1.
Abth. 10. Heft. tab. 7. Er. cespitosum Host Gram.
austr. 1. tab. 39. Juncus alpinus capitulo lanugi-
noso, etc. Scheuchz. Prodr. tab. 7.

~~~~~

*Ehrh. Gram. exs. Dec. 3. n.º 21.*

*Er. vaginatum Thom. l. c. p. 13. Er. cespitosum*  
*Schleich. l. c. p. 12.*

**RADIX** densissime cespitosa, «primum carnosa et quasi bulbosa, deinde transversa et lignescens.» Host.

**CULMI** simplicissimi, fere pedales, obsolete trigoni, læves, graciles, duriusculi, parum spongiosi, a medio inferne vaginis paucis plerumque aphyllis instructi, basi foliosi. *Vaginæ* distantes: superiores longæ, inferne tubulosæ, purpurascentes; superne fissæ, inflatæ, pallide virentes, nervis transversis et verticalibus pulchre reticulatæ, obtusiusculæ, plerumque aphyllæ; inferiores breves, fissæ, minus inflatæ, filamentosæ.

**FOLIA** radicalia, culmo adulto breviora, erect-

linscula, triquetra, dura, rigida, breviter vaginata. Culmea perpanca.

SPICA terminalis, unica, ovata, erecta, matura uncialis.

GLUMÆ imbricatæ, numerosæ, lanceolatæ, obtusiusculæ, lividæ, scariosæ, margine angusto albido cinctæ, nervo tenuissimo unico percursæ: *inferiores* steriles; infima sæpius bracteiformis, ceteris major, acuminata, subaristata.

ANTHERÆ lineares, elongatæ.

SEMEN obovatum, parvum, fuscum, multisetum. Lana longissima, conferta, mollissima, nivea, recta, valde fragilis. Stigmata tria. (D. v.)

In paludibus torfaceis submontanis. Ad lacum Felinum. Im Ióhr, et circa Herrenschwanden prope Bernam. A la chaux d'Abelle. A la plaine des Mosses. Aux marais des Rousses, etc. — Perennis. Fl. primo vere, Martio et Aprili. Spicæ Majo vel Junio maturæ sunt.

2. *ERIOPHORUM capitatum* Hoffm. — Er. culmis vaginatis teretibus, spica unica subglobose, antheris cordato-ovatis brevibus. N. (Gall. *Linai-grette de Scheuchzer*.)

*Hall. helv.* 1332 β. *Scheuchz. Gram.* 304. Er. vaginatum β. *Sut. Fl. helv.* 1. p. 28.

~~~~~  
Er. capitatum *Hoffm. germ.* 3. p. 26. *Decand. Fl.* fr. 1771. *Schrad. germ.* 1. p. 151.

Er. *Scheuchzeri Pers. syn.* 1. p. 70.

~~~~~  
Er. capitatum *Host Gram. austr.* 1. tab. 38. Er. *Scheuchzeri Hoppe in Sturmii Fl. germ.* 1.

*Alth.* 10. *Hefst*, tab. 8. *Juncus alpinus* capitulotomentoso, etc. *Scheuchz. Prodr.* tab. 7.



*Er. capitatum* *Schleich. l. c.* p. 12. *Thom. l. c.* p. 13.

**RADIX** elongata, repens, gracilis, stolonifera.

**CULMI** perpauci, plerumque trientales, crassiusculi, molles, ut facile sub digitis comprimantur, minute striati, nitidi, saturate virides, adulti inferne tantum vaginati. *Vaginæ* approximatae, vix inflatae, ceterum fere ut in priori.

**FOLIA** radicalia, fasciculata, setaceo-subulata, mollia, spongiosa, dorso subcarinata, facie obiter canaliculata, culmo breviora. Culmea perpauca, ceteris consimilia sed breviora.

**SPICA** unica, terminalis, subrotunda, latitudine nempe longitudinem plerumque superante, lana computata, vix ultra 9 lineas longa.

**GLUMÆ** fusco-lividae, minus scariosae, margine albedo angustissimo instructae: *exteriorēs* duae tresve maximae, steriles; reliquae omnes fertiles.

**ANTHERÆ** breves, subcordatae, ovatae.

**SEMEN** ovatum, parvum. *Cetera* prioris. (D. v.)

In alpium editiorum palustribus. In *M. Enzeindaz*, *Gottardo*, *Schvideck*, *Fouly*, *Pennino*, in alpihus *Claridis*, etc. — Perennis. Fl. Jul. et Aug.

*Obs.* Species affinis priori, sed facillime distinguenda.

5. *ERIOPHORUM alpinum*. L. — *Er.* culmo nudiusculo triquetro scabro, spica unica erecta, pappo rariori crispo. N. (Gall. *Linaigrette des Alpes*.)

*Eriophorum Hall. helv. 1333. Scheuchz. Gram. 305. Er. alpinum Sat. Fl. helv. 1. p. 29.*




*Er. alpinum L. Sp. pl. 77. Willd. Sp. pl. 1. p. 714. Lam. Enc. méth. 3. p. 526. Smith brit. 60. Decand. Fl. fr. 1772. Schrad. germ. 1. p. 149.*

*Trichophorum alpinum Pers. syn. 1. p. 70.*



*Er. alpinum Fl. dan. 620. Host Gram. austr. 1. tab. 40. Hoppe in Sturm. Fl. germ. 1. Abth. 10. Heft. tab. 6. Krock. Fl. sil. 1. p. 77. tab. 17. (mediocris). Scheuchz. Prodr. tab. 8.*



*Schleich. l. c. p. 12. Thom. l. c. p. 13.*

RADIX repens, dilute fusca, fibras albas demittens, cespites numerosos alens.

CULMI triquetri, (« subinde tetragoni » SMITH), retrorsum scabri (qua nota ab omnibus congeneribus nostratibus hæc species differt), graciles, erecti, basi tantum foliosi, triunciales, trientales.

FOLIA radicalia nulla, nisi culmos steriles paucos, ceteris breviores dicas. Culmea perpauca, brevissima, linearia, erecta, margine scabriuscula, hinc carinata, inde canaliculata, obtusiuscula; vaginæ tubulosæ, approximatae, ad orificium antice scariosæ, truncatae, culmi partem inferiorem tegentes: infimæ squamiformes, fissæ, aphyllæ, numerosæ,

SPICA unica, terminalis, elegans, parva, erecta, pauciflora, ovato-oblonga. INVOLUCRUM ex 2 bracteis constans inæqualibus, glumis similibus, sed

paulo majoribus et sterilibus; *exterior* ovata, spicæ basin amplexans, nervo in aristam brevem obtusiusculam desinente; *interior* paulo minor, ovato-lanceolata, mucica.

GLUMÆ paucæ, lanceolatae, obtusiusculæ, pulchre rutilantes, imbricatæ, nervo dorsali evanido instructæ.

SEMINA obovata, minima, ferruginea. *Setæ* fere senæ, tenuissimæ, crispæ et varie tortiles, 9-10 lineas longæ. *Stigmata* tria. (D. v.)

In paludibus torfaceis alpium et montium. In M. *Pilato*. Prope *Hirzel* et *Spiez*. *A la Brevine*. In *Gemmio*, in valle *Grindelwald*. In alpihus *Aquilejensibus*. *A l'Echelette*, aux *Portins*, à l'*Envers de Renens*, in M. *Pouilletet*; in paludibus *jurans* supra *Nevidunum*, speciatim aux *Rousses*, etc — *Pereunis*. Fl. Jun. — Aug.

Obs. Florens *Sc. cespitoso* simillimum a quo tamen culmo triquetro scabroque, et glumis duabus infimis sterilibus statim dignoscitur. — « Spica modo tota fœminea, modo ex flosculis hermaphroditis fœmineisque composita. Flores diandri et triandri. » Host.

4. *ERIOPHORUM polystachyum*. L.—Er. foliis planis apice triquetris, culmo subtrigono, spicis nutantibus, pedunculis scabris subdivisis. N. (Gall. *Linaigrette à épis nombreux*.)

*Eriophorum Hall. helv.* 1331 a. *Scheuchz. Gram.* 306.

Er. polystachyum *Sut. Fl. helv.* 1. p. 28.

~~~~~  
Er. polystachyum *L. Sp. pl.* 76. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 312. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 526. *Smith brit.* 59. *Decand. Fl. fr.* 1767.

Er. vulgare *Pers. syn.* 1. p. 70.

Er. latifolium *Schrad. germ.* 1. p. 155.



Er. polystach. *Host Gram. austr.* 1. tab. 57. *Leers herb.* p. 11. tab. 1. fig. 5. *Vaill. paris.* tab. 16. fig. 2. *) *Er. latifolium Hoppe in Sturmii Fl. germ.* 1. *Abth.* 10. *Hefl.* tab. 11.



Er. polyst. *Thom. l. c.* p. 13. *Schleich. l. c.* p. 12.

RADIX crassa, difficile eruenda, non repens.

CULMI erecti, læves, pedales, cubitales, foliosi, teretes, superne obsolete trigoni.

FOLIA plana, superne in acumen triquetrum attenuata, carinata, marginibus et acuminis carina scabra, 2-6 uncias longa, 2-5 lineas lata. *Vaginæ* inferiores fissæ, albidæ, truncatæ, aphyllæ; ceteræ tubulosæ, virides, ad orificium subscariosæ fuscæque, *ligulæ* loco linea fusca arcuata notatæ.

PANICULA terminalis, polystachia, sæpe composita. INVOLUCRUM universale ex 2-4 foliolis constans viridibus, inæqualibus, spica adulta brevioribus, ovatis, basi atro-fuscis, vix vaginantibus, in acumen viride, triquetrum scabrumque productis. *Pedunculi* per anthesin erecti, brevisissimi, vel subnulli, demum longi, penduli, fere secundi, scabri, subtrigoni: nonnulli e longioribus apice subinde ramosi, 2-5-flori.

SPICÆ juniores ovato-oblongæ, adultæ cum lana ovatæ, pollicares.

GLUMÆ omnes fertiles, lanceolatæ, acutiusculæ,

*) Huc potissimum nec ad sequentem speciem cum SMITHIO repugnante CL. CANDOLLE hanc iconem referendam censemus.

marginē angusto, albido, florentes subvirides, adultæ ex nigro livescentes, nervo tenuissimo, subevanido instructæ.

SEMEN triquetrum, basi attenuatum, multisetum. *Lana* nivea, glumis multoties longior. (D. v.)

In palustribus ubique. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

Obs. Cl. SCHRADERO monente, Host *Er. polystachyum* et *angustifolium* confudit, cum iconis citatæ figura sinistra sola ad illud, intermedia vero et recta ad hoc pertinere videantur.

5. *ERIOPHORUM angustifolium* Roth. — Er. foliis canaliculatis superne triquetris, culmo tereti, spicis nutantibus, pedunculis lævibus simplicissimis. N. (Gall. *Linaigrette à feuilles étroites.*)

Eriophorum Hall. *helv.* 1331 β. Scheuchz. *Gram.* 308. n.º 3. Er. *angustif.* Sat. *Fl. helv.* 1. p. 29.

~~~~~

Er. *angustifolium.* Willd. *Sp. pl.* 1. p. 313. Smith *brit.* 59. Hoffm. *germ.* 1. p. 19. Pers. *syn.* 1. p. 70. Decand. *Fl. fr.* 1768. Schrad. *germ.* 1. p. 153.

~~~~~

Er. *angustif.* Sturm. *Fl. germ.* 1. *Abth.* 10. *Heft*, tab. 10. Er. *latifolium* Host *Gram. austr.* 1. tab. 37. (V. obs. ad speciem præcedentem.) Vaill. *paris.* tab. 16. fig. 1.

~~~~~

Schleich. *l. c.* p. 12. Thom. *l. c.* p. 13.

RADIX « repens ». SMITH. SCHRADER.

CULMI erecti, foliis perpaucis instructi, florentes trientales, adulti pedales, cubitales, teretes, superne subtrigoni.

FOLIA vaginantia, acute carinata, superne in acumen longum triquetrum producta, inferne canaliculata, ceterum facie planiuscula, marginibus fere lævibus: radicalia longissima; culmea brevia, plerumque angustiora quam in priori.

PANICULA simplicissima, in paludibus alpinis ex paucis (5-4) spicis constans; in planitie 4-7 spicas profert.


INVOLUCRUM fere *polystachyi*, foliolis in acumen triquetro - canaliculatum desinentibus. *Pedunculi* ancipites, semper simplicissimi, lævissimi, ceterum ut in priori.

SPICÆ florentes ovato-lanceolatae, acutae, multiflorae; adultae maximae, cum lana « rariori » (bene monente SCHEUCHZERO) facile sescunciales.

GLUMÆ ovato-lanceolatae, primum virides, admixta leni purpura, marginibus albidæ; denique canescentes et late scariosæ, basi lividæ.

SEMINA fusca, nitida, triquetra, lana longissima stipata. (D. v.)

In paludibus torfaceis montanis et subalpinis, *A la plaine des Mosses*, ubi præunte SCHLEICHERO invenimus. Ad lacum *Felinum*. In valle *Formazza*. In planitie: *aux marais de Duiliers*. (Ibi major evadit et 4-7 spicas folia-que latiora profert.) — Perennis. Fl. Majo et Junio.



## G. 40. CYPERUS. L.

*Glumæ* distiche imbricatæ. *Cor.* nulla.  
*Semen* unicum imberbe. SMITH.

*Analysis.*

- |                                                                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culmi vix semipedales. Involucrum triphyllum. — 1.                                            | Culmi bipedales et altiores. Involucrum polyphyllum. — 4.                                      |
| 1. Spicæ flavescentes, lanceolatae; glumæ dense imbricatæ. — 2.                               | Spicæ atro-fuscae, lineares; glumæ demum distinctæ. — 3.                                       |
| 2. CYPERUS <i>flavescens</i> . Sp. 1.                                                         |                                                                                                |
| 3. CYPERUS <i>fuscus</i> . Sp. 2.                                                             |                                                                                                |
| 4. Paniculae pedunculi longe nudi, apice corymbiferi. Spicæ lineares, glumis imbricatis. — 5. | Pedunculi compositi, fere undique floriferi. Spicæ oblongæ, ellipticæ, glumis distinctis. — 6. |
| 5. CYPERUS <i>longus</i> . Sp. 3.                                                             |                                                                                                |
| 6. CYPERUS <i>Monti</i> . Sp. 4.                                                              |                                                                                                |

1. CYPERUS *flavescens*. L. — C. umbella triphylla subcomposita, spicis confertis lanceolatis, glumis obtusis, stigmatibus duobus, culmo nudo.  
 N. (Gall. *Souchet jaunâtre*.)

Cyperus. *Hall. helv.* 1348. *Schenchz. Gram.* 385.

C. *flavescens*. *Sut. Fl. helv.* 1. p. 23.

~~~~~

C. *flavescens* L. *Sp. pl.* 68. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 279.

Pers. syn. 1. p. 62. *Poir. Enc. méth.* 7. p. 255.

Vill. delph. 2. p. 183? *Decand. Fl. fr.* 1800.

Schrad. germ. 1. p. 117.

~~~~~

*Host Gram. austr.* 3. tab. 72. *Krock. Fl. sil.* 1. p. 62.

tab. 11. *Schkuhr Handb.* tab. 7.

*Schleich. l. c. p. 11. Thom. l. c. p. 13.*

β. Minor, foliis setaceis.

*Hall. helv. 1800. β. Sut. l. c.*

*Scheuchz. Gram. 386. tab. 8. fig. 13. (bona.)*

RADIX annua, fibrosa, cespitosa.

CULMI erectiusculi, firmi, tenues, obscure triquetri, læves, 2-6 uncias longi, nudi, nec nisi versus basin foliosi.

FOLIA culmis breviora, linea una vix latiora, acuta, plana, canaliculata. *Vaginæ* breves, scariosæ, subcoloratæ, tubulosæ, superne fissæ.

UMBELLA (ut in omnibus) terminalis, conferta, *pedunculis* paucis, brevibus, valde inæqualibus, nudis, inferne incrassatis, obsolete angulosis, apice multifloris, ad basin *vagina* oblonga, scariosa, fusca, truncata stipatis. INVOLUCRUM triphyllum, *foliis* radicalibus consimilibus, sed valde inæqualibus patentibusque.

SPICÆ congesto-umbellatæ, brevissime pedicellatæ, multifloræ, pulchre flavescences vel rutilantes, lanceolatæ, valde compressæ, et ob glumas dense imbricatas ambitu integræ.

GLUMÆ omnes fertiles, concinne distichæ, carinatae, nervo dorsali viridi, lævi, minime scariosæ, obtusæ.

SEMEN rotundatum, minimum, fuscum. *Stigmata* duo. (D. v.)

In udis et fossis exsiccatis, vulgo.  $\beta$ . In pratis uliginosis circa MEYRINGEN. Ampliss. HALLERUS fil. — Annua. Fl. Jul. — Sept.

2. *CYPERUS fuscus*. L. — C. umbella triphylla subcomposita, spicis confertis linearibus, glumis acutiusculis, stigmatibus tribus, culmo nudo. N. (Gall. *Souchet brun.*)

*Cyperus Hall. helv.* 1349. *Scheuchz. Gram.* 384.

C. fuscus *Sut. Fl. helv.* 1. p. 23.

C. fuscus *L. Sp. pl.* 69. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 280.

*Poir. Enc. méth.* 7. p. 256. *Pers. syn.* 1. p. 62.

*Vill. delph.* 2. p. 183. *Decand. Fl. fr.* 1799.

*Schrad. germ.* 1. p. 118.

*Host Gram. austr.* 3. tab. 73. *Leers herb.* 9. tab. 1.

fig. 2. *Fl. dan.* tab. 179. *Schkuhr Handb.* tab. 7.

*Krock. Fl. sil.* 1. p. 63. tab. 12. (*quoad spicas m&ia.*)

*Ehrh. Gram. exs. Dec.* 12. n<sup>o</sup> 111. *Schleich. l. c.*

p. 11. *Thom. l. c.* p. 13.

**RADIX** fibrosa, annua.

**CULMI** cespitosi, crassi, exacte triquetri, subflaccidi, molles, 1-8 uncias longi, nunnisi versus basin foliosi.

**FOLIA** late viridia, 1-2 lineas lata, plana, carinata, ad nervum dorsalem plicata. *Vaginæ* fere ut in priori. Sic et

**UMBELLA** et **INVOLUCRUM**. *Pedunculi* tamen minus inæquales, triquetri, periinde autem vagina albida truncata suffulti.



SPICÆ atro-fuscae, vel ex fusco virides, longius pedicellatae, longe numerosiores, lineares (nec apud nos ut Cl. VILLARSIIUS et alii volunt ovatae), duplo angustiores et ob glumas distinctas et subremotas ambitu quasi serratae.

GLUMÆ minimae, fuscae, ovato-acutae, carinatae, nervo dorsali crasso, viridi, usque ad apicem excurrente, laevi.

SEMEN minimum, exacte trigonum, fuscum, *Stigmata tria.* (D. v.)

In Helvetia minime rarus. Habitat plerumque cum priori, quocum etsi similes sint, vix confundi potest. — Annuus. Fl. eodem tempore.

3. *CYPERUS longus*. L. — C. culmo folioso, umbella foliosa decomposita, pedunculis nudis, spiculis linearibus compressis, glumis imbricatis. N. (Gall. *Souchet long.*)

*Scheuchz. Gram.* 378. tab. 8. fig. 12. *C. longus* *Sut.*  
*Fl. helv.* 1. p. 23.

~~~~~

C. longus L. *Sp. pl.* 67. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 285.
Pers. syn. 1. p. 64. *Poir. Enc. méth.* 7. p. 265.
Vill. delph. 2. p. 182. *Smith brit.* 47. *Decand.*
Fl. fr. 1801. *Schrad. germ.* p. 120.

~~~~~

*Host Gram. austr.* 3. tab. 76.

~~~~~

Schleich. l. c. p. 11. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX valida, repens, longissima, fusca, grate aromatica et adstringens, fibras crassas demittens.

CULMI cubitales, laeves, erecti, exacte triquetri, graciles, inferne foliosi, superne nudi.

FOLIA longissima, 2-4 lineas lata, erecta, læte virentia, margine scabra, nervosa, ad carinam et nervos intermedios plicata. *Vaginæ* foliis breviores, tubulosæ, antice truncatæ, pallidæ, scariosæ, læves.

UMBELLA pulchra, decomposita, *pedunculis* inæqualibus plerumque elongatis, longe nudis, lævibus, hinc convexis, inde canaliculatis, superne quasi umbelliferis, sæpe etiam proliferis, basi *vagina* tubulosa, oblonga, scariosa, albida valdeque obliqua tectis. INVOLUCRUM *foliis* 5-4 inæqualibus, ceteris similibus, sed multo angustioribus, sessilibus, umbella plerumque multo longioribus.

SPICÆ alternæ, graciles, lineares, acutæ, 4-10-floræ, ex albo et rubro eleganter variegatæ, approximatæ, subsessiles; inferiores *bracteis* albidis, linearibus, acutissimis stipatæ.


GLUMÆ arcte imbricatæ, sic distichæ ut flosculi ordinum oppositorum sese basi invicem tegant, oblongæ, obovatæ, retusæ, breviter emarginatæ, rubræ, margine pallidiores scariosæque, carina viridi, lævi, valida.

SEMEN minimum, oblongum, triquetrum. *Stigmata* tria. (D. v.)

Hab. in pratis humidis *Helvetiæ insubricæ*. Rarus. *Chiavenna*. SCHLEICHER. *Lugani* ad pedem M. S. *Salvadore* hanc pulchram speciem rever. VERDA primus observavit ac nobis commonstravit. Denique anno præterito (1807) etiam in Pago *Vaudensi*, nempe *Lausannæ près le pont de la Maladière*, *Vivisci* et *Gumoëns* repertus est. — Perennis. Fl. Jul. — Sept.

4. *CYPERUS Monti* L. — C. umbella decomposita foliosa, spicis compresso-teretiusculis, glumis demum distinctis, radice viticulosa. N. (Gall. *Souchet de Monti*.)

Scheuchz. Gram. 380—381.




Cyperus Monti L. *Mant.* 179. *Willd. Sp. pl.* 1. p. 286. *Poir. Enc. méth.* 7. p. 267. *Pers. syn.* 1. p. 64. *Decand. Fl. fr.* 1804. *Schrad. germ.* 1. p. 122. *All. ped.* 2356.

Cyp. serotinus Rottb. *ic. et descr. Gram.* p. 21.



Monti Prodr. 12. tab. 1. fig. 2.



C. *Monti* *Schleich. l. c.* p. 11. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX viticulosa, per æstatem ob stolonum singularem fragilitatem facile mere fibrosa esse videtur; autumnus autem collum radice elongatum crassumque evadit: *viticuli* graciles, articulati, fibrosi, tunica tubulosa, cujus capacitatis fibra ne quidem tertiam partem complet, tecti, horizontaliter repentes.

CULMUS acute triquetrus *), erectus, cubitalis et altior, crassus, glaucescens, inferne foliosus, superne nudus.

FOLIA longissima, intus spongiosa, crassa, complicata, carinato-triquetra, carina nempe alata,

*) Nec ut credidit Linnæus teres.

adeoque prominula ut explicari fere nequeant 2-5 lineas lata, glauca, lanceolata, nonnisi superne scabriuscula. *Vaginæ* triquetrae, tubulosæ, antice scariosæ, dorso crasse spongiosæ, breves, læves, striatæ.

UMBELLA terminalis, decomposita, compacta, *pedunculis* numerosis, valde inæqualibus, longioribus 2-5-uncialibus fere media inferiori parte nudis, teretiusculis, 3-4-fidis, *ramulis* nempe approximato-alternis, flexuosis, angulatis, divaricatis; *vaginæ* pedunculorum principum basin tegentes longæ, albidæ, apice subbifidæ. *Involucrum* 4-6-phyllum, ex foliis valde inæqualibus, culmeis similimis, sed minoribus, maximum tamen quandoque cubitale, umbella semper multoties longius. *Bracteæ* parvæ ad ramulorum ortum et infra spicas.

SPICÆ multifloræ, sessiles, alternatim ramulis ut folii pinnati foliola insidentes, concinne distichæ, compresso-teretiusculæ, pulchre ferrugineæ.

GLUMÆ valde ventricosæ, primum arcte imbricatæ, demum distinctæ, lævissimæ, margine et apice anguste scariosæ, obtusæ, carina angusta, multinerviæ.

STIGMATA duo.

SEMEN breve, ovale, subcompressum, utrinque convexum. (D. v.)

Lugani in paludibus inventum benignissime nobiscum communicavit Rev. VERDA. Ipse autem abunde in paludibus inter *Chiavennam* et *Ripam* inveni. — Perennis. Fl. Aug. et Sept.

Obs. Fabrica viticulorum in hac specie omnino singularis

est ut in tota Graminearum gente nulla occurrat planta quæ tales habeat radices. Perperam Cl. CANDOLLII huic Cypero in tabulis suis analyticis floræ gallicæ præfixis (tom. 1. p. 197) radicem fibrosam tribuit.

G. 41. ELYNA. Schrad.

Flosculi hermaphroditi. *Cal.* 1-valvis. *Cor.* 2-valvis. *Semen* nudum. *Stigmata* tria.

1. *ELYNA* *spicata* Schrad. — *El.* *spica* *) *stricta* *lineari.* N. (Gall. *Elyne en épi.*)

Elyna spicata Schrad. *germ.* 1. p. 155.

Carex Bellardi Hall. *fl. in Rôm. Arch.* I. 2. p. 9.
n.º 39. *Sut. Fl. helv.* 2. p. 240. *Hoffm. germ.* 3.
parte 2. p. 191. *Decand. Fl. fr.* 1701.

Kobresia scirpina Willd. *Sp. pl.* 4. p. 205. *Cobresia*
scirpina Pers. *syn.* 2. p. 534.

Carex myosuroides Etr. *de Fl.* 58.



C. Bellardi *All. ped.* 2293. tab. 92. fig. 5. *Schkuhr*
Car. n.º 6. tab. D. 16. *Car. myosuroides* Vill.
delph. 2. p. 194. tab. 6.



El. spicata. Schleich. *l. c.* p. 12.

RADIX fibrosa, dense cespitosa, fibris atro-fuscis,
duris, numerosis.

*) In Caricibusisque affinibus spicæ proprie amenta sunt. De nomine tamen nihil immutare volumus cum ejusmodi amenta ab omnibus auctoribus sic vocentur. Quod semel observasse sufficiet.

FOLIA omnia radicalia , fasciculata , setacea , subangulosa , canaliculata , stricta , angustissima , culmum florentem subæquantia , adulto breviora. *Vaginæ* stramineæ vel fusæ , nitidæ , striatæ , subtruncatæ : exteriores sæpe aphyllæ.

CULMUS fere setaceus , teretiusculus , striatus , lævissimus , nudus , basi vagina propria foliisque fasciculorum stipatus , strictus , 2-6 uncias longus.

SPICA unica , terminalis , simplicissima , linearis , valde gracilis , fere semuncialis , ex ferrugineo argentea.

FLORES parvi , laxius imbricati , inferne fere alterni ut spica basi subinterrupta videatur.

CALYX monophyllus , persistens ; VALVULA ampla , amplexicaulis , tenerima , scariosa , superne alba , inferne ex ferrugineo pulchre rutilans , corolla quam tegit major , concava , obtusissima , apice rotundata , obsolete uninervia , nervo nempe vix conspicuo ad medium dorsum evanido.

COROLLA bivalvis , persistens , ex ferrugineo et albo variegata. GLUMÆ parum inæquales , oppositæ , calyci parallelæ , erectæ , conniventes : *exterior* basi vaginante scariosaque , internam arcte amplexens , lata , fere enervia , latiuscula , concava , obtusa ; *interior* genitalia involvens , paulo brevior angustiorque , marginibus inflexis.

STAMINA tria. *Stigmata* tria.

SEMEN nudum , parvum , trigonum , subfuscum , læve. (D. v.)

In herbosis aridiusculis cacuminum alpium editiorum non

infrequens. In M. Enzeindaz, Boulaire, Lioson, Pennino, Sempronio, Col du Bonhomme, etc. — Perennis.
Fl. Jul. et Aug.


OBS. Monente amplissimo HALLERO fil. (l. c.) hanc speciem prius omnium Cl. DICK, idque in valle Gastern ad moles glaciales e quibus Candera scaturit (Alpetli-Gletscher); bonam descriptionem ejusdem elaboravit et LINNÆO sub nomine *Caricis lucidæ* misit.

G. 42. CAREX.

Glumæ univalves, undique imbricatæ; masculis stamina tria; foemineis pistillum unicum. Stigmata 2 vel 3. Semen urceolo proprio cartilagineo, apice perforato tectum.

OBS. Genus propter numerosissimas species earumque non paucas varietates difficillimum. Præcipue partes quæ maxime ad ritam cujusque speciei determinationem inserviunt, sequentes sunt: — 1.^o *Folia floralia* reliquis consimilia, *sessilia* aut *vaginantia*, vel eorum loco ad basim spicarum *bractæ* glumis similes, sed majores, plerumque in foliorum viride setaceum productæ. — 2.^o *Pedunculi* nulli, breves aut longi, erecti, mutantes aut penduli. — 3.^o *Vaginæ* foliorum floralium quando adsunt semper tubulosæ, culmum et pedunculum spicæ saltem unius tegentes, nullæ, breves aut longæ. Hæ vaginæ rationem elegantem longitudinis pedunculorum æstimandæ pro norma proportionis potius quam mensura numeris definita in variis speciminibus unius ejusdemque speciei diversa, suppeditant. — 4.^o *Spicæ* ipsæ quoad — a) *numerum*: species nonnullæ uniuersam, plurimæ autem duas, tres pluresve spicas proferunt, — b) *sexum* species præterque monoicæ sunt; edunt nempe semper in una eademque planta unam pluresve spicas mere masculas, et unam vel sæpius duas pluresve spicas mere foemineas. Species paucissimæ, interdum reperiuntur polygæræ quæ spicam habent unicam mere masculam in planta distincta, et in alia

spicam androgynam i. e. ex floribus masculis fœminisque simul constantem. Haud paucae species spicis omnibus eodem modo androgynis gaudent. Unica tandem semper dioica depiccaditur. — c (*situm* in culmo et distantiam inter se et — d) *figuram*. — 5.^o *Numerus stigmatum*. Diagnosi constans facilisque: Quando autem post florescentiam stigmata non amplius inveniuntur, urceoli quæ *fructum* nominamus seminisque forma semper sufficit ad numerum stigmatum investigandum. Fructus nempe semenque triquetra, semper stigmata terna esse indicant; fructus autem pius minusve compressus, hinc convexus, inde planus stigmata tria esse declarat. Verum præcipue figura seminis respicienda est; nam fructus forma quandoque dubia reperitur, dum semen semper indicium facile certissimumque præbeat. — 6.^o *Situs* florum masculorum fœmineorumque in speciebus androgynis. — 7.^o *Fructus* figura et magnitudo respectu habito ad glumam ejus. Fructus est muticus, mucronatus, aut rostratus: apice sæpius bifido, rarius truncato. Est glaber cum, vel sine nitore, pubescens vel hirsutus; lævis aut ad angulos exasperatus; in nonnullis speciebus margine proprio instructus. — 8.^o *Glumarum* s. squamarum floralium figura. Sunt ovatae, lanceolatae vel lineares; obtusae aut acutae, muticae, mucronatae, aut in aristam brevem productae. Color earum nonnunquam characterem facilem nec omnino spernendum præbens, etiam observari debet. — 9.^o *Longitudo foliorum* respectu ad culmi longitudinem habito, et latitudo eorum. — 10.^o tandem *culmus* triqueter, trigonus, aut teres; lævis aut scaber.



Analysis.

Spica unica, simplicissima, — 1. Spica unica, ex spiculis distinctis vel agglomeratis composita, aut spicæ una plures. — 15.

* *Spica unica simplicissima.*

- | | |
|--|--|
| 1. Fructus superficie tota hirsutus. — 2. | Fructus læves, vel nondisi ad angulos asperi. — 3. |
| 2. <i>CAREX hirsuta</i> . Sp. 68. | |
| 3. Stigmata 2; fructus dorso convexi, inde plani. Semina orbiculata, compressa. — 4. | Stigmata 3; fructus triquetri vel subrotundi. Semen triquetrum. — 9. |
| 4. Planta dioica: spica in quavis planta aut mere mascula, aut mere foeminea. Fructus patens brevis. Culmus lævissimus. Radix repens. — 5. | Planta polygama vel androgyna, rarius dioica. Spica in quavis planta aut mere mascula, aut androgyna. Fructus oblongi, demum reflexi. Culmus sæpe scabriusculus. Radix fibrosa. — 6. |
| 5. <i>CAREX dioica</i> . Sp. 1. | |
| 6. Fructus substriati, basi rotundati. Planta plerumque polygama, rarius vere dioica. Culmus scabriusculus. — 7. | Fructus utrinque acuminati. Spica semper androgyna. Culmus lævissimus. — 8. |
| 7. <i>CAREX davalliana</i> . Sp. 2. | |
| 8. <i>CAREX pulicaris</i> . Sp. 3. | |
| 9. Spica androgyna, basi foeminea, apice mascula. — 10. | Flosculi omnes hermaphroditi. <i>Elyna spicata</i> . |
| 10. Fructus elongati, demum reflexi. Glumæ deciduæ. — 11. | Fructus glumis breviores, erecti. Glumæ persistentes. — 14. |
| 11. Folia plana, carinata. Radix fibrosa. Stylus terminalis. — 12. | Folia setacea. Radix repens. Stigmata lateralìa. — 15. |
| 12. <i>CAREX pauciflora</i> . Sp. 4. | |
| 13. <i>CAREX microglochin</i> . Sp. 5. | |
| 14. <i>CAREX petraea</i> . Sp. 6. | |
| 15. Spicæ vel spiculæ plerumque | Spicæ sexu distinctæ, suprema |

- androgynæ, rarius sexu distinctæ, sed tunc valde numerosæ et agglomeratæ. — 16.
16. Spiculæ numerosæ, congestæ; supremæ infimæque fœminæ; intermediæ masculæ. — 17.
17. *CAREX intermedia*. Sp. 7.
18. Spica universalis aut basi fœminea et apice mascula, aut basi mascula et apice fœminea. — 19.
19. Stigmata duo. — 20.
20. Spiculæ apice masculæ. — 21.
- mascula; infima fœminea. — 62.
- Spiculæ vel spicæ fere omnes androgynæ. — 18.
- Spica universalis apice et basi fœminea. Spiculæ imbricatæ numerosæ. *Carex intermedia*.
- Stigmata tria. — 57.
- Spiculæ apice fœmineæ. — 58.

* * *Spiculæ androgynæ, apice masculæ :
stigmata duo.*

21. Spica subrotunda, ovata, aut irregulariter angulata. Spiculæ congestæ, spicam unicam simplicemque mentientes. — 22.
22. Bracteæ muticæ. Culmus inferue ramis sterilibus nonnullis instructus. Folia culmo multo breviora. — 23.
25. *CAREX chordorhiza*. Sp. 8.
24. Folia plana, lineam unam lata. Culmus exacte triqueter. Planta recens odorata. — 25.
25. *CAREX fœtida*. Sp. 9.
- Cf. *C. lobatam*. Sp. 69.
26. *CAREX juncifolia*. Sp. 10.
27. Spica decomposita vel subdecomposita, valde multiflora. Fructus nitidi, parvi, fuscii, vix divergentes. — 28.
- Spica universalis, oblonga; spiculæ plus minusve distinctæ, nec spicam simplicem referentes. — 27.
- Bracteæ aristatæ. Culmus simplicissimus. Folia culmum fere æquantia. — 24.
- Folia angustissima, carinato-convoluta. Planta inodora. — 26.
- Spica rarius decomposita, spiculis parum numerosis distantibusque. Fructus grandiusculi, virides, absque nitore, divergentes. — 55.

28. Spica decomposita vel supra- decomposita, ramis distinctis laxisque. Glumæ ex griseo fuscae, margine late scariosæ. — 29. Spica decomposita, contracta, ramis parum conspicuis. Glumæ juniores fuscae et unicolores, aut ferrugineæ, margine scariosa angusto. — 30.
29. CAREX *paniculata*. — Sp. 11.
30. Glumæ ferrugineæ, margine scariosæ. Fructus dorso gibbi, facie planiusculi. — 31. Glumæ juniores unicolores, fuscae. Fructus utrinque gibbi. — 32.
31. CAREX *teretiuscula*. Sp. 12.
32. CAREX *paradoxa*. Sp. 13.
33. Spica decomposita, compacta, brevis. Culmus crassus, angulis compressis, acutissimis. — 34. Spica oblonga, interrupta. Culmus gracilis, solidus. — 35.
34. CAREX *vulpina*. Sp. 14.
35. Spicauncialis vel biuncialis, simpliciuscula. Vaginæ virides. — 36. Spica elongata, basi subramosa, Vaginæ crispulæ, foliis pallidiores. — 37.
36. CAREX *muricata*. Sp. 15.
37. CAREX *divulsa*. Sp. 16.

*** *Spiculæ androgynæ, apice foemineæ; stigmata duo.*

38. Spica infima pedunculata. — 39. Spiculæ omnes sessiles. — 40.
39. CAREX *bicolor*. Sp. 17.
40. Spiculæ: remotæ inferiores axillares; folia floralia culmum superantia. — 41. Spiculæ inferiores bracteis culmo brevioribus instructæ. — 42.
41. CAREX *remota*. Sp. 18.
42. Fructus adco divergentes ut spiculæ maturæ squarrosæ sint. — 43. Fructus vix divergentes. Spiculæ nunquam squarrosæ. — 48.
43. Fructus versus basin dilatati, facie triangulares, in spiculis maturis stellatim patentes. Culmus lævis. — 44. Fructus utrinque acuminati. Culmus plus minusve scaber. — 45.

44. *CAREX stellulata*. Sp. 19.
 45. Spiculæ approximatae niveæ. Spiculæ subremotæ, ex fusco rubellæ. — 46.
 46. *CAREX brizoides*. Sp. 20.
 47. *CAREX elongata*. Sp. 21.
 48. Spiculæ omnes approximatae, Spica interrupta, spiculis plus minusve dissitis. — 49.
 49. Fructus margine albido cartilagineo, subpellucido. — 50. Fructus absque margine proprio. — 52.
 50. Spiculæ ellipticæ, ex viridi griseæ, crassiusculæ. Culmus fistulosus, teretiusculus, fere lævis. — 51. Spiculæ teretes, graciles, niveæ. Culmus solidus, triqueter, superne scaber. *C. brizoides*.
 51. *CAREX leporina*. Sp. 22.
 52. Fructus glumas superantes, ovato-mucronatus, mucrone conici, apice incisi. Folia angustissima. Radix valde repens. — 53.
 53. *CAREX approximata*. Sp. 25.
 54. *CAREX Schreberi*. Sp. 24.
 55. Spiculæ 6-8. Fructus erectiusculi. Glumæ pallide viridentes, margine albo. — 56. Spiculæ plerumque numerosæ. Glumæ medio dorso virides, margine ex fusco rubellæ. — *C. elongata*.
 56. *CAREX curta*. Sp. 25.

*** *Spiculæ androgynæ. Stigmata tria.*

57. Spiculæ congestæ, spicam unicum simplicem mentientes. Spicæ tres pluresve, valde distinctæ. — 58.
 58. *CAREX curcula*. Sp. 26.
 59. Spiculæ pedunculatæ, demum pendulæ, plus minusve distantes. Fructus plerumque flavii. — 60. Spicæ sessiles vel subsessiles. contiguae, semper erectæ. Fructus atrofusci. — 61.
 60. *CAREX atrata*. Sp. 27.
 61. *CAREX atrata nigra*. Sp. 27. γ.

***** *Spicæ sexu distinctæ. Stigmata duo.*

62. Stigmata duo. Fructus compressi. Semen orbiculatum, complanatum. — 65. Stigmata tria. Fructus triquetri vel rotundati. Semen exakte triquetrum. — 70.
63. Spicæ fœminæ approximatae. Folia angustissima. — 64. Spicæ fœminæ axillares, distantes Folia lineam saltem unam lata. — 65.
64. *CAREX mucronata* Sp. 28.
65. Spica mascula, plerumque unica, rarius duæ. Auriculæ foliorum floralium nigrae, parvæ, rotundatæ. Fructus persistentes. — 66. Spicæ masculæ duæ vel plures. Auriculæ nigrae, elongatæ. Fructus maturi valde caduci. — 67.
66. *CAREX cespitosa*. Sp. 29.
Cf. *C. fuscum*. Sp. 70.
67. Fructus valde compressi, latiusculi, virides, acuti. Vaginæ inferiores in filamenta fatiscientes. — 68. Fructus viventes, graciles, obtusi. Vaginæ integræ. — 69.
68. *CAREX stricta*. Sp. 30.
69. *CAREX acuta*. Sp. 31.
70. Spica mascula fere semper unica. — 71. Spicæ masculæ una plures. — 155.

*****¹ *Spicæ sexu distinctæ : mascula unica.*
Stigmata tria.

71. Spica fœminea ima sessilis vel subsessilis. — 72. Spica fœminea ima conspicue pedunculata. — 111.
72. Spicæ fœminæ, congestæ, subglobosæ : maturæ squarrosæ. Fructus divergentes, longe rostrati. — 73. Spicæ nunquam squarrosæ. Fructus nec divergentes, nec longe rostrati. — 76.
73. Spicæ fœminæ subbinæ. Culmi trientales et pedales. Planta vernalis. — 74. Spicæ fœminæ ternæ vel quaternæ. Culmus humilis. Planta per totam æstatem florens. — 75.

74. *CAREX flava*. Sp. 44.
 75. *CAREX flava* Oederi. Sp. 44. 7.
 76. Spica foeminea suprema apicem masculæ fere attingens, vel superans. — 77. Spica foeminea suprema apice masculæ multo humilior. — 82.
 77. Spicæ saturate purpureæ, ex albo variæ. Folia ad duas lineas lata. — 78. Spicæ argenteæ. Folia vix ultra lineam dimidiam lata. — 81.
 78. Spicæ inferiores distantes. Bractea sæpius in foliolum producta. — 79. Spicæ omnes approximato-digittatæ. Bractæ aphyllæ. — 80.
 79. *CAREX digitata*. Sp. 41.
 80. *CAREX ornithopoda*. Sp. 42.
 81. *CAREX alba*. Sp. 43.
 82. Fructus superne undique pubescentes, hirsuti vel tomentosi. — 83. Fructus glabri, vel nonnisi ad angulos scabri. — 100.
 83. Spicæ fere toti culmo insidentes. — 84. Spicæ in parte superiori culmi sessiles vel breviter pedunculatæ. — 85.
 84. *CAREX clandestina*. — Sp. 40.
 85. Spicæ foemineæ remotæ. Folia floralia longissima pro bracteis. Culmus demum cubitalis. Fructus hirsuti. — 86. Spicæ foemineæ approximatae. Bractæ aphyllæ, vel folia floralia culmo breviora. Fructus pubescentes vel tomentosi. — 87.
 86. *CAREX lasiocarpa*. Sp. 52.
 87. Fructus rotundi, incani. — 88. Fructus obovati vel pyriformes, virides. — 89.
 88. *CAREX tomentosa*. Sp. 53.
 89. Glumæ absque margine scarioso. — 90. Glumæ margine scarioso albo auctæ. — 97.
 90. Glumæ nigricantes. Spicæ foemineæ fere semper exacte sessiles. Bractæ amplexicaules, absque vaginis. — 91. Glumæ rutilantes. Spica foeminea una subpedunculata. Bractea ejus vaginans, sæpius in foliolum producta. — 94.
 91. Culmus 3-6 uncias longus, læviusculus. Spicæ foemineæ plus minusve distinctæ. — 92. Culmus 9-12 uncias longus scaber. Spicæ foemineæ informes, congestæ. — 95.

92. *CAREX montana*. Sp. 34.
 93. *CAREX montana* conglobata. Sp. 34 β.
 94. Culmus 5-6 uncias longus, Culmus pedalis scaber. Glumæ lævisculus. Glumæ carina carina exasperatæ. Fructus læves. Fructus mucrone integro. — 95.
 95. *CAREX præcox*. Sp. 55.
 Cf. *C. hispidulam*. Sp. 58.
 96. *CAREX præcox* umbrosa. Sp. 55 β.
 97. Glumæ obtusissimæ, per Glumæ acutæ, aristatæ, minime lentem ciliatæ. Bractea basi ciliatæ. Loco bractæ foliolum lata glumiformi. — 98. viride, sessile, lineare. — 99.
 98. *CAREX ciliata*. Sp. 56.
 99. *CAREX pilulifera*. Sp. 57.
 100. Spicæ fœminæ, oblongæ, Spicæ fœminæ globosæ, demum minime squarrosæ. — 101. flavicantes, maturæ propter fructus rostratos divergentesque squarrosæ. — 72.
 101. Culmus circiter semipedalis Bractea vel foliolum breve ad basin spicarum fœminearum. Folia brevissima, patentia, pungentia. — 102. Culmus plerumque multo altior. Folia longissima, erecta; floralia spicis multo longiora. — 103.
 102. *CAREX firma*. Sp. 54.
 Cf. *C. strigosam*. Sp. 72.
 103. Spicæ fœminæ plerumque remotæ. Folia fœminea vaginis instructa. — 104. Spicæ fœminæ approximatæ. Vaginæ florales brevissimæ. — 109.
 104. Fructus ad angulos vel rostro exasperati; cortice absque punctis. — 105. Fructus læves, cortice per lentem pellucido-punctato. — 108.
 105. Fructus ovato-acutus, Lingula ad orificium foliorum floralium prominula. Radix fibrosa. — 106. Fructus subrotundi, rostrati. Lingula nulla. Radix repens. — 107.
 106. *CAREX distans*. Sp. 46.
 107. *CAREX fulva*. Sp. 45.
 108. *CAREX punctata*. Sp. 47.
 109. Spica mascula longissima, Spica mascula ovata, fœminicis

- teres, foemineis multo gracilior. Foliū florale innum culmum totum superans. — 110.
110. *CAREX foliosa*. Sp. 71.
111. Spica foeminea infima longe pedunculata ex culmi basi nascent. — 112.
112. Folia 1-2 lineas lata, plana. Fructus aut pubescentes aut ad angulos exasperati. — 113.
113. Fructus pyriformes vel obovati, per lentem pubescentes. — 114.
114. Spicæ foemineæ culmæ paucifloræ, contiguæ. Fructus magni, oculo nudo striati, nec nisi sub lente pubescentes. — 115.
115. *CAREX gynobasis*. Sp. 39.
116. Spica foeminea suprema masculæ apicem attingens vel superans. — 117.
117. Culmus et folia subinde scabra, sed semper glabra. — 118.
118. Pedunculi demum penduli. — 119.
119. Culmus fere semper 4 uncis brevior. Glumæ coloratæ, obtusissimæ. — 120.
120. *CAREX capillaris*. Sp. 61.
121. *CAREX Pseudo-cyperus*. Sp. 60.
122. Fructus superne pubescentes. — 123.
123. Culmus sæpe cubitalis. Folia canaliculata. Spica mascula, gracilis, acuta, longissima. — *C. lasiocarpa*.
124. Spicæ foemineæ, erectæ.
- fere crassior. Foliū florale infimum spica tantum paulo longius. *C. firma*.
- Spica radicalis nulla. — 116.
- Folia angustissima, canaliculata. Fructus glabri lævesque. *C. brachystachys*.
- Fructus oblongi, longe rostrati, glabri nec nisi ad angulos scabri. — *C. firma*.
- Spicæ foemineæ 10-15-floræ, plerumque distantes. Fructus parvi, obsolete striati, distincte pubescentes. — *C. præcox*.
- Spica foeminea suprema masculæ apice multo humilior. — 122.
- Culmus et folia distincte pubescentia. — *C. pallescens*.
- Pedunculi semper erecti. — *C. flava*.
- Culmus cubitalis. Glumæ virides, acutissimæ, aristiformes. — 121.
- Fructus glabri, quandoque ad angulos scabri. — 124.
- Culmus circiter semipedalis. Folia plana. Spica mascula, obovata, brevis. — *C. præcox*.
- Spicæ foemineæ aut pendulæ, aut

- Pedunculi erecti. — 125. pedunculis nutantibus instructis. — 144.
125. Fructus ovati, mutici vel breviter mucronati, apice plerumque integro. — 126. Fructus oblongi, in rostrum plerumque profunde bifidum elongati. — 131.
126. Culmus et folia distincte pubescentia. — 127. Culmus et folia glabra. — 128.
127. *CAREX pallescens*. Sp. 49. Fructus nitentes, mucronato-rostrati, viriduli, approximati. Folia viridia. — 130.
128. Fructus absque nitore, colorati, mutici, distantes. Folia glauca. — 129.
129. *CAREX panicea*. Sp. 51.
130. *CAREX nitida*. Sp. 53.
131. Vaginæ florales, pedunculi dimidiam vel tantum tertiam partem tegentes. — 132. Vaginæ florales longissimæ, pedunculum plerumque subæquantés. Spicæ fœminæ remotæ. — 104.
132. Folia marginibus et carina hirsuta. — 133. Folia glabra. — 134.
133. *CAREX pilosa*. Sp. 52.
134. Folia floralia culmum superantia. Spicæ omnes approximatae. Glumæ fœminæ pallidæ, margine aurantiacæ. — 135. Folia floralia culmo breviora. Spicæ fœminæ pleræque distantes. Glumæ plus minusve fuscæ. — 136.
135. *CAREX foliosa*. Sp. 71.
136. Folia canaliculata, angustissima. Fructus ad angulos læves. — 137. Folia plana sæpius, 1-2 lineas lata. Fructus ad angulos scabri. — 138.
137. *CAREX brachystachys*. Sp. 57.
138. Spicæ fœminæ sæpe quaternæ vel quinæ: superiores approximatae. Fructus graciles glumis duplo longiores. — 139. Spicæ fœminæ binæ vel ternæ, distantes. Fructus ovato-oblongi, glumis paulo longiores. — 140.
139. *CAREX frigida*. Sp. 58.
140. Folia plerumque longa, subangusta. Culmus fere pedalis vel altior. — 141. Folia lata, breviora, patentia, pungentia. Culmus circiter semipedalis. — *C. firma*.

141. Spica mascula subovata, Spica mascula subcylindrica,
plerumque 6 lineis vix longior. sæpe uncialis. Folia floralia
Folia floralia sua spica breviora. spicam suam multo superan-
Fructus mucrone apice sca- tia. Fructus mucrone colorato
rioso albido. — 142. sublimbriato. — 145.
142. CAREX *sempervirens*. Sp. 55.
143. CAREX *Scopolii*. Sp. 56.
144. Vaginæ foliorum floralium Vaginæ foliorum floralium pe-
nullæ vel subnullæ. — 145. dunculi tertiam partem te-
gentes, vel longiores. — 149.
145. Culmus foliaque glabra. Culmus foliaque pubescentia;
Spicæ virides vel fuscæ. — spicæ pallidæ, ex viridi albidæ.
— 146. — *C. pallescens*.
146. Spicæ fuscæ, nunquam Spicæ virides, maturæ propter
squamulosæ. — 147. fructus divergentes squarrosæ.
— *C. Pseudo-cyperus*.
147. Folia vix lineam unam lata. Folia ad 2 lineas lata. Glumæ
Glumæ dorso virides vel luteæ. unicolores, atro-purpureæ. —
— 148. *C. atrata*.
148. CAREX *limosa*. Sp. 50.
149. Vaginæ pedunculos fere in- Vaginæ dimidiam tantum partem
tegros tegentes. — 150. pedunculorum tegentes vel
breviores. — 151.
150. CAREX *pendula*. Sp. 48.
151. Spicæ foemineæ longissime Pedunculi 2 vel 5 unciis vix lon-
pedunculatæ. Glumæ pallidæ. giores. Glumæ fuscæ. — 153.
- 152.
152. CAREX *sylvatica*. Sp. 59.
153. Folia plana, sæpe 1-2 lineas Folia canaliculata, angustissima;
lata. Fructus ad angulos scabri. Fructus undique læves. — *C.*
— 154. *brachystachys*.
154. Spicæ foemineæ binæ vel Spicæ foemineæ sæpe quaternæ
ternæ. Fructus ovato-oblongi, vel quinæ: superiores appro-
glumis paulo longiores. — 141. ximate. Fructus graciles, glu-
mis duplo breviores. — *C.*
frigida.

***** *Spicæ sexu distinctæ : masculis una pluribus. Stigmata tria.*

155. Fructus undique hirti vel exasperati. — 156. Fructus glabri lævesque vel tantum ad angulos scabri. — 159.
156. Folia læte viridia. Pedunculi vix conspicui vel vaginis tecti. Fructus hirsuti. — 157. Folia glauca. Spicæ fœminæ plerumque pedunculatæ. Fructus scabri. — *C. glauca*.
157. Folia plana, lata; vaginæ glumæque plerumque pubescentes. Culmus triqueter. — 158. Folia canaliculata, angusta. Vaginæ et glumæ semper glaberrimæ. Culmus rotundatus. — *C. lasiocarpa*.
158. *CAREX hirta*. Sp. 62.
159. Spicæ fœminæ aut sessiles erectæque, aut pedunculis nudis longioribus et nutantibus instructæ, nec simul graciles et longissimæ. — 160. Spicæ fœminæ gracillimæ, pendulo-areuatæ, longissimæ. Pedunculi vaginis fere omnino tecti. *C. pendula*.
160. Fructus inflati et vesiculares. Spicæ masculæ viridicineræ vel pallide ferrugineæ. Fœminæ demum crassæ. — 161. Fructus minime vesiculares. Spicæ masculæ atro-fusæ: fœminæ plerumque graciles. — 166.
161. Glumæ aristatæ. Spica infirma sæpe pendula. — 162. Glumæ acutæ, sed nunquam aristatæ. Spicæ omnes plerumque erectæ. — 165.
162. *CAREX riparia*. Sp. 65.
163. Culmus, teretiuseculus, spongiosus. Fructus fere globosi, rostro lineari longiusculo instructi. — 164. Culmus triqueter, solidus. Fructus conici, usque ad apicem attenuati. — 165.
164. *CAREX ampullacea*. Sp. 66.
165. *CAREX vesicaria*. Sp. 67.
166. Culmus exacte triqueter, exasperatus. Folia læte viridia. — 167. Culmus rotundatus, plerumque levissimus. Folia glauca. — 168.
167. *CAREX paludosa*. Sp. 64.
168. Spicæ fœminæ pedunculatæ; demum pendulæ. — 169. Spicæ fœminæ sessiles vel pedunculis erectis instructæ. — 170.

169. *CAREX glauca*, Sp. 63.

170. *CAREX glauca nigro-lutea*, Sp. 63. β.

* *Spica unica simplicissima. A. Stigmata 2.*

1. *CAREX dioica*. L. — *C. spica dioica*, fructibus adscendentibus ovalis mucronatis striatis. N. (Gall. *Caret dioique.*)

Carex Hall. helv. 1351. *App. ad Scheuchz. Gram.* p. 39 n.º 3. *C. capitata* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 239. (non L.)

~~~~~

*C. dioica* L. *Sp. pl.* 1379. *Smith brit.* 963. *Hoffm. germ.* 1. parte 2. p. 188. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 207. *Decand. Fl. fr.* 1695. *Pers. syn.* 2. p. 534.

~~~~~

C. dioica Schkuhr *Car.* p. 7. tab. A. 1. *Fl. dan.* tab. 369.

C. linnæana Host *Gram. austr.* 3. tab. 77.

~~~~~

*C. dioica* Thom. l. c. p. 13. *Seringe Cat. pl. exsicc.* p. 2. dec. 1. *C. linnæana* Schleich. l. c. p. 9.

**RADIX** viticulosa, articulata, gracilis, per intervalla culmos foliorumque fasciculos paucos solitarios nec dense cespitosos edens.

**FOLIA** carinatq-triquetra, setacea, læviuscula; *radicalia* culmo breviora; *culmea* pauca, vaginantia.

**CULMI** erecti, teretiusculi vel obtuse trigoni, lævissimi, inferne solum foliosi, 2-5 uncias longi.

**SPICA** unica, simplicissima, terminalis, dioica: in *maribus* linearis, gracilis, acuta, 5-6 uncias longa,

in planta foeminea plerumque multo brevior et crassior, modo linearis, modo ovato-acuta.

GLUMÆ masculæ ex flavo pulchre rutilantes, margine scariosæ, concavæ, carinatae, ovato-lanceolatae, acutiusculæ. Foemineæ eodem fere colore, margine albido angustiori, ovato-obtusæ.

FRUCTUS glumis paulo longiores, patulæ, adscendentes, ex viridi fuscæ, hinc gibbi, oculo nudo striati, inde planiusculi, ovati, ad angulos serrulati, mucronati, apice integro, truncato, scarioso, albo.

SEMEN orbiculatum, complanatum, luteolum, mucronulatum. *Stigmata* duo. (D. v.)

Rara. Hab. in paludibus montanis frigidisve. *Au-dessus des Plans. Um den Ballenbühl*, In M. Enzeindaz et Fouilly. HALLER. In agro Nevidunensi circa Trélex, Burtigny et Clarens. Supra Bonmont et la Rippe. Aux marais de la Tour de Courge, etc. — Perennis. Fl. Aprili et Maio.

2. *CAREX davalliana*. Smith. — C. spica mascula androgynave, fructibus oblongo-subulatis læviusculis patulis demum reflexis. N. (Gall. *Caret de Davall*.)

*Carex Hall. helv.* 1350 quoad descriptionem. Scheuchz. *Gram.* 497. tab. 11. fig. 9 et 10. C. dioica (non L.) Sut. *Fl. helv.* 2. p. 239. C. reflexa Etr. de *Fl.* p. 53.

~~~~~

C. *davalliana* Smith brit. 964. Hoffm. germ. l. c. p. 189. Decand. *Fl. fr.* 1696. Willd. *Sp. pl.* 4. p. 208. Pers. syn. 2. p. 535.

~~~~~

C. *dioica* Schk. Car. tab. A. Q. W. 2. Host *Gram. austr.* 1. tab. 41. (synon. confusis.)

~~~~~

C. davalliana Schleich. l. c. p. 9. Seringe l. c. Dec. 1.
Thom. l. c. p. 13.

RADIX fibrosa, fusca, densos culmorum foliorumque cespites edens.

FOLIA culmis demum multo breviora, valde inæqualia, setacea, carinato-triquetra, obiter canaliculata, scabriuscula. *Culmea* pauca, vaginantia, ceteris breviora latioraque, canaliculata.

CULMI trigoni, florentes 5-4 uncias longi, demum trientales vel pedales, ad angulos scabri, inferne tantum foliosi.

SPICA unica, simplicissima; in planta *mascula* gracilis, linearis, subtrigona, acuta, culmo vix crassior, ferruginea, 8-9 lineas longa; in planta *fructifera* subinde foeminea, sæpius tamen apud nos androgyna, superne nempe mascula, inferne foeminea, pauciflora: fructifera masculis multo crassior breviorque.

GLUMÆ ferrugineæ, ovatae, acutæ, carinatae, nervo dorsali, viridi, margine angustissimo albido.

FRUCTUS oblongi, rostrato-subulati, angusti, apud nos læviusculi, fere 2 lineas longi, fusci, obiter striati, dorso convexiusculi, rostro sæpius incurvo, apice integro vixque scarioso, patuli et demum retroflexo-divergentes, ut spica matura omnino squarrosa fiat. *Stigmata* duo. (D. v.)

In paludibus ubique vulgatissima. — Perennis. Fl. Apr. et Majo.

OBS. Planta a priori, quacum ab auctoribus multis diu con-

frusa fuit, culmo aspero trigono, radice fibrosa, fructuum forma, multisque aliis notis insigniter differt.

5. *CAREX pulicaris* L. — C. spica simplici androgyna superne mascula, fructibus divaricatis retroflexis utrinque acuminatis. Goodenough. (Gall. *Caret pulicaire.*)

C. pulicaris Sut. *Fl. helv.* 2. p. 239. *Etr. de Fl.* p. 55.

~~~~~  
*L. Sp. pl.* 1382. *Smith brit.* 965. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 213. *Decand. Fl. fr.* 1697. *Pers. syn.* 2. p. 535. *Hoffm. germ. l. c.* p. 189.

~~~~~  
Schkuhr Car. n.º 3. tab. *A.* 3. *Fl. dan.* tab. 166. *Leers herb.* p. 195. tab. 14. fig. 1.

~~~~~  
*Schleich. l. c.* p. 9. *Seringe l. c. Dec.* 1. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX fibrosa, cespitosa.

FOLIA setacea, convoluto-canaliculata, superne ad margines scabriuscula, culmo fructifero apud nos multo breviora.

CULMI teretiusculi, læves, demum pedales, in summis alpibus nonnisi 2-3 uncias longi, versus basin foliis paucissimis vaginantibus instructi, ceterum nudi, filiformes, graciles.

SPICA unica, simplicissima, linearis, androgyna, parte dimidia superiori mascula, inferne foeminea, 6-8 lineas longa, multiflora.

GLUMÆ masculæ oblongo-ovatae, subacuminatae, persistentes, demum appressæ; foemineæ

ovato-lanceolatae, superne tantum margine latiusculo scarioso instructae, distantes, deciduae. *Omnes* ex fusco griseae, nervo dorsali valido.

FRUCTUS distantes, ventricosi, utrinque acuminati, fusci, nitidi, dorso et facie convexi, undique laeves: apice truncato indiviso, albido, vix nisi versus basin striati; maturi retroflexi pendulique. *Semen* albidum, mucronatum, oblongum, ovatum, compressum, crassiusculum, quasi pedicellatum. *Stigmata* duo. (D. v.)

Rara. Hab. hinc inde in paludum locis siccioribus herbidis, nec ut SCHLEICHERUS in fasciculis suis indicavit, torfaceis. In M. Gurnigel. HALLERUS filius. *Au bout des Rondes, Mairie de la Brévine*. Cl. CHAILLET. Prope Seedorf. Ad lacum *Felinum*. Jac. GAY. Supra valem *Ursariam* ad ascensum M. Gotthardi cum *Junco squarroso* vigentem etiam invenimus. *Lausannae* vulgo. *Aux marais de la Tour de Gource*. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

Obs. Hanc plantam nec SCHEUCHZERUM nec nostrum summum HALLERUM vidisse crediderim. Descriptiones certe eorum minime cum ea conveniunt. Icon etiam prioris nonnisi ad speciem priorem referri potest.

### B. *Stigmata* 5.

4. *CAREX pauciflora* Lightf. — C. foliis planiusculis, spica unica androgyna pauciflora, fructibus distantibus utrinque subulatis divaricatis. N. (Gall. *Caret pauciflore*.)


C. pauciflora *Etr. de Fl.* p. 57.

~~~~~

Smith brit. 966. *Decand. Fl. fr.* 1700. *Hoffm. l. c.* p. 190. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 211. C. leucoglochin *L. fil. suppl.* 413. *Pers. syn.* 2. p. 535.



C. pauciflora Schk. *Car.* n.º 4. tab. *A.* 4. *Host*
Gram. austr. 1. tab. 42 (*optima*).



Schleich. *l. c.* p. 9. *Thom.* *l. c.* p. 13.

RADIX fibrosa, dense cespitosa.

FOLIA plana, carinato-plicata, lineam fere integram lata, læviuscula. *Radicalia* reliquis angustiora brevioraque. *Culmea* vaginantia, eo longiora quo magis a basi distant; longissima culmo breviora.

CULMI cespitosi, numerosi, triquetri, superne scabriusculi, semipedales, inferne foliosi, basi *vaginæ* apophyllis marcidisque tecti.

SPICA unica simplicissima, androgyna, florens ovato-oblonga, acuta, subcompressa, flosculis 5-8; superioribus uno alterove masculis, reliquis foemineis distantibus.

GLUMÆ *masculæ* oblongæ, lanceolatæ, acutæ: *foemineæ* ovato-lanceolatæ, obtusiusculæ, valde caducæ. *Omnes* nervo tenui ad apicem producto instructæ, ex ferrugineo virides, demum fuscescentes, margine vix scariosæ.

FRUCTUS glumis vix longiores, 2-3ve lineas longi, subtriquetri, graciles, ex viridi flavi, utrinque subulati, ad angulos obtusiusculos læves, obiter striati, distantes, racheos denticulis insidentes, patuli vel divaricati, subinde etiam omnino reflexi. *Semen* triquetro-obovatum, utrinque obtusum, urceolo multo brevius. *Stigmata* tria. (D. v.)

In paludibus Alpium occidentalium et M. Juræ. In M. Pilato, auf dem Esel. A la tourbière de la Tour de Gource. Aux marais des Mosses; dans ceux des Rousses, etc. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

5. *CAREX microglochin* Wahlenb. — C. foliis setaceis, spica androgyna submultiflora, fructibus reflexis subulatis stylis lateralibus. N. (*Caret à fruit pointu.*)

C. *microglochin* Wahlenberg act. Holm. 1803. p. 140 *). Willd. Sp. pl. 4. p. 212. Pers. syn. 2. p. 535.

~~~~~  
Schkuhr Car. Nachtr. p. 32. n.º 5. tab. Ssss. fig. 110.

~~~~~  
Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.

RADIX fere ut in *C. dioica*, fibris subtilibus, viticulis tenuissimis, fragilibus, articulatis, fibrosis longe repens.

CULMI minus quam in priori cespitosi, triunciales, semipedales, obsolete trigoni, striati, lævissimi, longe nudi, nec nisi prope basin foliosi.

FOLIA culmo saltem duplo breviora, lævissima, vix ultra tertiam quartamve lineæ partem lata, subtriquetro-setacea, mox marcescentia. Fasciculi radicales pauciores, nec valde cespitosi. Folia eorum culmeis tenuiora. Omnia læte viridia.

SPICA unica, simplicissima, androgyna, ex 12-15ve flosculis constans, superne mascula.

*) C. Spica submultiflora densiflora, floribus tristigmaticis, capsulis lanceolato-conicis convexo-planiusculis reflexis, arista filiformi longiuscula. Wahlenb. ex WILLDENOVIO.

GLUMÆ *masculæ* fasciculato-approximatæ, haud minus ac *fœminæ* numerosæ, sed paulo breviores, ovatæ, obtusissimæ, dorso subfuscæ, ad margines late albidæ pellucidæque. *Fœminæ* subdistantes, valde caducæ, fructibus fere duplo breviores, fuscæ, subopacæ, margine albido angusto auctæ, minus quam masculæ obtusæ. *Omnibus* nervus tenuis evanidus, striæque duæ prope basin.

FRUCTUS oblongi, ex basi conica subulati, subfusci, graciles, apice subcarioso, vaginanti, integro, dorso convexiusculi, inde compressi, lineam unam vel sesquilineam longi, lævissimi, patuli, demum retroflexi. *Arista* in fundo urceoli juxta basin seminis sessilis, linearis, apice subulata, lævis, ultra urceolum stylumque producta ut stigmata omnino lateraliter esse videantur! *Semen* albidum, triquetrum, urceolo vix duplo brevius. *Stylus* urceolo paulo longior aristam autem non adæquans. *Stigmata* tria, gracillima. (D. v.)

Rara. Hab. in *Valesiæ* alpihus australibus. Ad rivulos infra moles glaciales montis *Gex* in valle *Hermence*. Prope *Anniviers* in paludibus ultra casas *M. Praz* versus moles glaciales. Primus omnium ibi observavit eam amiciss. *L. THOMAS* anno 1806. — Hanc etiam cum dilecto discipulo *Jac. GAY* anno 1808 inter moles glaciales *M. Gries* et pulcherrimas *Tosæ* cataractas supra *Pommat* copiose reperimus. — Perennis. Fl. Junio et Jul.

Obs. *Arista* urceoli hæc species ab omnibus hucusque cognitis exinie differt. Spica ejus matura habitum fere prioris exhibet: at reliquis omnibus notis, etiamque fructuum forma, ab ea distinctissima est. Primus omnium hanc insignem plantam ante paucos annos in lateribus irriguis alpium *Lapponiæ septentrionalis* detexit ac *L. C.* descripsit *Cl. WAHLENBERG*.

6. *CAREX petræa* Wahlenberg. — *C. spica* androgyna superne longe mascula, glumis obtusissimis, fructu obovato longioribus, culmo acutangulo. (Gall. *Caret des rochers.*)

C. petræa Wahlenb. act. holm. 1803. p. 139 *)

Willd. Sp. pl. 4. p. 214. Pers. syn. 2. p. 535.

Schkuhr. Car. tab. Kkk. fig. 139. *C. rupestris* All. ped. tab. 92. fig. 1.

Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.

RADIX articulata, repens, cespitosa.

FOLIA rigida, sæpe falcato-curvata, glaucescentia, retrorsum scabriuscula, ad lineam unam lata, planiuscula, carinata, superne in acumen longiusculum subtriquetrum producta: *radicalia* culmo etiam fructifero plerumque longiora; *culmea* paucissima, ceteris consimilia, paulo tamen breviora.

CULMUS rigidus, glaucus, crassiusculus, acute triqueter, angulis superne scabriusculis, quandoque curvulus, basi tantum foliosus, 5-5 uncias longus.

SPICA simplicissima, unica, fere linearis, semuncialis, imbricata, superne plerumque longe mascula, flosculis masculis dense imbricatis, numerosis; foemineis laxius sitis, longe paucioribus, 4-7.

GLUMÆ masculæ subrotundæ, tenuissimæ, dorso spadiceæ, absque nitore, margine et superne late scariosæ, integrinseculæ, nervo crassiusculo, cito

*) *Carex spica* floribus tribus sparsis tristigmaticis masculisque numerosis instructa, squamis subcircinnatis magnis fragilissimis, capsulis turbinatis tenuissimis erectis, culmo acutangulo. WAHLENBERG, l. c. ex WILLDENOVIO.

evanescente. *Fœmineæ* fere duplo majores, rotundatæ, obtusissimæ, subuidentes, (valvulis exterioribus *Elynæ spicatae* simillimæ), tenuissimæ, fragilissimæ, dorso ex nigro spadiceæ, marginibus undique late scariosæ, apice subciliatæ, basi rachin amplexantes, concavæ, subtrinerviæ; nervis lateralibus obsoletis superne confluentibus, intermedio validiori, in glumis inferioribus quandoque in mucronulum producto. GLUMA ima plerumque mucronata vel aristata.

FRUCTUS tenues, glumis breviores, oblongi, obovati, triquetri, hinc convexi, inde concavi, rostellati, nervosi, ad angulos sæpe exasperati, viridiusculi, rostro brevi, tenuissimo, apice integerrimo. *Stigmata* tria. (D. v.)

In Helvetia rarissima. In rupibus herbidis promiscue cum *Carice ciliata* et *Elyna spicata* in M. d'Alesse qua ad juga superiora montis Fouilly adscenditur frequens. In montibus Gallen et Refel prope Zermatt. In M. Sanetsch. Perennis. Fl. Junio et Julio.

OBS. Hanc novam alpium nostrarum incolam anno 1806 cum amicissimis JAC. GAY et LUD. THOMASIO in loco natali observavimus et legimus. A *Carice* rupestri ALLIONII nonnisi foliis multo longioribus, glumis fœmineis obtusissimis, (nec acutiusculis aut aristatis), fructum superantibus, fructibusque ipsis obovatis (nec ellipticis), modice differre videtur, ut vix dubitem quin utraque planta ad unam eandemque speciem pertineat*). Nomen wahlenbergianum prætuli quia notæ a Cl. WAHLENBERGIO indicatæ multo melius quam descriptio ALLIONII cum nostra congruunt. Icon floræ pedemontanæ habitum tamen *petraeæ* nostræ haud male refert. Suam WAHLENBERGIUS in Lapponiæ septentrionalis alpihus detexit.

*) Specimina *C. rupestris* pedemontanæ quæ Cl. BALBEIS et BONJEAN hoc anno (1811) mecum in itinere italico humanissime communicaverunt, revera ex asse cum nostra *petraea* conveniunt.

* * *Spiculæ androgynæ apice masculæ. Stigmata duo.*

7. *CAREX intermedia*. Good. — *C. spiculis congesto-imbricatis, suprema infimisque foemineis, intermediis masculis.* N. (*Gall. Caret intermédiaire.*)


Carex Hall. helv. 1362. App. ad Scheuchz. Gram.
p. 40. n.º 8. *C. arenaria Sut. Fl. helv. 2. p. 242.*
C. intermedia Etr. de Fl. p. 102.



C. intermedia Smith brit. 972. Willd. Sp. pl. 4.
p. 224. *Hoffm. l. c. p. 191. Pers. syn. 2. p. 536.*
C. disticha Decand. 1703. C. spicata Lam. Enc. méth. 3. p. 381.



C. intermedia Schkuhr Car. 16. tab. B. fig. 7. Host
Gram. austr. 1. tab. 50. C. arenaria Leers herb.
tab. 15. fig. 2.



C. intermedia Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.
C. disticha Ehrh. Gram. exs. Dec. 5. n.º 48.

β. *Spicis inferioribus distantibus.*

Carex Hall. helv. 1363. App. ad Scheuchz. Gram.
p. 41. n.º 9. *C. uliginosa Sut. Fl. helv. 2. p. 242.*
(*non L.*)

C. arenaria (non L.) Etr. de Fl. p. 100.

RADIX repens, profunda.

FOLIA longa, culmo tamen breviora, lineam unam et ultra lata, carinata, læte viridia, ad carinam et margines aspera. *Culmea* radicalibus consimilia.

CULMUS dimidia parte inferiori foliosus, pedalis, cubitalis, acute triqueter, angulis scaber.

SPICA universalis, oblonga, obtusa, superne crassior, *spiculis* numerosis, ovalis, ferrugineis, in primis superne imbricato-congestis, inferne rarioribus, in β distantibus ut spica universalis plerumque elongata sit. *Spicula terminalis* et inferiores foemineæ; *intermediæ* masculæ. *Foliolum* viride ad basin spiculæ imæ, eaque longius. Spiculæ secunda, tertia et subinde etiam quarta, ejusmodi *foliolis*, sed plerumque ut et reliquæ spiculæ inferiores *bractea* ampla, ovata, scariosaque, in aristam viridem producta, instructæ sunt. In planta β et nonnunquam etiam in α spiculæ omnes tali bractea gaudent.

GLUMÆ ovatæ, acutæ, ferrugineæ, nervo dorsali tenui, viridi, ad apicem producto notatæ, margine angusto scarioso; demum ex flavo ferrugineæ.

FRUCTUS oblongi, acuti, hinc convexi, inde plani, utrinque striati, margine angusto, viridi serratoque alati, apice bifidi, glumis paulo longiores. *Stigmata* duo longa. (D. v.)

In paludibus non rara. Bernæ. Circa *Michelfelden*. *A Roche au pré-pourri*. Prope *Gland* agri *Neridunensis*. *A Divonne*, etc. β . Circa *Michelfelden* et *Perrière*. — Perennis. Fl. Aprilii et Majo.

Obs. Spiculis sexu distinctis ab omnibus ejus divisionis speciebus nostris differt. — *C. arenaria* L. ab ea spiculis acutis, supremis masculis, intermediis androgynis, fructuumque margine latiori basi que truncata abunde distinguitur. Hæc hucusque in Helvetia nunquam reperta fuit.

8. *CAREX chordorhiza* L. fil. — *C. spica* composita, spiculis glomeratis, bracteis ovato-acutis subæquantibus muticis, culmo basi subramoso. Schk. (Gall. *Caret rameux*.)

C. chordorhiza *Etr. de Fl.* p. 60.

~~~~~

*L. fil. suppl.* p. 414. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 219. *Pers. syn.* 2. p. 536. *Decand. Fl. fr.* 1711.

~~~~~

Schkuhr Car. n.º 17. tab. *G. Ji.* fig. 31.

~~~~~

*Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c. Dec.* 1.

**RADIX** filiformis, repens, articulata, squamosa.

**CULMUS** teretiusculus, superne obsolete angulosus, lævis, pedalis et altior, inferne tantum foliosus, crassiusculus, profunde striatus, versus basin ramulos 1, 2, 5ve steriles, foliolis fasciculatis paucis, ceteris multo angustioribus, rigidiusculis, semipedalibus vel longioribus instructos edens.

**FOLIA** reliqua omnia culmea, 1-2 lineas lata, plana, plerumque brevissima, vaginantia. *Vaginæ* imæ sæpius aphyllæ.

**SPICA** universalis pro plantæ magnitudine parva, ovata vel subrotunda, subinde oblonga, gracilisque, pallide ferruginea, *spiculis* ovato-acutis, satis numerosis, approximato-congestis, apice masculis. *Bracteæ* spicularum inferiorum ovato-acutæ, muticæ, spiculas fere æquantes, ferrugineæ, nervo dorsali tenui usque ad apicem producto.

GLUMÆ bracteis similes, sed minores, ferrugineæ, apice et marginibus anguste scariosæ.

FRUCTUS ovati, acuminato-rostrati, apice modo integro, modo leviter inciso. *Stigmata* duo (D. v.)

Rarissima. « Hab. in paludibus torfaceis *Juranis. Aux mairais des Ponts.* Etiam in pago *Vaudensi* Cl. DAVALLE plantam rarissimam, vixque nisi in *Suecia* lucusque observatam, invenit. » Doctiss. CHAILLET in epistola. Hac stirpe floram nostram ante nonnullos annos vir clarissimus ditavit. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

9. *CAREX foetida* All. — C. spica composita conglomerata subrotunda, bracteis aristatis, foliis planis. N. (Gall. *Caret fétide.*)

*Carex Hall. helv.* 1355. *Scheuchz. Gram.* 495. et *Prodr.* p. 18. tab. 4. fig. 3. *J. J. Scheuchz. itin. alp.* 458. fig. 18. *C. foetida Sut. Fl. helv.* 2. p. 241. *Etr. de Flore* p. 62.

*C. foetida All. pedem.* 2297. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 379. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 217. *Pers. syn.* 2. p. 535. *Vill. delph.* 2. p. 195. *Decand. Fl. fr.* 1710.

*Schkuhr Car. n.º* 16. tab. *Hh.* fig. 96. *Utriusque Scheuchzeri* fig. citatæ.

*Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX repens, articulata, squamosa.

FOLIA læte viridia, nitida, culmo saltem florente vix breviora, 2-3 lineas lata, firma, plana, carinato-plicata, marginibus et carina scabriuscula. *Radicalia* cespitosa,

**CULMUS** acute triquetus, sæpe curvulus, inferne tantum foliosus, ad angulos scaber, 5-6 uncias longus.

**SPICA** universalis, lata, brevis, obsoleta pentagona, vix tamen lobata, acutiuscula, saturate fusca. *Spiculæ* numerosæ, dense glomeratæ, androgynæ, apice masculæ, ovato-oblongæ, acutiusculæ. *Bractea* ad basin spicularum inferiorum ampla, scariosa, fusca, nervo valido in aristam producta.

**GLUMÆ** ovato-lanceolatæ, acutæ, carinatæ, concavæ, saturate fuscae, absque margine scarioso, nitidæ; demum pallidiores factæ nitorem amittunt. Nervus dorsalis tenuis in mucronulum productus, carina superne scabriuscula.

**FRUCTUS** fusci, oblongi, hinc convexi, inde planiusculi, obiter striati, angulis acutis, marginiformibus, angustissimis, lævibus, sensim in rostrum longum acutum, bifidum, ad margines exasperatum producti. *Stigmata* duo longissima. *Semen* ovatum, compressum, utrinque convexiusculum.

**HAB.** in locis herbidis humidiusculis summorum alpium. In *M. Arbignon*, *Fouty*, *Lionsen*, *Enzeindaz*, *Breven*, etc. In *M. Grimsulæ* cacumine. *Hall. fil.* In alpiibus *Uranivæ* et *Rhoetiæ*. In *M. Bernardino*, *Speluga*, etc. — Perennis. Fl. Jul. et Aug.

**OBS.** Species exemplo non solum in congeneribus, sed etiam in tota Graminum gente raro, recens odore peculiari, nobis autem non omnino ingrato, quem in loco natali sæpius antequam planta oculis discerni posset, percepimus, certo certius gaudet. Specimina etiam exsiccata mensem unum alterumve hunc odorem spargunt, sed diutius in herbario servata, eum sensim sensimque amittunt. Hinc bene summus noster **HALLERUS**: « recens siccaque foetet. »

10. *CAREX juncifolia* All. — *C. spica* subrotunda, glumis late scariosis, foliis setaceo-canaliculatis, culmo teretiusculo, radice repente. N. (Gall. *Caret à feuilles de jonc.*)

*Carex* Hall. *helv.* 1354. *Scheuchz. Gram.* p. 492. tab. 11. fig. 7 ?? *C. juncifolia* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 241. *Etr. de Flore* p. 64.

~~~~~  
C. juncifolia Decand. *Fl. fr.* 1712. *Pers. syn.* 2. p. 536.

C. incurva Lightf. 544. *Smith brit.* 971. *Good. Car.* n.º 9. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 217.

~~~~~  
*C. juncifolia* All. *pedem.* 2296. tab. 92. fig. 4. *C. incurva* Schk. *Car.* n.º 19. tab. *Hh.* fig. 95. *Fl. dan.* tab. 432.

~~~~~  
C. juncifolia Thom. *l. c.* p. 13. *C. incurva* Schleich. *l. c.* p. 9. *Seringe l. c. Dec.* 1.

RADIX valde repens, elongationibus articulato-squamosis, crassiusculis, sublignosis.

CULMI 1-4 uncias longi, erecti, quandoque curvuli vel inclinati, firmi, crassiusculi, subteretes, profunde striati, lævissimi, nonnisi prope basin foliosi.

FOLIA radicalia in quovis fasciculo pauca, inæqualia, rigidiuscula, fere lævia, marginibus tamen superne scabriusculis, subsetacea, canaliculata, tertiam vel dimidiam lineæ partem lata, apud nos vix striata. Culmea consimilia, vaginantia. Vaginæ exteriores dilatatae, fuscae vel albidæ, solutæ; interiores tubulosæ.

SPICA universalis subrotunda, lata, obtusa, fusca, demum ex albo et nigro varia. *Spiculæ* dense congestæ, subrotundæ, apice masculæ. *Flosculi* foeminei masculis numerosiores. *Bracteæ* ovatæ, amplæ, fuscæ, marginibus late scariosæ, apice sæpe emarginatæ, plerumque aristatæ, spiculis breviores.

GLUMÆ valde latæ, ovatæ, obtusæ, demum albescentes lateque scariosæ, quandoque apice emarginatæ, nervo tenui subiinde in mucronem producto. *Antheræ* brevissime mucronatæ.

FRUCTUS ovati, mucronati, hinc valde gibbi, inde planiusculi, apice scarioso, integro, marginibus lævibus vel superne obiter scabris. *Semen* utrinque convexum, subfuscum. *Stigmata* duo. (D. v.)

Rarissima. Hab. in alpium editissimarum solo granitico micaceo. In M. Sylvio, Gallen et Refel supra Zermatt. (In M. Gothardo. HALLER. Suam in alpihus rhæticiis rarius, præcipue in M. Sursees vallis sexamniensis (Schamsenthal) invenit SCHEUCHZERUS.) In itinere nostro rhætico anni præteriti (1808) nostram ad rivulum inter Nufenen et Hinterrhein in valle Rheinwald amiciss. J. GAY legit. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

OBS. De plantis SCHEUCHZERI et HALLERI minus constat an hoc vel potius ad *C. curvulam* referendæ sint. Species SCHEUCHZERI ipso monente achratissimo Viro trigyna est, nostra autem certo certius digyna. Nomen *incurvæ* propter ejus similitudinem cum nomine *C. curvulæ* repudiavimus.

11. *CAREX paniculata*. L. — *C. spica* paniculata, fructibus oblongo-rostratis hinc convexis inde planiusculis, culmo acute triquetro. N. (Gall. *Caret paniculé*.)

Carex Hall. helv. 1365. Scheuchz. Gram. 499.

C. paniculata *Sut. Fl. helv.* 2. p. 246. *Etr. de Fl.* p. 67.



C. paniculata *L. Sp. pl.* 1383. *Smith brit.* 978. *Lam. Enc. méth.* p. 384. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 244. *Pers. syn.* 539. *Hoffm. germ. l. c.* p. 197. *Decand. Fl. fr.* 1715. *Vill. delph.* 2. p. 202?



Host Gram. austr. 1. tab. 58. *Schl. Car. n.º* 24. tab. *D. N. fig.* 20. *Scheuchz. Prodr.* tab. 8. fig. 2.



Schleich. l. c. p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX fusca, crassa, lignosa, maxime cespitosa.

FOLIA culmo florente longiora, fructifero breviora, ad 2 lineas lata, firma, dura, apice triquetra, carinato-plicata, margine carinaque scabra, læte viridia. *Fasciculi* radicales cespitosi, basi *vaginis* pluribus imbricatis, oblongis, obtusis, aphyllis, profunde striatis, atro-fuscis nitidisque instructi.

CULMI acute triquetri, faciebus planis, ad angulos scaberrimi, foliosi, demum cubitales et tripedales.

SPICA apice nutans, supradecomposita, paniculato-ramosa, laxiuscula, valde multiflora, 5-7 uncias longa, ramis alternis, conspicuis, erectiusculis, angulosis, plus minusve distantibus; inferioribus basi nudiusculis, 2-4 uncias longis. Spicæ partiales compositæ, sessiles, oblongæ. Spiculæ contiguæ, appressæ, ovatæ, multifloræ, apice masculæ, juniores pallide ferrugineæ, demum ex fusco griscæ.

Bracteæ ad basin ramorum ovatæ, acutæ, carina

scabræ , fuscæ , margine scarioso : inferiores in *aristam* viridem , scabram , longissimam productæ. *Flores masculi* numerosi , terminales , *fœminei* pauciores.

GLUMÆ ovato-acutæ , carinatæ , nervo dorsali viridi , deinde luteo , evanido , pallide fuscæ , etiam virgineæ margine late scarioso , griseo cinctæ , ut spiculæ ex griseo et fusco variegatæ sint.

FRUCTUS parvi , nitentes , subdivergentes , viriduli vel subfasci , oblongi , hinc gibbi , inde planiusculi , facie striati , superne cartilagineo-albidi , compressiusculi , ad angulos scabri , apice bifidi. *Stigmata* duo , elongata. (D. v.)

Hab in pratis uliginosis. Prope *Clarenset Coinsins* agri *Nevidunensis*. Ad lacunam sylvæ *Sedelbach. Friedlingæ* ad *Birsam. A Renan ; à l'Echelette , aux môrais de Goudéba*. Ad adscensum *M. Regii* etc. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

12. *CAREX teretiuscula* Good. — C. spica sub-supradecomposita coarctata , fructibus extus gibbis , culmi faciebus convexis radice repente. N. (Gall. *Caret arrondi.*)

Carex *Hall. helv.* 1368 § ? *Scheuchz. Gram.* 501 ?

C. diandra *Sut. Fl. helv.* 2. p. 246. C. teretiuscula *Etr. de Fl.* 10.

~~~~~

C. teretiuscula *Good. Car. n.º* 16. *Smith brit.* 977.

*Hoffm. l. c.* p. 196. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 244.

*Pers. syn.* 2. p. 539.

~~~~~

Schkuhr Car. n.º 22. tab. D. fig. 19 et 96.

~~~~~

*Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

**RADIX** repens , per intervalla cespites parvos efficiens.

**FOLIA** fere prioris , angustiora , apice triquetra.

**CULMI** foliosi, minus quam prioris nec nisi superne scabri, acute quidem triquetri, sed faciebus prominulis convexiusculisque, pedales, bipedales.

**SPICA** vix ultra 5 uncias longa, ovato-oblonga, composita vel quandoque supradecomposita, semper contracta: *ramuli* fere semper undique floriferi, alterni. *Spicæ* partiales, sessiles: superiores contiguæ; inferiores minus approximatæ, sic tamen ut cujusque apex superioris basin attingat aut superet. *Bracteæ* glumis similes, latius tamen scariosæ; inferiores in aristam viridem scabriusculam, spica partiali breviorē productæ.

**GLUMÆ** juniores ferrugineo-rubellæ, demum subfuscae, margine angusto albido scarioso, ovatæ, acutæ, nervo usque ad apicem excurrente. *Stamina* certe tria.

**FRUCTUS** fuscī, nitidī, parvī, superne cartilagineo-albidi, hinc valde gibbi, inde planiusculi et exstriati, ad angulos superne hispidi, apice brevissime bidentati, vel sæpius integriusculi. *Semen* orbiculatum, hinc gibbum, inde convexiusculum. *Stigmata* duo. (D. v.)

Hab. in uliginosis. Eam frequentem ad lacus *Felini* littore torfaceo, ubi suam SCHUCHZERTS jam observaverat, invenimus. Prope *Neccomum*. CHAILLET. Circa *Bernam*. SERINGE. In *M. Jorogne* supra *Bex*. SCHLEICHER. *Aux mossettes de Grion*. L. THOMAS. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

*Obs.* Species priori utique simillima. A *paniculata* præcipue cespitibus raris, culmo, spica, statura, et glumis anguste scariosis, ferrugineisque differt, fructibus autem convenit, licet in illa dorso plerumque gibbosiores sint.

15. *CAREX paradoxa* Willd. — C. spica supra decomposita laxiuscula, fructibus utrinque gibbis, culmi faciebus convexis. N. (Gall. *Caret changeant*.)

C. *paradoxa* Willd. *Sp. pl.* 4. p. 243. *Pers. syn.* 2. p. 539. *Hoffm. germ. l. c.* p. 196. *Decand. Fl. fr.* n.º 1714.

~~~~~

C. *paradoxa*. Willd. *act. berol.* 1794. p. 32. tab. 1. fig. 1. *Schkuhr Car.* p. 336. n.º 23. tab. E. fig. 21.

C. *canescens* Host *Gram. austr.* 1. tab. 57.

~~~~~

C. *paradoxa* Schleich. *l. c.* p. 9. Thom. *l. c.* p. 13. *Apuđ amiciss. SERINGE etiam exsiccata prostat.* C. *paniculata* Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 7. n.º 69. (Ex Hoffm.)

« RADIX fusca, lignosa, valde cespitosa. » HOST.  
CULMUS fere prioris, fructifer valde elongatus, cubitalis.

FOLIA ut in *teretiuscula*, potius tamen latiora.

SPICA supradecomposita, demum laxiuscula, subinde paniculato-ramosa, ante anthesin tota fusca (qua nota a duabus prioribus facile dignoscitur); deinde autem omnino canescit, et sibi prorsus dissimilis evadit. *Spicæ* partiales ramulo proprio plerumque insidentes, nec in rachi communi sessiles, ex *spiculis* multis androgynis, sessilibus, ovato-oblongis compositæ. *Bracteæ* ut in prioribus.

GLUMÆ oblongæ , acutæ , sæpe mucronatæ , ante florescentiam totæ fuscæ , nec ad margines scariosæ ; florentes margine albido angusto instructæ , demum fere integræ canescentes.

FRUCTUS ovati , inferne subglobosi , superne cartilagineo-albidi , utrinque gibbo-ventricosi striatique , fusci , nitentes , ad angulos superne hispidiusculi , apice integri vel bidentati. *Stigmata* duo ( D. s. )

Exempla multa hujus in Helvetia rarioris plantæ nondum florentia , florentia et fructifera in paludibus circa *Gümlingen* in agro *Bernensi* inventa , benigne nobiscum communicavit Cl. SERINGE. Circa *Bex*. SCHLEICHER et THOMAS. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

OBS. A prioribus duabus caute distinguenda. Habitum fere *teretiusculæ* refert , spica tamen excepta , qua subinde magis cum *paniculata* convenire videtur. Spicæ ejus partiales florentes , graciliores et acutiores sunt quam in illis.

14. *CAREX vulpina*. L. — C. spica supradecomposita compacta , fructibus divergentibus , culmo angulis complanatis acutissimis. N. ( Gall. *Caret compacte*. )

*Carex* Hall. helv. 1364. App. ad Scheuchz. Gram. n.º 10. C. vulpina Sut. Fl. helv. 2. p. 243. Etr. de Fl. p. 72.



C. vulpina L. Sp. pl. 1382. Smith brit. 976. Hoffm. l. c. p. 192. Lam. Enc. méth. 3. p. 382. Var. α. Willd. Sp. pl. 4. p. 231. Pers. syn. 2. p. 537. Good. Car. n.º 15.



*Schkuhr Car. n.º 10. tab. C. fig. 10. Host Gram. austr. 1. tab. 56. Fl. dan. tab. 308. Leers herb. p. 199. tab. 14. fig. 5.*



*Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13. Ehrh. Gram. exs. Dec. 9. n.º 87.*

β. Spica elongata, spicis partialibus divulsis.

RADIX fibrosa, cespitosa.

FOLIA plana, 2-5 lineas lata, inæqualia, culmum saltem florentem æquantia vel superantia, læte viridia, marginibus carinaque scabra.

CULMI inferne foliosi, erecti, sesquipediales vel cubitales, acutissime triquetri, faciebus subexcavatis, angulis latis complanatisque, ut digitis pressi facile cedant et comprimantur.

SPICA 12-15 lineas longa, ex 5-8 spicis partialibus composita, oblonga, obtusa, plerumque compacta, basi tamen laxior, in var. β ad 5 uncias longa, et interrupta. *Spicæ partiales* compositæ vel decompositæ, compactæ, subsessiles. *Spiculæ* numerosæ, androgynæ, apice masculæ, sessiles, florentes ex fusco et ferrugineo virides, deinde viridiores vel flavescentes. Ad basin spicularum partialium inferiorum *foliolum* viride, lineare, asperum, (iussum spicam totam subinde superans); vel *bractea* ovata, brevis, quandoque scariosa vel fusca, in aristam scabram, plus minusve longam producta.

GLUMÆ ovatæ, acuminatæ, dorso ferrugineæ, marginibus viridibus latis instructæ, nervo dorsali viridi, valido.



FRUCTUS oblongo-triangulares, ad angulos scabri, hinc convexi, inde planiusculi, striati, viridiusculi, mucrone duro longo, bidentato, mature valde divergentes, ut totæ spicæ squarrosæ fiant. *Stigmata* duo. (D. v.)

Communis ad sepes et secus vias, locis humidis et aqualicis.  
— Perennis. Fl. Aprili et Majo.

15. *CAREX muricata*. L. — C. spica interrupta subcylindrica squarrosa, fructibus scabris divergentibus, culmo trigono. N. (Call. *Carèt des haies*.)

*Carex Hall. helv.* 1365. *Scheuchz. Gram.* 488. tab.

11. fig. 5. C. *muricata* *Sut. Fl. helv.* 2. p. 243.

*Etr. de Fl.* p. 73.

~~~~~

C. *muricata* L. *Sp. pl.* 1382. *Smith brit.* 976. *Willd.*

Sp. pl. 4. p. 231. *Pers. syn.* 2. p. 538. *Decand.*

Fl. fr. 1705. *Hoffm. l. c.* p. 194.

~~~~~

*Schkuhr. Car.* n.º 13. tab. E. Dd. fig. 22. *Host*

*Gram. austr.* 1. tab. 54. C. *canescens*. *Leers herb.*

p. 201. tab. 14. fig. 3.

~~~~~

C. *muricata* *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

Ehrh. Gram. exs. Dec. 10. n.º. 97.

β. Spiculis paucissimis (1-3) simplicibus, foliis cespitosis, recurvo-pendulis.

Etr. de Flore l. c. β.

γ. Alpina. Spiculis paucioribus simplicibus, culmo humili, foliis firmulis, erectis.

Carex loliacea (non L.) *Schkuhr. Car.* p. 22. n.º 14.

tab. *Ee* fig. 91 et *C. muricata* β. *Ejusd. Nachtr.*
p. 12. n.º 29. *)

RADIX fibrosa.

CULMI trigoni, faciebus planis, firmi, duri, graciles, pedales vel sesquipedales, superne nudi, ad angulos scabri.

FOLIA vix ultra lineam lata, culmo modo breviora, modo longiora, carinata, margine carinaeque scabriuscula.

SPICA subcylindrica, obtusa, ex 6-8 spicis partialibus constans, uncialis vel paulo longior. *Spicæ* partiales (*spiculæ*) subsessiles, maturæ ovato-squarrosæ, apud nos plerumque omnes sessiles, androgynæ: *inferiores* distinctæ, quandoque subremotæ, confluentes. *Flosculi masculi* pauciores ad apicem spicularum. *Bracteæ* virides vel scariosæ, ovatæ, rarius muticæ, vulgo in foliolum setaceum plus minusve longum (in spicula infima quandoque binciale, in ceteris multo brevius) productæ.

GLUMÆ pallide ferruginæ, ad margines subscarescenti-viridulæ, nervo dorsali valido donatæ, ovato-lanceolatæ, concavæ, mucronulatæ, carina subinde exasperatæ.

FRUCTUS virides, oblongi, attenuati, hinc convexi, inde planiusculi, marginati, superne ad angulos minute exasperati, apice bidentati, horizontales, et fere stellulati patuli. *Stigmata* duo. *Antheræ* mucronulatæ. (D. v.)

*) Ex speciminibus quæ Vir Cl. manu propria nomine insignivit, nobiscum ab amiciss. SCHLEICHERO benigne communicatis.

β. FOLIA valde cespitosa, numerosa, culmum etiam fructiferum semper superantia, lacte viridia, tenera extrorsum recurvo-pendula.

CULMI gracillimi, debiles, nutantes, scabri, non nisi versus basin foliosi.

SPICULÆ simplices, 1-5ve, distinctæ, subrotundæ, paucifloræ, maturæ stellulatæ. Cetera fere prioris. (D. v.) An species propria?

γ. FOLIA erecta, latiuscula, firmula, fere ut in planta α.

CULMI adulti semipedales, crassiores scabriorisque, erecti.

SPICULÆ 4-6, simplices, subrotundæ, stellulatæ, pulchellæ; inferiores distinctæ, subremotæ: superiores confluentes.

GLUMÆ (in planta adulta) saturate ferrugineæ, ad margines angustissime scariosis. *Fructus* virides.

HABITUS a vulgari plane alienus. (D. s.)

α. Vulgaris ad sepes et in sylvis. β. In sylvis editioribus M. Juræ, v. g. supra *Arsier*. Circa *Neocomum* Cl. CHAILLET. γ. In alpinis rariis. In M. *Fouly*. SCHLEICHER. — Perennis. α Fl. Maio et Junio. β et γ æstate.

Obs. A priori spica oblonga, graciliori, interrupta, spiculis plerumque simplicibus, et præcipue culmo trigono, graciliori primo intuitu dignoscitur.

16. *CAREX divulsa*. Good. — C. spica elongata subdecomposita basi subramosa: spiculis inferioribus remotis compositis, fructibus patentibus. N. (Gall. *Caret interrompu*.)

Carex loliacea? Sut. *Fl. helv.* 2. p. 245. (ob. Michel. tab. 33. fig. 10. *quam et summus HALLERUS ad priorem refert*).



C. divulsa Good. *Car.* n.^o 14. *Smith brit.* 975. *Hoffm. germ. l. c.* p. 194. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 255. *Pers. syn.* 2. p. 538. *Decand. Fl. fr.* 1707.



Host Gram. austr. 1. tab. 55. *Michel. Gen.* 69. tab. 33. fig. 10. *Schkuhr Car.* p. 324. n.^o 12. tab. *Dd.* fig. 89. (*Descr. ex MICHELIO, figura ex GOODENOUGH*). *EjUSD. Nachtr.* p. 15. n.^o 35.



Schleich. l. c. p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX fere prioris. Sic et CULMI apice tamen nutantes potiusque longiores.

FOLIA sesquilineam ad 2 lineas lata, facie sæpino crispula, culinis plerumque longiora. *Vaginæ* tubulosæ, foliis pallidiores, « superiores facie scariosæ et minutissime crispatæ. » HOST.

SPICA elongata, inferne valde interrupta, 5-4-uncialis. *Spicæ partiales* 6-8-12, ovatæ, maturæ minus quam prioris squarrosæ: supremæ sessiles, simplices, approximatae, contiguæ vel fere confluentes; intermediæ distantes vel remotæ, sæpe compositæ: infimæ 1-2-5ve, remotæ, compositæ, ramulo proprio brevi insidentes, ex spiculis 2-4-6 constantes. *Bracteæ* apud nos minus quam in priori conspicuæ, in foliolum setaceum angustissimum productæ.

GLUMÆ scariosæ, albidæ vel pallidius ferruginæ, ovatæ, acuminatæ vel mucronulatæ.

FRUCTUS fere prioris, sed paulo majores, erecto-patentes, inferne læves, marginati, bidentati, collo

latiore longioreque , glumis longiores. *Semen* in utraque specie orbiculatum, lenticulare. *Stigmata* duo. *Antheræ* mucronulatæ. (D. s.)

In sylvis et sepibus rarius. Circa *Bex*. THOMAS et SCHLEICHER. *Bernæ*. SERINGE. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

Obs. Habitus præcedentis , a qua fortasse nimis argute separatur. Plantam nostram pro *divulsa* Good agnoscit Cl. SCHKUHR: V. Nachtr. l. c. Sed nescio cur de specie HOSTII dubitet , quæ cum speciminibus nostris optime convenire videtur. GOODENOVIUS *divulsæ* glumas fructibus longiores tribuit.

* * * *Spiculæ androgynæ , apice foemineæ.*
Stigmata duo.

17. *CAREX bicolor* All. — C. spicis subternis : terminali basi mascula , inferioribus foemineis subpedunculatis , fructibus obovatis obtusissimis mucronulatis. N. (Gall. *Caret d'Allion.*)

Carex Hall. helv. 1369 β. *C. bicolor* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 254. *Etr. de Flore* p. 97.

~~~~~  
*All. Fl. pedem.* 2311. *Pers. syn.* 2. p. 536. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 222. *Decand. Fl. fr.* 1724\*. tom. 3. p. 721. *in add. C. androgyna* Balb. *add.* 97 *et Misc.* 42.

~~~~~  
C. bicolor Schkuhr *Nachtr.* p. 16. n.^o 41. tab. *Aaaa* fig. 181. (*mediocris.*)

~~~~~  
*Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c.* Dec. 1.

RADIX fere repens , stolonifera.

II.

7.

FOLIA lineari-lanceolata, plana, apice tamen fere triquetra, vix ultra lineam lata, superne tantum marginibus carinaque scabriuscula.

CULMUS digitalis, vix unquam semipedalis, subtrigonus, faciebus nempe convexis, primum erectus, demum sæpe superne ob pondus spicarum nitans, inferne foliosus, foliis longior.

SPICÆ plerumque ternæ, rarius quaternæ, ovato-oblongæ, obtusæ, florentes atro-fuscae, maturæ ex albo et fusco eleganter variegatæ: *terminalis* reliquis paulo longior, 3-4 uncias longa, androgyna, floribus nempe masculis paucioribus ad basin, reliquis longe pluribus foemineis: *spicæ* ceteræ plerumque totæ foemineæ, subpedunculatæ plus minusve approximatae; infima quandoque distans et longius pedunculata, subinde etiam remotissima, ex axilla folii oriens et pedunculo longissimo insidens. *Foliolum* florale pro bractea, infra spicam infimam, vagina brevi partem pedunculi tegente instructum, spicas plerumque superans.

GLUMÆ ovatae, obtusæ, subinde obiter emarginatae, vix carinatae, atro-purpureae; nervo dorsali valido, prominulo, viridulo vel albido, infra apicem evanido.

FRUCTUS albidus, compressus, obovatus, ad basin attenuato-pedicellatus, obtusissimi, brevissime mucronulati, per lentem validiorem minutissime sed dense muricati, apice integerrimi. Semen lenticulare, utrinque complanatum. *Stigmata* duo. (D. v.)

Rarissima. Hab. in summis alpibus primariis, locis herbosis.

— In M. *Oberstafel* et supra vallem D. *Nicolai* in Va-



Iesia. HALLER. In M. *Sylvio*. LUD. THOMAS. In M. *Gétroz* et *Tzermotanaz* supra vallem *Bagnes*. — Perennis. Fl. Jul. et Aug.

18. *CAREX remota*. L. — C. spiculis solitariis remotis subsessilibus, foliis culmum superantibus. N. (Gall. *Caret espacé*.)

*Carex Hall* *helv.* 1357. *Scheuchz. Gram.* 483. C. *remota* *Sut. Fl. helv.* 2. p. 245.

~~~~~

C. *remota*. L. *Sp. pl.* 1383. *Good. Car.* n.º 7. *Smith brit.* 969. *Hoffm. l. c.* p. 204. *Decand. Fl. fr.* 1723. *Pers. syn.* 2. p. 538. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 239.

~~~~~

*Schkuhr Car.* p. 46. tab. *E.* fig. 23. *Leers herb.* p. 200. tab. 15. fig. 1. *Fl. dan.* tab. 370. *Host Gram. austr.* 1. tab. 52.

~~~~~

Ehrh. Gram. exs. Dec. 6. n.º 58. *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX fibrosa, alba, dense cespitosa.

CULMI graciles, foliosi, teretiusculi, superne obscure trigoni et scabriusculi, florentes fere pedales, demum elongati, nutantes.

FOLIA læte viridia, canaliculato-carinata, longa, culmo tamen fructifero breviora, vix ultra lineam lata, margine scabra.

SPICA longissima, valde interrupta, ætate nutans. *Spiculæ* solitariae, 6 - 8, parvæ, multifloræ, ovato-oblongæ, acutæ, apud nos exacte sessiles, albidæ: inferiores tres vel quatuor valde remotæ, axillares; ceteræ approximatae, nudiusculæ. Ad basin inferiorum *folium* patens, sessile, evaginatum,

culmum plerumque superans. *Bracteæ* reliquarum spicularum glumis similes : inferiores quandoque in aristam brevem productæ. *Flores masculi* pauci ad basin spicularum.

GLUMÆ ovatæ, acutiusculæ, scarioso-pellucidæ, albidæ, nervo dorsali tenui, viridi.

FRUCTUS pallide virentes, ovati, acuti, hinc convexiusculi, inde plani, ad angulos exasperati, apice in una eademque planta modo integri, modo per lentem brevissime bidentati. *Stigmata* duo. (D. v.)

Hab. locis umbrosis et aquaticis hinc inde. In sylva *Bremgarten*. *Au Pré-pourri à Roche*. *Basileæ* extra portam *Riehanam*. HALLER. Circa *Tigurum* ad rivulos, vulgo. SCHEUCHZERUS. *Neocomi*. CL. CHAILLET. In *Valesia*. REV. MURITH. In via quadam cava prope fontem acidulum circa *Bénex* in agro *nevidunensi*. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

19. *CAREX stellulata* Good. — C. spica interrupta spiculis paucis, fructibus stellatim divergentibus, foliis canaliculatis. N. (Gall. *Caret étoilé*.)

Carex Hall. *helv.* 1366. Scheuchz. *Gram.* 485. tab. 11. fig. 3. C. *echinata* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 244. *Etr. de Fl.* p. 76.



C. *stellulata*. Good. *Car.* n.º 4. *Smith brit.* 966. *Hoffm. l. c.* p. 203. *Decand. Fl. fr.* 1722. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 236. *Pers. syn.* 2. p. 538.



C. *stellulata* Schkuhr *Car.* n.º 34. Tab. C. fig. 14. *Host Gram. austr.* 1. tab. 53. C. *muricata* *Leers herb.* p. 200. tab. 14. fig. 8. *Fl. dan.* tab. 284.



C. stellulata Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.

Carex echinata Ehrh. Gram. exs. Dec. 7. n° 68.

RADIX fibrosa, lignescens, tenacissima, cespitosa.

FOLIA firma, saturate viridia, vix ultra lineam lata, canaliculata, dorso convexiuscula, superne subtriquetra et scabriuscula.

CULMI foliis altiores, 4-10 uncias longi, obscure trigoni, quandoque teretiusculi et quasi hexagoni, basi foliosi, læves nec nisi superne ad angulos scabriusculi.

SPICA ex *spiculis* 3-4ve remotiusculis, brevibus, subrotundis, 4-12-floris, maturis stellatim squarrosis sessilibusque constans. *Spicula* terminalis reliquis longior, tota parte dimidia inferiori mascula. *Flores masculi* in spiculis ceteris perpauci, basi insidentes. *Bractea* ima plerumque in foliolum angustum spiculam superans producta.

GLUMÆ *masculæ* ovato-lanceolatae, acutiusculæ, albidæ; *foemineæ* ovatae, fuscae, margine scarioso albo, fructibus breviores, nervo dorsali valido, viridi.

FRUCTUS versus basin dilatati, ovati, undique divaricati, virides, marginati, apice brevissime bidentati, ad angulos exasperati, hinc convexi, inde plani. *Stigmata* duo. (D. v.)

In Helvetia non vulgaris. Hab. in paludibus. Ad littora lacus Felini. SCHEUCHZ. In M. Jura supra Bonmont. *Entre le Bois-Bougi et Bel-air*, prope Nevidunum, etc. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

20. *CAREX brizoides* L. — C. spica composita subdisticha nuda, spiculis contiguis subcylindricis acutiusculis curvulis, fructibus marginatis divergentibus. N. (Gall. *Caret brizoïde.*)

Carex Hall. *helv.* 1358. *App. ad Scheuchz. Gram.* p. 40. n.º 6. C. *brizoides* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 244. *Etr. de Fl.* p. 82.

~~~~~  
C. *brizoides* L. *Sp. pl.* 1381. *Pers. syn.* 2. p. 538. *Hoffm. l. c.* p. 202. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 233. *Vill. delph.* 2. p. 199 ?? (*vix hujus loci.*)

~~~~~  
Schkuhr Car. n.º 33. tab. C. et U. fig. 12. *Host Gram. austr.* 1. tab. 47.

~~~~~  
*Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c.* Dec. 1.

RADIX dura, repens. \*)

FOLIA cespitosa, plana, carinata, lineam unam lata, culmum florentem æquantia vel superantia: exteriora brevissima, *vaginis* fuscis vel subfuscis.

CULMI basi tantum vaginati et foliosi, ceterum longissime nudi, triquetri, gracillimi, fructiferi incurvi vel nutantes, superne ad angulos scabri, pedales vel cubitales.

SPICA brevis, vix uncialis; *spiculæ* 5-9, distichalternæ, in eodem fere plano positæ, omnes distinctissimæ sed approximato-contiguæ, graciles sed compactæ, subpatentes, subinde curvulæ (ut spi-

---

\*) Nec ut dicit Cl. CANDOLLIUS fibrosa.

culæ *Bromi pinnati*), ex tereti subulatæ, acutiusculæ.

FLORES masculi ad basin spicularum satis numerosi. *Bracteæ* a glumis vix distinguendæ; in spiculis inferioribus tamen quandoque in *aristam* brevem productæ.

GLUMÆ ovato-oblongæ, obtusæ, nitidæ, scariosæ, albidæ vel ex albido virentes, demum fuscescentes, ad nervum dorsalem viridem subevanidum sæpe superne exasperatæ.

FRUCTUS virides, margine angustissimo viridi scabroque instructi, divergentes, gluma multo longiores, elongati, a basi usque ad apicem sensim attenuati, apice bifidi. *Stigmata* duo. (D. v.)

Hab. in sylvis humidis, ad rivulos, non ubique. [In M. Muteto. C. B. In alpihus *Bernensibus* et *Aquilejensibus*. *Sur la Tour d'Ay*. Basileæ prope portam *Riehanam*; *bey der Schorenbrücke*; versus *Friedlingen*. HALLER. In M. *Gemmio*. SUTER. Circa *Zoffingen*. SERINGE. In sylvula ad lacum prope *Herzogenbuchsee*. Copiose. Inter *Ponte di Teso* et *Luino*. — Perennis. Fl. Junio.

21. *CAREX elongata* L. — C. spiculis numerosis nudis cylindricis multifloris, fructibus subdivergentibus oblongis subintegerrimis, glumis coloratis. N. (Gall. *Caret alongé*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1359. *Scheuchz. Gram.* 487. tab. 11. fig. 4. *C. elongata* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 245. *Etr. de Fl.* p. 91. *C. multiceps*. *Etr. de Fl.* p. 78.



*C. elongata* L. *Sp. pl.* 1383. *Hoffm. l. c.* p. 205. *Pers. syn.* 2. p. 539. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 240. *Decand. Fl. fr.* 1724.

~~~~~  
Schkuhr Car. n.º 39. tab. E. fig. 25. Host Gram. austr. 3. tab. 79.
 ~~~~~

*Thom. l. c. p. 13. Seringe l. c. Dec. 1. C. elongata et C. Gebhardi Schleich l. c. p. 9 \*). C. multiculmis Ehrh. Gram. exs. Dec. 8. n.º 88.*

**RADIX** repens, nigrescens, valde cespitosa.

**FOLIA** *radicalia* fasciculato-cespitosa, numerosa, dilute viridia, erecta, plana vel carinato-plicata, dorso bisulcata, sesquilineam lata, culmum etiam fructiferum æquantia vel superantia, margine carinaque scabra. *Culmea* panicula, consimilia.

**CULMI** multi, triquetri, superne longe nudi, apice demum nutantes, pedales vel sesquipedales, ad angulos asperrimi.

**SPICA** uncialis et biancialis, pulchra, vix interrupta, ætate subinde nutans. **SPICULÆ** androgynæ, 6-9-12, cylindricæ, sessiles, nudiusculæ, coloratæ, maturæ subsquarrosæ, multifloræ, quoad punctum insertionis remotiusculæ, sic tamen ut apex cujusvis proximæ basin attingat: *terminalis* dimidia parte inferiori mascula; in ceteris flores masculi ad basin pauciores. *Bracteæ* parvæ, glumis fere similes: infima nervo dorsali rarius in *aristam* sen *foliolum* angustissimum, spica brevius producta.

---

\*) *C. Gebhardi* Schleich. ab *elongata* nobis neutiquam differre videtur, nec bene convenit cum planta à WILDENOVIO SCHKURIOQUE descripta et delineata, quæ et ipsa forte mera varietas nostræ erit.



GLUMÆ ovato-lanceolatæ, modo acutæ, modo obtusæ, ex fusco rubellæ, margine angusto albido, nervo dorsali prominulo, viridi, evanido.


FRUCTUS subfusci, glumis multo longiores, oblongi, subulati, versus basin etiam attenuati, striati, margine proprio plane destituti, hinc convexi, inde planiusculi, ad angulos superne paulisper exasperati, obtusiusculi, apice integerrimi vel obiter emarginati.

SEMEN ellipticum, utrinque convexiusculum. *Stigmata* duo (D. v.)

Rara. Habitat in paludibus umbrosis. In M. Jura. SCHLEICHER. *Près de la Tour de Gource*. J. GAY. *Entre Bel-air et le bois Bougi* prope Nevidunum. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

22. *CAREX leporina* L. — C. spiculis subnudis ovalibus obtusis alternis approximatis, fructibus marginatis, culmo fistuloso. N. (Gall. *Caret ovale*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1361. Scheuchz. *Gram.* 456. tab. 10. fig. 15. *C. leporina* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 243. *C. ovalis* Etr. de *Fl.* p. 80.



*C. leporina* L. *Sp. pl.* 1381. Vill. *delph.* 2. p. 200. Lam. *Enc. méth.* 3. p. 382. Wahlenb. in *Act. holm.* 1803. p. 145.

*C. ovalis* Good. *Car. n.º* 6. Smith *brit.* 968. Pers. *syn.* 2. p. 537. Hoffm. *l. c.* p. 199. Decand. *Fl. fr.* 1718. Willd. *Sp. pl.* 4. p. 229.



*C. leporina* Leers *herb.* p. 199. tab. 14. fig. 6. C.

ovalis *Schk. Car. n.º 29. tab. B. fig. 8. Host Gram. austr. 1. tab. 51.*



*C. ovalis Thom. l. c. p. 13. Seringe l. c. Dec 1. \*).*

**RADIX** dense fibrosa, demum lignescens descendensque, neuliquam repens, multiceps.

**FOLIA** lineam lata, margine et carina scabriuscula, plana, saturate viridia.

**CULMI** 6-12 uncias longi, obscure trigoni, ad angulos superne scabriusculi, ceterum læves, fistulosi (quam notam in hac sola specie hucusque observavimus), foliis longiores, inferne foliosi, sæpe adscendentes vel curvati.

**SPICA** composita *spiculis* 3 - 5 - 8 ovalibus, oblongis, obtusis, crassiusculis, tactu mollibus, valde approximatis, alternis, subnudis, omnibus distinctissimis, pulchellis, 4-6 lineas longis.

**FLORES** *feminei* dense imbricati, valde numerosi; *masculi* longe pauciores ad basin spicularum. *Bracteæ* glumis similes, sed multo majores, præcipue in spicula inferiori, cujus bractea sæpe in *aristam* brevissimam desinit.

**GLUMÆ** tenues, oblongæ, acutæ, ex viridi griseæ vel ferrugineæ, margine scariosæ, nervo dorsali valido evanido.

**FRUCTUS** glumis breviores, lanceolati, oblongi, acuminati, margine cartilagineo albido scabroque instructi, apice rostrato scarioso et integro. *Stigmata* duo. (D. v.)

---

\*) In Catal. SCHLEICHERI omissa fuit.

In paludibus non rara. « In alpes ascendit. » HALLER. In sylva Bremgarten. Prope Ferrière et Michelfelden. Ad lacum Felinum. Neviduni entre le Bois-Bougi et Bel-air. — Percnnis. Fl. Majo et Junio.

*Obs. C. ovalis* Good. auctore Cl. WAHLENBERG nihil est nisi vera *leporina* LINNÆI et *C. approximata* casu mere fortuito sub nomine *leporinæ* in herbarium summi viri incidit. Verumtamen crediderim LINNÆUM in Flora lapponica primum revera *C. approximata* HOFFII descripsisse. Sed nullus dubito quin in *speciebus* et aliis operibus posterioribus ipsissimam *ovalem* in mente habuerit, ideoque nomen *leporinæ* utpote jam omnibus notum restituendum esse putavi. *Synonyma* fere omnia quæ in *speciebus* attulit, *locus natalis* quem indicavit et *descriptio* brevis sed optima quam paragrapho addidit optime nostræ, nec *approximatæ* convenire videntur. Attende ad ipsa Magistri verba: « Habitat in Europæ PRATIS UDIS. Spica e spiculis 5. s. 6 *approximatis*: Paleis *flosculos distinguuntibus*, GRISEIS, seminibus LONGIORIBUS. Styli IN CERV. »

25. *CAREX approximata* Hoppe. — *C. spiculis subternis contiguis, bractea aristata, glumis concinne imbricatis fructum integrum lævem æquantibus. N. (Gall. Caret rapproché.)*

*Carex* Hall. *helv.* 1536? \*) *C. parviflora* (non Host) *Etr. de Fl.* p. 84.



*C. approximata* Hoffm. *l. c.* p. 200.

*C. leporina*? *L. Fl. lapp.* 322. (*Planta nostra nec ovalis sub hoc nomine in herbario linneano a Cl. GOODENOVO reperta est. Conf. obs. ad sp. prio-*

\*) Descriptio satis apta. Hæc species halleriana a plerisque auctoribus pro *C. tripartita* All. habita est. Figura autem Fl. pedem. tab. 92. fig. 5, huc neutiquam pertinere potest.

rem.) *Willd. Sp. pl.* 4. p. 229. *Pers. syn.* 2. p. 537.  
*Decand. syn. Fl. gall.* 1718.

~~~~~

C. Lachenalii *Schkuhr Car.* p. 51. n.^o 41. tab. Y
 fig. 29, et *C. leporina* *Ejusd. Nachtr.* p. 17. n.^o 43.
 tab. F ff. fig. 129. (*minus bona.*)

~~~~~

*C. approximata* *Thom. l. c.* p. 13. *C. leporina*  
*Schleich. l. c.* p. 9.

**RADIX** repens, fibris longis, albidis.

**FOLIA** in quovis fasciculo pauca, lineam lata, culmum florentem æquantia, fructifero multo breviora, plana, carinata, læviuscula, ex viridi glaucescentia.

**CULMI** crassi, faciebus duabus nervo elevato instructis, inferne foliosi, erecti, 5-6 uncias longi, læves nec nisi infra spicam scabriusculi.

**SPICULÆ** plerumque ternæ, rarius quaternæ, valde approximatae contiguæque, ovatae, inæquales. Suprema reliquis longior parte dimidia superiori foeminea. Reliquæ sæpe paucifloræ nec raro totæ foemineæ. *Bractea* spiculæ infimæ anipla, ovata, obtusa, dorso viridi vel luteo, marginibus fuscis in *aristam* scabram spicula breviorē producta.

**GLUMÆ** latae, ovatae, obtusiusculæ, nervo dorsali viridi evanido, fuscae, concinne et in quincuncem pauciorum ordinum imbricatae, margine scarioso, albido, in foemineis angustiori quam in masculis.

**FRUCTUS** glumis vix longiores, ovati, hinc convexi, inde plani, margine proprio omnino desti-

tuti, undique lævissimi, breviter rostrati, apice scarioso, integro vel obiter emarginato. *Stigmata* duo. (D. v.)

Rarissima. Hab. in alpium altissimarum primordialium locis gramineis. In M. *Pennino* prope *rupem politam*, ad sacellum mortuorum et circa ipsum monasterium abunde. In M. *Tzermotanz*. In monte *Sylvio*. — Perennis. Fl. Jul. et Aug.

Obs. Hancce speciem elegantem perperam ad *C. parvifloram* Host olim reuulit SCHLEICHERUS quem in *Etrennes de Flore* antequam Gramina austriaca illius auctoris vidissem, secutus sum. Planta HOSTII trigyna est, et parum a *C. nigra* ALLIONI differre videtur. Ceterum nostra in herbario linxiano sub nomine *C. leporinæ* adest. Cf. quæ ad priorem observavimus.

24. *CAREX Schreberi* Willd. — *C. spiculis contiguis nudiusculis teretiusculis, glumis fructus bidentatos æquantibus, foliis angustissimis, radice repente.* N. (Gall. *Caret de Schreber.*)

*Carex Hall. helv.* 1367. *App. ad Scheuchz.* p. 42. n.<sup>o</sup> 11.

*C. præcox Sut. Fl. helv.* 2. p. 243. *Etr. de Fl.* p. 86.

~~~~~  
C. Schreberi Willd. Sp. pl. 4. p. 225. *Decand. Fl. fr.* 1719. *C. præcox Pers. syn.* 2. p. 537.

~~~~~  
*C. Schreberi Schkuhr Car. n.<sup>o</sup> 30. tab. B. fig. 9.*  
*Host Gram. austr.* 1. tab. 46.

~~~~~  
C. Schreberi Schleich. l. c. p. 9. C. tenella? Thom. l. c. p. 13.

RADIX eximie repens, longissima, gracilis, sed vere lignosa, articulata, squamosa, fibras ramosissimas, implexo-tortuosas emittens, culmosque subcespitosos per intervalla edens.

FOLIA in quovis fasciculo perpauca, angustissima, vix ultra dimidiam lineam lata, planiuscula, ad margines subscabra, culnum florentem subinde æquantia, fructifero duplo vel triplo breviora.

CULMI graciles, sæpe curvati, trigoni, angulis scabriusculi, florentes 2-5 uncias longi, fructiferi semipedales, rarius pedales, basi foliosi.

SPICA composita ex 5-6 *spiculis* congesto-contiguïs, alternis, fere in eodem plano positis, ferrugineis, florentibus teretiusculis, utrinque acuminatis, acutissimis, fructiferis ovatis, obtusiusculis. *Bractea* spiculæ infimæ glumis major, ovato-lanceolata, dorso ferruginea, margine scariosa, plerumque breviter aristata, spicula brevior: reliquæ minores, plerumque aphyllæ.

GLUMÆ ovato-lanceolatæ, concavæ, acutissimæ, ex fusco ferrugineæ, margine scariosæ, nervo dorsali viridi, tenui, usque ad apicem excurrente.

FRUCTUS glumis non longiores, margine proprio destituti, ovati, striati, acuti, apice brevissime bidentati *). *Stigmata* duo. (D. s.)

In locis herbosis siccioribus areuosis, et ad sepes rarissime.

Basileæ prope *Riehen* unde nobis attulit amiciss. LUD.

THOMAS. Monente ampliss. HALLERO filio etiam in Helvetia *insubrica* provenit. Misit etiam CL. SCHLEICHER. - Perennis.

Fl. Martio et Aprili.

24. *CAREX curta* Good. — C. spiculis subsenis ovatis remotiusculis nudis, glumis pallidis scariosis,

*) Figura Cl. HORTII, ceterum optime cum nostra conveniens, antheras muticas sistit. In specimenibus nostris siccis lentis validæ ope pilorum brevissimorum pënicillo instructæ esse videntur.

fructibus ovatis apice indiviso. N. (Gall. *Caret écourté.*)

Hall. helv. 1360. *App. ad Scheuchz. Gram.* p. 40.

n.º 7. *C. canescens* (non *L.*) *Sut. Fl. helv.* 2.

p. 246. *C. curta Etr. de Fl.* p. 88.

~~~~~

*C. curta Good. Car.* n.º 5. *Smith brit.* 967. *Hoffm.*

*l. c.* p. 203. *Decand. Fl. fr.* 1721. *Pers. syn.* 2.

p. 539. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 241.

~~~~~

C. curta Schkuhr Car. n.º 33. tab. *C.* fig. 13. *Host*

Gram. anstr. 1. tab. 48. *C. elongata* (non *L.*)

Leers herb. p. 200. tab. 14. fig. 7.

~~~~~

*C. curta Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe*

*l. c. Dec.* 1.

β. *C. curta brunnascens Pers. Tota tenerior, spiculis rotundato-ovatis, (non semper) magis approximatis, brunneo-griseis (spadiceis), glumis nitidis ovatis, fructum subæquantibus. Pers. l. c. —*

*C. curta Schleich. Car. exs.* n.º 13.

RADIX subrepens.

CULMI triquetri, pedales et longiores, profunde striati, basi tantum foliosi, ad angulos scabriusculi.

FOLIA marginibus carinaque scabriuscula, culmo saltem adulto plerumque breviora, plana v. plicato-carinata, linea una paulo latiora, pallide virentia.

SPICA composita, in paludibus montanis (α) 2-3-uncialis, in alpinis editioribus (β) vix uncialis, versus basin sæpius interrupta. *Spiculæ* 5-7, (rarissime plures), alternæ, basi masculæ, florentes teretiusculæ, acutæ: deinde ovato-oblongæ, obtusæ; inferiores remotiusculæ, sic tamen ut quævis plerum-

que apice basin proximæ attingat ; superiores quandoque suboppositæ ; ( in  $\beta$  magis approximatae ; superiores subinde subconfluentes. ) *Flores* masculi parum numerosi. *Bracteæ* glumis similes , parvæ , nervo dorsali in *aristam* viridem 5-4 lineas longam producto : ad basin spiculæ infimæ subinde *foliolum* pro bractea adest viride , angustum spicamque totam superans.

GLUMÆ ovato-lanceolatae , acutæ , rarius obtusiusculæ , pallidæ , albæ vel ex albo flavicantes , ora late scariosæ , nervo dorsali viridi , tenui , subevanido ; ( in  $\beta$  superne spadiceæ , marginibus scariosis , griseis ).

FRUCTUS erectiusculi , numerosi , virides , ( in  $\beta$  superne spadicei ), glumis paulo longiores , vix lineam integram metientes , ovato-acuti , compressi , hinc , convexi inde planiusculi , sub microscopio ( in utraque varietate ) tenuissime sed densissime muriculati , ad margines obsolete sed grosse serrulati , mucrone brevissimo scarioso , indiviso. *Stigmata* duo. ( D. v. )

Hab.  $\alpha$  in paludibus alpium humiliorum et montium rarius.

*A la plaine des Mosses. Aux Rousses.* In M. Jura supra *Arzier* et *St. Cergue*. Fl. Jun. et Jul.  $\beta$  In alpihus editioribus non infrequens locis herbidis nec paludosis. In M. *Fouly*. In M. *Speluga* , etc. Fl. Jul. et Aug. — Perennis.

*Obs.* Omnibus rite pensatis , plantam  $\beta$  a vulgari ( que apud nos minus frequens reperitur ) non nisi ut varietatem a diversitate soli climatisque productam differre credimus. Fructu præcipue ad unguem conveniunt.

\*\*\*\* *Spiculæ androgynæ. Stigmata tria.*

26. *CAREX curvula* All. — *C. spica composita oblonga: spiculis oblongis congesto-imbricatis apice masculis, glumis acuminatis. N. (Gall. Caret courbé.)*

*Carex Hall. helv. 1353. App. ad Scheuchz. Gram. p. 40. n.º 5. C. curvula Sut. Fl. helv. 2. p. 240. Etr. de Fl. p. 93.*

~~~~~

C. curvula Vill. delph. 2. p. 197. Hoffm. l. c. p. 198. Decand. Fl. fr. 1716. Pers. syn. 2. p. 536. Willd. Sp. pl. 4. p. 218.

~~~~~

*Schk. Car. n.º 25. tab. D. Hh. fig. 17. Host Gram. austr. 3. tab. 76. All. pedem. n.º 2295. tab. 92. fig. 3.*

~~~~~

Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.

RADIX fibrosa, ex fibris numerosis, crassis, nigricantibus vel atro-fuscis, densos edens cespites foliorum et culmorum.

FOLIA dura, glaucescentia, sæpe cum culmis ad unum latus curvata, dimidiam lineam lata, dorso convexa, facie profunde canaliculata, marginibus scabriuscula, vaginis exterioribus fuscis, striatis, solutis apyillisque.

CULMI plerumque 2-4-6 uncias longi, florentes foliis breviores, adulti ea superantes, teretiusculi, profunde striati, duri, lævissimi, subinde incurvi, basi tantum foliosi.

SPICA composita, ovato-oblonga: *spiculæ* 5-6, densissime imbricatæ ut primo intuitu spica simplex

esse videatur, appressæ, oblongæ, acutæ, apice masculæ. *Bracteæ* glumis fere similes, sed majores, modo profunde emarginatæ, modo lanceolatæ et integræ, nervo dorsali in *aristam* scabram plus minusve longam, spiculis tamen plerumque breviorē, producto.

GLUMÆ nitentes, amplæ, oblongæ, ovato-lanceolatæ, acuminatæ, fuscae, margine scariosæ: *foemineæ* subinde mucronatæ. *Antheræ* mucronulatæ.

FRUCTUS glumis fere breviores, oblongi, conici, subtriquetri, læves, mucrone exasperato, bifido. *Semen* acute triquetrum. *Stigmata* tria. (D. v.)

Hab. in summarum alpium locis herbidis. In M. *Fouly*; *Salanfe*, *Semprinio*. In summo monte *Sylvio*. All. (Inde nobis attulit amiciss. L. THOMAS fere pedalem, erectam var. quam deinde in eodem monte nos quoque observavimus.) In M. *Pennino*. Sur le Col du Bonhomme et sur celui de la Seigne. In M. *Speluga*, *Furca di Bosco*, *Gries*, etc. — Perennis. Fl. Julio et Augusto.

27. *CAREX atrata* L. — C. spicis paucis ovatis pedunculatis androgynis apice foemineis, fructibus compressis muricatis. N. (Gall. *Caret en deuil*.)

Carex Hall. *helv.* 1369. *Scheuchz. Gram.* 481. tab. 11. fig. 1. 2.

α. Spicis androgynis sublonge pedunculatis, demum pendulis, culmo elatiori.

C. Hall. *helv.* 1369 α. *Scheuchz. l. c.* C. *atrata* *Sut. Fl. helv.* 2. p. 254. *Etr. de Fl.* p. 95.



C. atrata L. *Sp. pl.* 1386. *Smith brit.* 987. *Good. Car.* n.º 36. *Hoffm. l. c.* p. 205. *Decand. Fl. fr.* 1725. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 221. *Pers. syn.* 2. p. 536.

~~~~~  
*Schkuhr. Car.* n.º 44. tab. X. fig. 77. *Host Gram. austr.* 1. tab. 88.

~~~~~  
Schleich. l. c. p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

β. *C. atrata* dubia. Spica suprema mascula (paucioribus intermixtis foemineis floribus), reliquis mere foemineis, fructibus atro-purpureis.

C. atrata Vill. *delph.* 2. p. 216. *C. dubia* Etr. *de Fl.* p. 178.

γ *C. atrata* nigra. Spicis subsessilibus, erectis, fructibus atro-purpureis margine flavis, culmo humiliori.

C. nigra Sut. *Fl. helv.* 2. p. 255. *Etr. de Fl.* p. 98.

~~~~~  
*C. nigra* All. *Fl. pedem.* n.º 2310. *Decand. Fl. fr.* 1726. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 266. *Pers. syn.* 2. p. 541.

~~~~~  
C. æthiostachya Schkuhr *Nachtr.* p. 57. n.º 57 et *ibid.* *C. nigra* p. 38. n. 16. tab. Llll. fig. 196. *Ejusd. Car.* tab. Aaa. fig. 115. (*Absque descriptione.*)

~~~~~  
*C. nigra* Schleich. *l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

α RADIX fibrosa, fusca multiceps.

FOLIA acryophyllæa, plana, carinata, 2-3 lineas

lata, marginibus scabriuscula.

CULMI acute triquetri, inferne foliosi, læviusculi, erecti, florentes folia fere æquantes, adulti iis multo longiores, trientales, pedales.

SPICÆ ovalæ, atro-purpureæ, 5-5, approximatae, superne foemineæ, pedunculatæ. *Pedunculi* vix unciales: inferiores reliquis longiores. *Foliolum* florale viride, sessile, vagina brevissima vel nulla instructum, angustum, scabrum, sæpe totum culmum superans, pro bractea ad basin pedunculi infimi. *Bractea* brevissima, rufa infra ceteros pedunculos.

FLORES masculi (apud nos) triandri, pauciores ad spicarum basin. In inferioribus sæpe nulli.

GLUMÆ ovalæ, acuminatæ, glabræ, atro-purpureæ, nervo dorsali evanido, dilutius rubello.

FRUCTUS flavi, ovati, compressi, dorso tamen subcarinati, brevissime mucronulati, apice obiter emarginati, sub lente valida tuberculis nitidis innumeris elegantissime muriculati. *Semen* triquetrum utrinque mucronulatum. *Stigmata* tria. (D. v.)

β. Intermedia inter α et γ. CULMUS fere cubitalis. FOLIA latissima, longa. *Spicæ* breviter pedunculatæ, erectæ, multo majores quam in γ. Inferiores foemineæ: supremæ mascula, paucis flosculis masculis intermixtis. FRUCTUS muricati, juniores jam atro-purpurei, marginibus etiam nigris. Cetera prioris. (D. s.)

γ. FOLIA plerumque multo angustiora quam in α et β.

CULMUS foliis modo longior, modo brevior, 3-4 uncias altus, rarissime pedalis.



SPICÆ ternæ, rarius quaternæ, duplo fere minores quam priorum, atro-purpureæ, subsessiles, appressæ et valde approximatae: intermedia supra alias eminens, parte inferiori dimidia mascula: inferiores subinde mere foemineæ. *Foliolum* florale sessile, angustissimum, scaberrimum, spicas superans, pro bractea communi. *Bracteæ* reliquæ glumis multo majores, nervo dorsali flavo.

GLUMÆ tenuissimæ, atro-purpureæ, carina concolori.

FRUCTUS juniores rubri, deinde atro-purpurei, ad margines linea flava valde conspicua insigniti, muricati. *Stigmata* tria. (D. v.)

In locis herbidis alpium editiorum. α. Non rara. In M. *Javernaz*, Supra *Servant* etc. β. Ad rupium excelsarum pedem in M. *Taveyannaz*, γ. Vulgaris. In M. *des Granges* supra *Notre-Dame d'Abondance*, etc. — Pereunis. Jul. et Aug.

Obs. Sexu ludunt: flosculi nonnunquam deprehenduntur hermaphroditi. Stirpes nostræ helveticæ certo certius ad unam eandemque speciem pertinent. *C. parviflora* Host Gram. austr. 1. tab. 87. a *C. nigra* All. glumis et germine ciliatis modice differre videtur. Exemplum *C. atratae* in herbario linnaeano servatum ad nostram var. β spectare suspicor.

\*\*\*\*\* *Spicæ sexu distinctæ. Stigmata duo.*

28. *CAREX mucronata* All. — *C. spica* foeminea subsolitaria approximata sessili brevissima, glumis lauceolatis, fructibus oblongo-ovatis rostratis. N. (Gall. *Caret mucroné*.)

*Carex Hall. helv.* 1374. *App. ad Scheuchz. Gram.* p. 42. n.º 12. *C. bracteata Sut. Fl. helv.* 2. p. 250.

*Carex mucronata Etr. de Fl.* p. 104.

~~~~~

C. mucronata *All. pedem.* 2318. *Decand. Fl. fr.* 1727. *Pers. syn.* 2. p. 541. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 264.

~~~~~  
*Schkuhr Car. n.º* 46. tab. *K.* fig. 44. *Mich. gen.* 64. t. 32. f. 3. (*Ex Willd.*)

~~~~~  
Schleich. l. c. p. 9.

RADIX cespitosa, fibris validis, ramosis, duris, non repens.

FOLIA setacea, dorso convexa, facie canaliculata, vix trientem lineæ lata, rigida, marginibus scabriusculis, sed sic involutis ut tactu lævia sint, erecta, tortuosa, culmum florentem æquantia. *Culmea* reliquis crassiora. *Vaginæ* foliis latiores, apice truncatæ, solutæ, albidæ vel purpurascens, striatæ, marginibus late scariosæ.

CULMI inferne foliosi, obscure trigoni, filiformes, graciles, rigidi, læves vel superne tantum scabriusculi, semipedales, pedales, subtortuosi, foliis demum multo longiores.

SPICÆ approximatae, appressæ, plerumque binæ, rarius ternæ vel quaternæ. *Mascula* terminalis fœmineis plerumque duplo longior, oblongo-elliptica, utrinque acuminata.

GLUMÆ nitentes, atro-spadiceæ, oblongæ, lanceolatae, acutæ, nervo dorsali excurrente, luteolo, margine scarioso, albido, angusto sed valde conspicuo.

SPICA *fœminea* sessilis, pauciflora, crassiuscula, plerumque valde brevis. Inferiores (quando adsunt)

etiam approximatae sessilesque. *Bractea* amplexicaulis, minime vaginans, ovata, plus minusve ampla, atro-spadicea, nervo dorsali validissimo, plerumque in *foliolum* viride, angustissimum scabrumque, spicam sæpius superans producto, rarius omnino mutica, vel brevius aristata.

GLUMÆ masculis consimiles, nervo dorsali superne exasperato.

FRUCTUS ovato-oblongi, per lentem muricati, hinc convexi, inde complanati, rubelli, longius rostrati, apice scarioso, subbifido, margine proprio viridi angusto, pilisque pellucidis conicis hispido instructi. *Semen* ovatum, hinc convexum, obscuriusque carinatum, inde planum, subfuscum. *Stigmata* duo; *stylus* nullus. (D. v.)

Rarissima. Hab. in pascuis editioribus alpium montiumque.

In M. Lützelflue, pagi *Abbatiscellani*. J. GESNER. *Au Bec-de-l'Oiseau* et in sylvis *Juranis*. HALLER. In alpibus *insubricis*, vulgo. REV. VERDA. In M. *Generosi* altissimo jugo quod vocant *giardino della Regina* anno 1808 copiosam invenimus. — Pærennis. Fl. Julio et Augusto.

29. *CAREX cespitosa*. L. — C. spicis obtusis, foliorum floralium auricularis subrotundis minimis, fructibus compressis ovatis persistentibus. N. (Gall. *Caret gazonnant.*)

Carex Hall. helv. 1387. *Scheuchz. Gram.* 428.

Carex alpina Sut. Fl. helv. 2. p. 253. et C. *cespitosa Ejusd. l. c.* p. 258. (excl. Hall. *synon. quod alio spectat.*) *Etr. de Fl.* p. 106. (excl. Hall. *priori synonym.*)



- C. cespitosa* L. *Sp. pl.* 1388. *Smith brit.* 1000. *Good. Car.* n.º 39. *Hoffm. l. c.* p. 208. *Decand. Fl. fr.* 1728. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 287. *Pers. syn.* 2. p. 546.
C. obesa All. *pedem.* 2230.

~~~~~

- Schkuhr Car.* n.º 48. tab. *Aa et Bb.* fig. 85. *a—e.*  
*Host Gram. austr.* 1. tab. 91.

~~~~~

- Schleich. l. c.* p. 9. *Seringe l. c. Dec.* 3. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX repens, articulata, longissima, squamis fuscis oppositisque instructa, multos proferens *cespites* basi *vaginis* fuscis brevibus, triangularibus, latis, acutis apyllisque vestitos.

FOLIA radicalia glaucescentia, erecto-patula, 1-2 lineas lata, plana, carinata, marginibus aspera, culmum florentem sæpe superantia. *Culmea* consimilia.

CULMI erecti, acutè trigoni, basi et apice foliosi, læviusculi, 4 - 12 uncias longi, adulti foliis multo longiores.

SPICA mascula plerumque unica (rarissime duæ), fœmineis multo longior, lanceolata, acutiuscula.

GLUMÆ atro-fuscae, ovatae, oblongae, obtusissimae, nervo dorsali subtili, albido, evanido.

SPICÆ *fœmineæ* tres vel quatuor, modo distantes modo approximatae, subteretes, obtusae, erectae, vix semunciales, sessiles vel subsessiles, axillares, suprema excepta quæ pro folio sæpe bractea ampla gaudet.

FOLIA floralia reliquis similia, sed angustiora, absque vagina, culmum sæpe æquantia vel super-

rantia, basi utrinque *auricula* nigra, parva, rotundataque instructa.

GLUMÆ masculis similia, sed multo breviores.

FRUCTUS persistentes, ordinibus senis imbricati, compressi, virides (in alpina planta nigrescentes), late elliptici, glumis longiores, ut spicæ maturæ eleganter ex viridi et nigro variegatæ sint. *Stigmata* duo. (D. v.)

Hab. in paludibus torfaceis montium editiorum et Alpium.


Sur la Grande-Aîne, au-dessus d'Arsier, etc. —

Perennis. Fl. Jun. et Jul.


50. *CAREX stricta* Good — C. spicis acutis, foliorum floralium auriculis elongatis, fructibus ovatis compressis deciduis. N. (Gall. *Caret comprimé.*)

Carex Hall. *helv.* 1400. C. *elata* Sut. *Fl. helv.* 2.

p. 262. C. *compressa* Etr. *de Fl.* 111. (excl. syn. Schk. et Curtis.)




C. *stricta* Good. *Car.* n.º 40. *Smith brit.* 1000. *Hoffm.* l. c. p. 208. *Decand. Fl. fr.* 1729. *Pers. syn.* 2. p. 546. *Willd. Sp. pl.* 4. n.º 287.



Good. l. c. t. 9. f. 21. (*Habitus a nostra omnino alienus*). Schkuhr *Car.* n.º 49. tab. V. fig. 73. (*Descr. et fig. ex Goodenorio*). Host *Gram. austr.* 1. tab. 94. (*Optima.*)

C. *acuta* Leers *herb.* 207. tab. 16. fig. 1.



C. *stricta* Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.

Seringe l. c. Dec. 3.

β. Minor foliis viridibus, spica mascula unica

brevi ad basin flosculo uno alterove foemineo stipata, foemineis 2-3, brevibus, vaginis inferioribus minus filamentosis.

RADIX maxima, crassa, stolonifera, densissime cespitosa.

CULMI inferne foliosi, acute trigoni, angulis albidis, superne scabrinusculi, erecti, cubitales, tripedales.

FOLIA glancescentia, erecta, stricta, carinato-plicata, longa, culmo adulto tamen breviora, 1-5 lineas lata, margine carinaque scabra, *vaginis* radicalibus in filamenta retiformia fatiscentibus.

SPICÆ 4-6, teretes, acutæ, 2-5-unciales; *masculæ* plerumque binæ, crassiusculæ, atro-fuscae, ante florescentiam trigonæ: suprema terminalis; reliquæ paulo minores approximatae.

GLUMÆ imbricatæ, saturate purpureæ, apice atratæ, anguste lanceolatæ, vix obtusæ, sæpe etiam acutæ, nervo dorsali albo evanido.

SPICÆ *foemineæ* acutæ, primum graciles, maturæ crassiores; superiores sessiles apice sæpe masculæ; inferiores axillares, breviter pedunculatæ. *Folia* floralia longissima, ad basin 2 *auriculis* nigris valde angustis elongatisque instructa. *Vaginæ* nullæ.

GLUMÆ masculis similes, sed latiores, acutiusculæ, margine albido, valde angusto vixque conspicuo.

FRUCTUS octofariam imbricati, ceterum fere ut in *C. cespitosa* numero brevissimo, truncato, integro, virides, glumis nigris longiores (ut spicæ adultæ eleganter bicolores sint), ante glumas decidui. *Stigmata* duo. (D. v.)

Vulgatissima in vicinia fluviorum et locis aquaticis; β . in fossis paludosis exsiccatis, circa *Promenthou*. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

51. *CAREX acuta*. L. — *C.* spicis masculis una pluribus, foemineis subnutantibus filiformibus, glumis pellucido-lineatis, fructibus subangulatis. N. (Gall. *Caret aigu*.)

C. acuta L. *Sp. pl.* 1388 *). *Good. Car.* n.º 33. *Smith brit.* 1001. *Hoffm. l. c.* p. 209. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 304. *Pers. syn.* 2. p. 546. *C. gracilis*. *Decand. Fl. fr.* 1730.

~~~~~  
*C. acuta* Schkuhr n.º 50. tab. *Ez. Ff.* fig. 92. *a, b.*  
*Host Gram. austr.* 1. tab. 95.

~~~~~  
Ehrh. Gram. exs. Dec. 5. n.º. 49. *Schleich. l. c.*
p. 9.

RADIX repens.

CULMI foliosi, 1-3-pedales, acute trigoni, angulis albidis, superne plus minusve asperis; juniores apice nutantes, demum stricti.

FOLIA subangusta, vix ultra sesquilineam lata, erecta, superne recurva, marginibus scabra, culmo breviora, nervo dorsali parum exstante instructa, læte viridia.

SPICÆ numero, situ figuraque variabiles. *Masculæ* inæquales, 2-5 plerumque nutantes, longæ, tri-

*) Ad var. β . *rufam* spectare nostram plantam. SMITH l. c. In herbario linnæano certe sub nomine *acutæ* a LINNÆO ipso exarato servatur. Sed varietas non designatur. Synon. Scheuchz. in *Sp. pl.* citatum alio spectat.

gonæ, atro-purpureæ, effloetæ dilutius ferrugineæ.

GLUMÆ elongatæ, angustæ, obtusiusculæ, nervo viridi lato, evanido instructæ, ceterum atro-fuscae, per lentem lineolis multis albo-pellucidis notatæ.

SPICÆ *foemineæ* filiformes, longæ, superne dense imbricatæ, inferne laxiores, flosculis circa basin sæpius remotis: inferiores subinde pedunculatæ; florentes cernuæ, demum erectæ. *Folia* floralia reliquis consimilia, sed breviora, oblique amplexicaulia, absque *vaginis*; inferiora basi vix auriculata; supremum angustum, auriculatum: *auricula* brevis, sæpe soluta, triangularis.

GLUMÆ masculis similes, breviores et obtusiores, fructibus paulo breviores.

FRUCTUS virentes vel lividi, elliptici, utrinque convexiusculi, nervosi, subangulati, mucrone subnullo, obtuso, truncato, integerrimo. *Semen* obovatum, hinc convexum, inde planum. *Stigmata* duo. (D. s.)

In Helvetia rarissima. Hab. in paludibus. Ad lacum *Neocomensem*, præcipue infra *Epalinge* ubi Cl. CHAILLET eam observavit. In Helvetia *transalpina* et circa *Noiraigne* in comitatu *neocomensi*. SCHLEICHER. — Perennis. Fl. Apr. et Majo.

Obs. « In exemplis in Germania septentrionali lectis observantur glumæ *foemineæ* semper ovatæ et mucronatæ; in iis autem quæ in Austria leguntur ovatæ, vix mucronatæ (sic et apud nos): inde differunt inter se figuræ SCHUMERII et HOSTII. » Hoffm. l. c. An HALLERUS hancce speciem noverit, necnon, non constat. Nonnulli ejus 1598, nobis quidem invitis, huc trahunt.

***** *Spicæ sexu distinctæ. Stigmata tria.*

1. *Spica mascula unica.*

A. Fructus pubescentes, villosi vel tomentosi.

52. *CAREX lasiocarpa* Ehrh. — *C. spica mascula subsolitaria longissima, foemineis brevioribus remotis axillaribus, fructibus hirsutis, foliis canaliculatis.* N. (*Gall. Caret à fruits velus.*)

Carex lasiocarpa Sut. *Fl. helv.* 2. p. 254. *Etr. de Fl.* p. 113.

~~~~~  
*C. filiformis* Good. *Car.* n.º 23. *Smith brit.* 1008. *Decand. Fl. fr.* 1740. *Hoffm. l. c.* p. 219. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 303. *Pers. syn.* 2. p. 546.

~~~~~  
C. filiformis Schkuhr *Car.* n.º 68. tab. K. fig. 45. *Host Gram. austr.* 1. tab. 86. *Good. Car. in Rôm. Arch. II.* 2. tab. 2. fig. 5. *C. hirta* *Fl. dan.* tab. 379. (*Excl. spica seorsim delineata.*)

~~~~~  
*C. lasiocarpa* Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 2. n.º 19. *C. filiformis* Schleich. *l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c. Dec.* 4.

RADIX repens.

CULMI pedales, cubitales, superne angulosi, scabriusculique, ceterum teretiusculi, læves, dimidia parte inferiori foliosi, basi *vaginis* fuscis, striatis, nitidis, sæpe in foliolum productis tecti.

FOLIA longe vaginantia, culmum florentem æquantia vel superantia, margine dorsoque plus minusve scabra, dorso convexa, nec carinata, facie canaliculata, linea una angustiora, erecta strictaque.

SPICA *mascula* plerumque unica (rarius duæ), terminalis, biuncialis, gracilis, effœta subnutans. Altera quando adest terminali multo brevior.

GLUMÆ ovato-oblongæ, obtusiusculæ, latæ, fuscæ, margine plus minusve scarioso, apice sæpius (per lentem) ciliatæ, nervo viridi vel luteo valido, prominulo, evanido.

SPICÆ foemineæ duæ (rarius unica, subinde tres), mascula duplo, triplo v. quadruplo breviores, remotæ, subsessiles, axillares. *Folia* floralia reliquis consimilia, erecta, vaginantia: infimum masculæ spicæ apicem sæpius superans. *Vaginæ* tubulosæ, latæ, brevissimæ, *pedunculum* tamen integrum, vel fere integrum tegentes, apice auriculatæ.

GLUMÆ lauceolatæ, acutæ, nervo dorsali sæpe in mucronem scabrum producto, ceterum masculis similes.

FRUCTUS hirsuti, ovati, subtrigoni, paulo inflati ex fusco nigricantes, apice bifido, laciniis divergentibus. *Stigmata* tria. (D. v.)

Hab. in aqua ipsa paludum profundiorum rarius. Ad lacum *Felinum*, copiose. Circa *Wesen* ad novum canalem *Linthie glaronensis* prope ostium. *A Noville*. SCHLEICHER. Prope *Seedorf*. SERINGE. *Aux marais de la Tour de Gource*. J. GAY. — Perennis. Fl. Apr. et Majo.

OBS. Planta nostra quidem in herbario linneoano, nomine *filiformis* ab ipso LINNÆO apposito servatur: sed nullus dubito quin aliquid erroris in viri summi schedulas irrepserit, putoque eum in speciebus plantarum sub hoc nomine *Caricem* sequentem (*tomentosam*) descripsisse. Phrasis enim diagnostica, citatum synonymon et locus natalis ex asse cum ea nec cum *lasiocarpa* conveniunt, quæ nunquam in *nemoribus* occurrit. Nec ad suam *filiformem* citavissent viri doctissimi *Cyperoid. sylva-*

*ticum angustifolium* etc. Scheuchz. 425. tab. X. f. 11. si ad longam accuratamque ejus descriptionem rite attendissent. Huic ne de reliquis dicam, folia carinata, late viridia, culmum triquetrum, spicam masculam semuncialem vel 8-9 lineas longam, fructus denique si per lentem conspiciantur brevissimis densisque pilis conspersos tribuit. Quis non videt hæc omnia luce clarius ad *tomentosam* spectare? Plantam suam SCHEUCHZERUS ad radices sylvasque M. *Uethiaci* reperit, ubi nullæ sunt paludes. Præterea si LINNÆUS *filiformem* suam describens notram *lasiocarpam* in mente habuisset, lanuginem, credo, densam conspicuamque fructuum neglexisset! *Lasiocarpa* igitur in Sp. pl. omnino deesse videtur. Plus enim auctoritati tanti viri ejusque scriptorum, quam schedalis herbarii tribuendum esse censeo.

55. *CAREX tomentosa* L.—C. spicis distantibus cylindricis axillaribus, fructibus subrotundis incanotomentosis, foliis carinatis. N. (Gall. *Caret coton-neux*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1383. *Nomencl.* 1384. Scheuchz. *Gram.* 425. tab. 10. fig. 11. C. *filiformis* et C. *tomentosa* (excl. syn. Hall.) *Sut. Fl. helv.* 2. p. 251 et 250. C. *tomentosa* *Etr. de Fl.* p. 115.



C. *tomentosa* L.\*) *Mant.* 123. *Smith brit.* 996. *Vill. delph.* 2. p. 210. *Hoffm. l. c.* p. 212. *Decand. Fl. fr.* 1732. *Lam. Enc. méth.* p. 189. *Pers. syn.* 2. p. 541. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 263.



C. *tomentosa* Schkuhr *Car. n.º* 57. tab. F. fig. 36. *Host Gram. austr.* 1. tab. 82. *Leers herb.* 203; tab. 15. fig. 7. \*\*)

---

\*) Huc etiam referenda videtur C. *filiformis* L. Sp. pl. 1385. Cf. obs. ad priorem.

\*\*) Ad suam etiam vir Cl. Hall. *helv.* 1383 citat.



*Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13. Seringe l. c. Dec. 2.*

*C. sphærocarpa Ehrh. Gram. exs. Dec. 9. n.º 89.*

**RADIX** articulata, repens, fusca, fibris albidis.

**FOLIA** radicalia scabra, culmo etiam florente breviora, plana, carinata, tenera, lineam circiter unam lata. *Culmea* consimilia.

**CULMUS** acute trigonus, infra spicas scabriusculus, gracillimus, basi tantum foliosus.

**SPICA** mascula, terminalis, oblonga, gracilis, erecta, acuta, 8-10 lineas longa.

**GLUMÆ** arcte imbricatæ, lanceolatæ, acutæ, margine angusto albido, dorso virides, demum luteæ.

**SPICÆ** *fœmineæ* 1-2ve, subsessiles, multifloræ, cylindricæ, mascula multo breviores, florentes acutissimæ; supremâ masculæ approximata, infima quando adest distans. *Folia* floralia brevissime vaginantia, erecta: infimum spicæ apicem æquans. *Pedunculi* brevissimi, vix ultra lineam longi, vagina fere undique tecti.

**GLUMÆ** fere ut in masculis, margine saturatius fusco, nervoque dorsali latiori.

**FRUCTUS** subrotundi, obtusi, oculo etiam nudo distincte densissimeque pubescentes, ex viridi canescentes, glumis dejectis multo longiores, mucrone brevissimo, bifido, dentibus tamen arcte conniventibus, ut nisi lentis validioris ope discerni nequeant. (D. v.)

*Hab. in pratis umbrosis et in sylvis. Ad pedem M. Uetliaci; prope Basileam et Michelfelden. Au bois Bougi et alibi*



circa *Nevidunum*. *Lausannæ*, etc. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

54. *CAREX montana* Vill. — *C. spica* mascula ovata, foemineis approximatis sessilibus, fructibus ovato-trigonis utrinque mucronatis. N. (Gall. *Caret de montagne*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1372. Scheuchz. *Gram.* 419. tab. 10. fig. 8-9. *C. montana* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 211. *Etr. de Fl.* p. 124.

*C. montana* Vill. *delph.* 2. p. 211. Hoffm. *l. c.* p. 212. Decand. *Fl. fr.* 1733. Lam. *Enc. méth.* 3. p. 387. Pers. *syn.* 2. p. 540. *C. collina* Willd. *Sp. pl.* 4. p. 260.

*C. montana* Schkuhr *Car. n.º* 58. tab. *F.* fig. 28. Leers *herb.* p. 203. tab. 16. fig. 6. Host *Gram. austr.* 1. tab. 66.

*Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *C. collina* Seringe *l. c.* Dec. 2.

β. Procerior spicis foemineis subconfluentibus, paucifloris.

*Carex* Hall. *helv.* 1373. Scheuchz. *Gram.* 423. *C. pubescens* Etr. *de Fl.* 118.

*C. conglobata* All. *pedem.* 2314. (*Excl. synon.*)

RADIX ramosa, fibris validis, duris, cespitosa.

FOLIA præcedentis anni vere persistentia, sed semimarcida, culmo longiora: hinc culmo breviora, tenera, plana, carinata, lineam unam lata, carina scabriuscula. *Vaginæ* fasciculorum extus rubellæ

(qua nota statim a speciebus affinibus nostra dignoscitur).

**CULMUS** obsolete trigonus, 5-6-uncialis, fere totus nudus, superne tantum ad angulos scabriusculus.

**SPICA mascula** ovato-oblonga, atro-fusca, lineas fere 8 longa, crassiuscula.

**GLUMÆ** ovatæ, obtusiusculæ, fuscae vel nigricantes, marginibus concoloribus, basi albida, nervo dorsali viridi, deinde luteo, evanido.

**SPICÆ foemineæ** sessiles, mascula longe minores, forma variabiles, paucifloræ, 1-5ve, masculæ (praesertim suprema) approximatae; infima quandoque distans, plerumque sessilis, rarius brevissime pedunculata. *Bracteæ* atro-fuscae, margine albidæ, amplæ, obovatæ, amplexicaules, neutiquam vaginantes: infima sæpius profunde emarginata, carina viridi exstante et in aristam viridem plus minusve longam producta.

**GLUMÆ** atro-fuscae, ovatæ, sæpe emarginatæ vel retusæ, apice per lentem breviter ciliatæ, apiculatæ, margine concolori.

**FRUCTUS** ovato-oblongi, irregulares, subtrigoni, oculo nudo distincte pubescentes, apice integriusculo vel obiter emarginato. (D. v.)

β. Differt culmo elatiori, fere pedali, adulto nutante, scabriore, spicis foemineis irregularibus, sæpe confluentibus, plerumque 5-5 floris. (D. v.)

Hab. in pratis nemoribusque submontanis, vulgo. β. In locis humilioribus. — Perennis. Fl. Apr. Fructus Majo maturescunt.

*Obs.* *C. montana* L. Sp. pl. 1585 a nostra omnino diversa

et eadem est ac *pilulifera* ejusd. 1585 quæ *montanæ* nomine testante Cl. SMITH in herbario linnæano adhuc servatur. Perperam autem Cl. GOODENOVIVS *C. montanam* LEERSII quæ probe monente HOFFMANNO utique ad nostram pertinet ad *piluliferam* trahit.

55. *CAREX præcox* Jacq. — *C.* bracteis foliolisve vaginantibus, spica mascula subclavata, foemineis approximatis pedunculatis, fructibus obovatis pubescentibus. N. (Gall. *Caret printannier.*)

*Carex* Hall. *helv.* 1381. Scheuchz. *Gram.* 433. *C.* verna Sut. *Fl. helv.* 2. p. 251. *Etr. de Fl.* p. 122.

*Carex præcox* Good. *Car.* n.º 22. *Smith brit.* 994. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 386. *Hoffm. l. c.* p. 211. *Dec. Fl. fr.* 1733. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 113. *C. verna* Vill. *delph.* 2. p. 204. *Pers. syn.* 2. p. 541.

*C. præcox* Schkuhr *Car.* n.º 56. tab. *F.* fig. 27: *Host Gram. austr.* 1. tab. 68. *C. filiformis* Leers *herb.* p. 204. tab. 16. fig. 3.

*C. præcox* Schleich. *l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c. Dec.* 2.

β. Procerior, foliis erectis longioribus, glumis foemineis carina exasperatis.

*C. præcox* β. Hall. *fil. in Röm. Arch. I. fasc.* 2. n.º 40: p. 9.

*C. umbrosa* Willd. *Sp. pl.* 4. p. 277. *Decand. Fl. fr.* 3. p. 722. n.º 1731\*. *in add. Hoffm. l. c.* p. 222: *Pers. syn.* 2. p. 543.

*C. præcox* β. *Lam. l. c.*

*C. umbrosa* Host *Gram. austr.* 1. tab. 69. *Schkuhr Nachtr.* n.º 74. tab. *Ffff.* fig. 190.

*C. umbrosa* Schleich. *l. c.* p. 9. *Seringe l. c. Dec.* 2.

RADIX subrepens , valde stolonifera.

FOLIA cespitosa, caryophyllea, læte viridia, nitida; plana, carinata, patulo-recurva, carina margineque scabrinuscula, culmo breviora, 1-2 lineas lata.

CULMI obsolete trigoni, angulis superne tantum asperis, 3-4-unciales, fere nudi.

SPICA *mascula* terminalis, crassa, lineas 6-8 longa, obovata vel clavata, ante florescentiam obtuse trigona.

GLUMÆ obtusiùsculæ, ferrugineæ, marginibus concoloribus nec scariosis, nervo dorsali valido, viridi, demum luteolo, evanido.

SPICÆ *fœmineæ* ovatæ, 2-5, mascula longe minores, approximatae, breviter pedunculatae. *Ima* quandoque radicalis, *pedunculo* longissimo insidens. *Bracteæ* scariosæ, vaginantes, triangulares, apice sæpius emarginatæ, carina plerumque in aristam seu foliolum breve desinente. *Pedunculi* vagina sæpe tecti, quandoque tamen exserti eaque duplo longiores.

GLUMÆ ovato-lanceolatae, masculis similes, nervo dorsali lævi, in mucronulam plerumque producto.

FRUCTUS glumis longiores, subtrigoni, utrinque obtuse mucronati, oblongi, fere pyriformes, oculo etiam nudo pubescentes, apice integro. (D. v.)

β. CULMI trigoni, florentes erecti, trientales pedalesve, demum longiores nutantesque.

FOLIA sesquipedalia, culmum æquantia vel superantia, erecta, senescentia recurva.

SPICA *mascula*, subclavata, oblonga. GLUMÆ fere ut in α.

SPICÆ *fœmineæ* plerumque duæ, mascula paulo

minores, oblongæ, trigonæ, multifloræ, minus quam in priori var. approximatae. *Bracteæ* vaginantes; infimæ loco *foliolum* spicam plerumque culmumque nonnunquam ipsum superans; *vagina* 5-6 lineas longa, tubulosa, apice vix auriculato; *pedunculus* modo brevissime, modo longius exsertus.

GLUMÆ ut in  $\alpha$ , nervo tamen dorsali per lentem sæpius exasperato.

FRUCTUS minus pyriformes, striati, pilis magis conspicuis hirti, utrinque attenuati, rostro brevi, apice vaginante, scarioso, plerumque emarginato. (D. s.)

$\alpha$ . In pratis apricis, fere ubique.  $\beta$ . In sylvis et locis umbrosis rarius. In sylvula *Eckhölzli* prope *Bernan.* Ampliss. HALLERUS filius. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

OBS. Nullus dubito quin planta  $\beta$  ad *C. præcocem* pertineat. Est ejusdem varietas ex solo pinguiori umbrosoque orta, « Diversam habuisssem speciem nisi transplantatio in hortum plantæ vulgaris in siccissimis natæ me docuisset eam mire mutari, eo usque ut spica mas quadripartita fieret. » Ampliss. HALLERUS, l. c.

56. *CAREX ciliata* Willd. — *C.* spica mascula obovata, foemineis approximatis sessilibus, vaginis subnullis, fructibus obovatis pubescentibus. N. (Gall. *Caret cilié.*)

*Carex* Hall. helv. 1371  $\alpha$ . Scheuchz. Gram. 421. tab. 10. fig. 10. *C. globularis* (nec L. nec Vill.) Sut. Fl. helv. 2. p. 249. Etr. de Fl. p. 120.

~~~~~

C. ciliata Willd. Sp. pl. 4. p. 261. Hoffm. l. c. p. 218. Pers. syn. 2. p. 511. *C. ericctorum* Pollich. pal.

n.º 886. *Decand. Fl. fr.* 1735. *Lam. Enc. méth.*
3. p. 387.

~~~~~  
*C. ciliata Schkuhr Car. n.º 66. tab. J. fig. 42.*

~~~~~  
Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.

RADIX repens, stolonifera.

FOLIA brevía, patula, firma, caryophyllea, 1-2 lineas lata, nitida, plana, carinata, lanceolata, sicca pungentia, margine carinaque scabra.

CULMI triunciales, rarius semipedales, obtuse trigoni, crassiusculi, sæpius incurvi, læves, basi tantum foliosi.

SPICA mascula obovata, 4-6 lineas longa, florens obtusissima, ex fusco et albo pulchre variegata.

GLUMÆ concinne imbricatæ, obovatæ, obtusissimæ, fuscæ, nervo dorsali fere concolore evanido, margine late scarioso, argenteo, apice per lentem brevissime ciliatæ vel parum erosæ.

SPICÆ fæmineæ una duæve, rarius tres, sessiles, appressæ, mascula duplo breviores, ovatæ vel obovatæ. *Bractea* brevissime vaginans, nigricans, brevis, subtruncata, carina in aristam viridem, spica plerumque breviorē producta. *Vagina* subnulla, vix lineam unam longa.

GLUMÆ ovatæ, obtusissimæ, masculis fere similes, nervo dorsali etiam evanido, apice subinde glabræ.

FRUCTUS obovati, obtusius trigoni, dilute fuscī, per lentem brevissime pubescentes, obtusissimi, mucrone brevissimo, crassiusculo, integro truncatoque instructi. (D. v.)

Planta in Helvetia rarissima nonnisi in alpibus reperitur; ad locos apricos sterilesque. In alpibus *Rhæticis*, et montibus *Sursees*. SCHEUCHZER. In *M. Alesse*, qua adscenditur ad *M. Foulx* plantam nuper non visam invenit amiciss. L. THOMAS et ibi cum eo ipse frequentem legi. Eam etiam in alpibus supra *D. Nicolai* valem ad pedem *Sylvii* observavi. — Perennis. Fl. Julio et Augusto.

OBS. *Carex* Hall. helv. 1371. β et Scheuchz. Gram. 437. tab. X. fig. 12 certe non huc pertinent.

57. *CAREX pilulifera* L. — C. spicis fœmineis sessilibus approximatis subrotundis, glumis margine scariosis, fructibus subrotundis pubescentibus. N. (Gall. *Caret à pilules*.)

C. pilulifera L. *Sp. pl.* 1385. *Good. Car.* n.º 37. *Smith brit.* 995. *Hoffm. l. c.* p. 216. *Decand. Fl. fr.* 1734. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 259. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 385. *Pers. syn.* 2. p. 540.

~~~~~

*Schkuhr Car.* n.º 64. tab. J. fig. 41. *C. filiformis* *Fl. dan.* tab. 1048.

~~~~~

C. pilulifera *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c. Dec.* 2. *C. decumbens* *Ehrh. Gram. exs. Dec.* 7. n.º 70.

RADIX fibrosa, cespitosa.

FOLIA erecta, demum apice recurva, planiuscula, carinata, margine nervoque dorsali scabra, lineam unam vel sesquilineam lata. *Vaginæ* inferiores viridiusculæ nec purpurascentes ut in *C. montana* et *tomentosa*.

CULMI debiles gracilesque, sæpius incurvi vel decumbentes, triunciales, semipedales vel dodrantales, basi tantum foliosi, acute trigoni, striati, apice ad angulos scabriusculi,

SPICA *mascula* lanceolata vel elliptica, oblongo-acuta, fere semuncialis.

GLUMÆ lanceolatæ, acutæ, muticæ, ferrugineæ, margine scarioso albido, nervo dorsali viridi, valido, subevanido.

SPICÆ *fœmineæ* duæ vel tres (rarissime unica), sessiles, confertæ, parvæ, paucifloræ, subrotundæ. *Foliolum* florale angustum, viride, basi quandoque in bracteam scariosam coloratamque ampliatum, spica plerumque duplo triplove longiores. *Vagina* nulla vel brevissima. *Bractea* ad basin spicarum superiorum glumis major.

GLUMÆ masculis similes, carinatæ, nervo dorsali plerumque in mucronem aristamve brevem exasperatam producto.

FRUCTUS glumis breviores, ovati vel subrotundi, brevissime pubescentes, virides, mucronulati, apice integri. (D. v.)

In Helvetia rarior. Hab. locis montanis, apricis. In M. *Neocomensibus*. Cl. CHAILLET. In M. *Gurien*. SERINGE. Supra *Locarnum*. SCHLEICHER. In *Valesia inferiari*. Rev. MURITH. In M. *Jorat* supra *Lausannam* etiam invenit J. GAY. Fl. Majo et Junio.

OBS. specimina nostra cum parisiis collata optime conveniunt. — *C. piluliferam* et *montanam* LINNÆI unam eandemque plantam esse contendit GOODENOVIUS. l. c.

58. *CAREX hispidula* N. — *C. spica fœminea* infima axillari subpedunculata, fructibus hispidulis setis appressis, culmo triquetro scabro, N. (Gall. *Caret à fruit rude*.)

C. erecta? Decand. *Fl. fr.* 1741.

~~~~~  
*C. fimbriata Schkuhr Nachtr. n.º 75. tab. Uuv. f. 165.*

~~~~~  
C. fimbriata Schleich. l. c. p. 9. — Etiam apud amiciss. THOMASIIUM exsiccata prostat.

RADIX valida, cespitosa, subrepens v. stolonifera. Fibræ validæ, tortuosæ.

CULMI 6-10 uncias alti, tenues, stricti, acute trigoni, superne scabriusculi, inferne foliosi.

FOLIA læte viridia, planiuscula, superne sensim in acumen longum tenuissimumque producta, ceterum lineam fere integram lata, culmo adulto breviora, erecta, nonnisi superne scabriuscula.

SPICA mascula semuncialis vel paulo longior, clavata, obtusa, versus basin sensim attenuata.

GLUMÆ elongatæ, obtusiusculæ, integræ, angustæ, purpureo-ferrugineæ, superne late scariosæ, nervo dorsali infra apicem evanido, latiusculo, viridi.

SPICÆ *fœmineæ* duæ (rarius unica), erectæ; *superior* masculæ approximata, eademque duplo triploque brevior, subsessilis; *bractea* glumis fere similis in foliolum setaceum spicam superans producta: *inferior* subremota, superiori fere duplo longior, axillaris, pedunculo breviter exserto vel toti tecto insidens. *Foliolum* florale erectum, angustum, viride, spicam masculam vel saltem spicam utramque fœmineam superans. *Vagina* 1-5 $\frac{1}{2}$ lineas longa, pedunculum fere æquans.

GLUMÆ laxius imbricatæ, multo quam masculæ breviores, ovatæ, ad margines superne etiam, sed

minus late scariosæ, obtusæ, nervo valido viridi in mucronem brevissimum crassiusculumque producto, dorso ferrugineæ.

FRUCTUS glumis paulo longiores, ovato-triquetri, mucronati, apice scarioso, bidentato, ad angulos pilis subpatentibus instructi, superficie autem, præcipue superne selis rigidulis appressis, nec nisi validioris lentis ope conspicuis conspersi. (D. s.)

Rarissima. In fissuris rupium alpium editissimarum ad moles glaciales. In alpiibus vallis de *Bagnes* invenit amiciss. Lud.

THOMAS anno 1808. In montibus *Sylvio* et *Râfel* prope *Zermatten*. SCHLEICHERUS etiam misit. — Perennis. Fl. Jul. et Aug.

Obs. Cl. SCHKURH hauc plantam etiam ex Helvetia nostra accepit et primus omnium rite descripsit ac ære expressit. Nomen autem quod ei dedit ut improprium rejeci: nam glumæ neutiquam fimbriatæ sed tantum marginatæ sunt, quod etiam nomen schkuhrianum germanicum (*gesauntschuppiges Riedgras*) indicat. Hæc nova species affinis est *C. sempervirenti*; facile tamen culmo acute trigono, scabriusculo, pedunculis multo brevioribus, plerumque tectis, et glumarum forma coloreque, dignoscitur.

59. *CAREX gynobasis* Vill. — *C. spicis* fœmineis subsessilibus paucifloris masculæ approximatis: ima radicali, longissime pedunculata, fructibus obovatis. N. (*Gall. Caret à épi radical.*)

Carex Hall. helv. 1385? (*vix ac ne vix*); sic et *App. ad Scheuchz. Gram.* p. 43. n.^o 14? — *C. alpestris Sut. Fl. helv.* 2. p. 250. *C. gynobasis Etr. de Fl.* 145.



C. gynobasis Vill. delph. 2. p. 206. *Hoffm. l. c.* 213. *Pers. syn.* 2. p. 543. *Decand. Fl. fr.* 1737. *C. alpestris Willd. Sp. pl.* 4. p. 284.



C. gynobasis Schknh. *Car.* n.º 59. tab. *G.* fig. 35.

C. diversiflora Host *Gram. austr.* 1. tab. 70.



C. gynobasis Thom. *l. c.* p. 13. *Seringe l. c.* Dec. 4.

C. alpestris Schleich. *l. c.* p. 9.

RADIX fere lignosa, fibris validis, nigricantibus.

FOLIA fere omnia radicalia, cespitosa, duriuscula, culmo saltem fructifero breviora, lineam unam, rarius duas lata, erecta, superne recurva, scabra.

CULMI graciles, trigoni, scabri, erecti, demum nutantes, fere omnino nudi, semipedales, pedales.

SPICA mascula 4-9 lineas longa, teres, ferruginea, erecta, multiflora.

GLUMÆ ovato-oblongæ, obtusiusculæ, subapiculatæ, ferrugineæ, margine albidæ, apice tenuissime ciliatæ, nervo dorsali valido, albido, evanescenti.

SPICÆ *fœmineæ culmæ* 5-4-floræ, subsessiles, minimæ, contiguæ, masculæ approximatæ, una vel duæ: suprema cum mascula confluenta. *Bractææ* sessiles (neq. vaginantes), semicoloratæ, sæpe obcordatæ, amplæ, nervo dorsali valido in foliolum viride spicam fere æquans producto.

GLUMÆ ovato-lanceolatæ, acutiusculæ, ex ferrugineo rubellæ, margine valde angusto scarioso instructæ, nervis 2-5 viridibus, approximatis, confluentibus, subevanidis.

SPICÆ *fœmineæ radicales*, 1-2-5ve, quævis pedunculo 3-6-unciali, gracillimo, scabro insidentes, ovatæ, subsexfloræ, culmeis ceterum consimiles.

FRUCTUS grandes, gluma tamen paulo breviores, albidī, oblongi, obovati, vel pyriformes, subtri-
goni, mucrone brevi, apice truncato, integerrimo,
superne pilis brevissimis rariusculisque lentis ope
conspicuis conspersi, profunde striati. (D. s.)

Hab. locis apricis planitie, in muris, non ubique. In *Valesia inferiori*. Rever. MURITH. SCHLEICHER. *Neocomi* Cl. CHAILLET. *Aquilejæ*. Prope *Genevam* ad pedem M. *Salevæ*. Cl. HERMES. *A la Vaux entre la tour de Marsan et Chexbres*. J. GAY. — Perennis. Fl. Aprili.

Obs. I. Sux HALLERUS folia 2 lineas lata, lævia, carina tantum scabriuscula, spicam masculam a lævipinea suprema distantem capsulasque mucronatas rostro valente bifido tribuit, quibus notis, ne quid de loco natali prius alieno dicam, haud parum a nostra differt. An *Car. alpestris* All. pedem. 2. p. 270. n.º 2529 in M. *Rosa* et in aliis alpi- bus lecta huc pertineat valde incertum est.

Obs. II. *C. gynobasis* nullo pacto *alpestris* vocari potest quippe quæ nunquam in montanis pedum in alpi- bus crescat. Est planta planitie et quidem regionum calidiorum.

40. *CAREX clandestina* Good. — *C.* bracteis scariosis vaginantibus aphyllis, spicis foemineis remotis paucifloris vagina inclusis, foliis canaliculatis. Smith. (Gall. *Caret clandestin.*)


Carex Hall. *helv.* 1370 α et β . Scheuchz. *Gram.* 407 et 408. *C.* prostrata et *C.* Gesneri Sut. *Fl. helv.* 2. p. 248. *C. clandestina* Etr. de *Fl.* p. 132.

~~~~~

*C. clandestina* Good. *Car.* n.º 19. Smith *brit.* 98. Hoffm. l. c. p. 218. Decand. *Fl. fr.* 1736. Pers. *syn.* 2. p. 543. Willd. *Sp. pl.* 4. p. 254. — *C.* argentea Vill. *delph.* 2. p. 206. *excl. syn.* *C.* scariosa Lam. *Enc. méth.* 3. p. 388. *syn. omnibus*



*præter Scheuchz. excl. — C. prostrata All. pedem.*  
2312.



*C. clandestina Schkuhr Car. n.º 67. tab. K. fig. 43.*  
*Host Gram. austr. 1. tab. 67.*



*C. clandestina Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.*  
*Seringe l. c. Dec. 2.*

RADIX fusca, lignescens, horizontalis v. obliqua, squamis tecta, multiceps.

FOLIA canaliculata, linea angustiora, juniora tenera, adulta arida et scabriuscula. Primo vere nascuntur et per totam æstalem crescunt, ut autumno sæpe fere pedalia sint; persistunt etiam per hiemem et vere denuo semimarcida inveniuntur.

CULMI foliis junioribus longiores, adultis multo breviores, erecti, senescentes prostrati, vix 4 uncias longi, basi tantum foliosi, ad spicas racheos *Lolii* more excavati.

SPICA mascula subtrigona, elliptico-linearis, acuta, 6-8 lineas longa.

GLUMÆ oblongo-ovatae, obtusae, amplae, ferrugineae, fuscae, vix carinatae, nervo dorsali tenuissimo, viridi, evanido, margine late scarioso ampliatæ.

SPICÆ foemineæ 2-4-floræ, intra vaginas pedunculatae, sæpius 4-6, remotæ, totum culmum obsidentes, per florescentiam in vaginis quasi latitantes, maturæ exsertæ ut inferiorum pedunculi subinde compareant. *Bracteæ* amplae, marginibus late sca-

riosæ, subfuscae, dorso viridulæ, plerumque aphyllæ, tubuloso-vaginantés, superne tantum apertæ.

GLUMÆ saturatius fuscae quam masculæ, minus obtusæ, margine scarioso angustiori.

FRUCTUS obovati, trigoni, utrinque mucronati, superne pilis brevissimis rarisque pubescentes, apice integri. (D. v.)

Habitat locis aridis subapricis ad sylvarum margines. In M. Uetliaco supra villam Friessenberg. SCHEUCHZER. Circa Roche. HALLER. *Au bois de Prangins* prope lacum. — Perennis. Fl. Martio-Majo.

41. *CAREX digitata* L. — C. bracteis vaginantibus subaphyllis: infima foliolosa, spicis scemineis masculam superantibus: inferiori remota N. (Gall. *Caret digitata*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1376. Scheuchz. *Gram.* 448. tab. 10. fig. 14. *Sut. Fl. helv.* 2. p. 247. *Etr. de Fl.* p. 126.

~~~~~

C. digitata L. *Sp. pl.* 1384. *Good. Car.* n.º 18. *Smith brit.* 979. *Hoffm. l. c.* p. 215. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 388. *Decand. Fl. fr.* 1739. *Pers. syn.* 2. p. 542. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 256. *Vill. delph.* 2. p. 204.

~~~~~

*Schkuhr Car.* n.º 63. tab. II. fig. 38. *Leers herb.* 202. tab. 16. fig. 4. *Host Gram. austr.* 1. tab. 60.

~~~~~

Ehrh. Gram. exs. Dec. 12. n.º 120. *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c. Dec.* 2.

RADIX nigricans, multiceps, fibrosa.

FOLIA radicalia plicato-carinata, margine carinaque scabriuscula, sesquilineam ad 2 lineas lata,

culmo adulto breviora; *culmea* distantia, brevissima, angusta.

CULMI graciles, 6-9 uncias longi, teretiusculi, læves vel ad angulos infra spicas scabriusculi, foliosi, *vaginis* longis, per florescentiam fusco-rubentibus, ceterum læte viridia.

SPICA mascula, terminalis, oblonga, acuta.

GLUMÆ fusco-rubentes, ad marginem scariosum albidæ, ovatæ.

SPICÆ fœminæ lineares, paniculoræ; una alterave masculæ approximatae eamque apice superantes, subpedunculatae; *bracteis* amplis vaginantibus, scariosis aphyllis suffultæ: *vaginæ* bractearum pedunculum fere æquantes. SPICÆ reliquæ *fœminæ* (una duæve) a prioribus et inter se remotiusculæ. Infima conspicue pedunculata nascitur ex axilla *bractee* vaginantis fere semper in foliolum productæ vel *foliæ* floralis reliquis consimilis.

GLUMÆ laxius imbricatæ, mucronatæ, dilatatae, apice quasi truncatae, carinatae, dorso virides, ceterum rubellæ, margine scariosæ.

FRUCTUS glumas æquantes, remoti, obovati, triquetri, utriusque mucronati, apice indivisi, pilis brevissimis rarisque conspersi. (D. v.)

Hab. in sylvis et locis umbrosis, præsertim submontanis. In M. Mutet et Chapuisse. Circa Tigurum et Tobinium. Ubique in sylvis ad pedem M. Juræ, etc. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

42. *CAREX ornithopoda* Willd.—*C.* spicis linearibus : foemineis digitatis subsessilibus masculam æquantibus, bracteis aphyllis vaginantibus. N. (Gall. *Caret pied-d'oiseau*.)

Carex Hall. *helv.* 1375. Scheuchz. *Gram.* 450. *C.* pedata Sut. *Fl. helv.* 2. p. 247. *Etr. de Fl.* p. 128.

~~~~~

*C.* ornithopoda Willd. *Sp. pl.* 4. p. 255. *Pers. syn.* 2. p. 542. Schkuhr *Nachtr.* p. 57. — *C.* pedata Auctor. Lam. *Enc. méth.* 3. p. 389. Hoffm. *l. c.* p. 215. Decand. *Fl. fr.* 1738. Vill. *delph.* 2. p. 203.

~~~~~

C. pedata Schkuhr *Car. n.º* 62. tab. H. fig. 38. Host *Gram. austr.* 1. tab. 61.

~~~~~

*C.* ornithopoda Schleich. *l. c.* p. 9. Seringe *l. c.* Dec. 2. Thom. *l. c.* p. 13.

RADIX fere prioris, sed multo magis cespitosa.

FOLIA fere omnia radicalia, numerosa, 1-2 lineas lata, tenera, culmum florentem æquantia, demum eodem fere duplo breviora, marginibus ad medium lævia, superne antrorsum, inferne retrorsum scabriuscula.

CULMI valde numerosi, 3-5 uncias longi, debiles, subnutantes, angulosi, fere nudi, basi tantum foliolis paucis brevissimis, parum conspicuis, vaginantibus instructi.

SPICA mascula terminalis, gracilis, linearis, ad lineas 5 longa.

GLUMÆ obovatæ, obtusissimæ, nervo viridi evanido, dilutius fusæ, apice et marginibus late scariosæ, superne subcrenatæ.

SPICÆ *fœmineæ* 4-5, subsessiles, masculam æquantes vel superantes, multo teneriores minoresque quem prioris, omnes, præcipue dum florent, approximato-digitatæ, lineares. *Bracteæ* vaginantes, fuscæ, obtusæ, plerumque aphyllæ muticæque, rarius in aristam desinentes.

GLUMÆ obovatæ, subretusæ, fuscæ, margine scariosæ, nervo viridi in mucronem producto.

FRUCTUS distantes, pyriformes, triquetri, brevissime pubescentes, utrinque mucronati, glumis paulo longiores. (D. v.)

Haud rara in pratis agri *Nevidunensis*, ad oras sylvarum. *Basileæ* inter *Hiesam* et *Birsam*. *Genevæ*. In sylva *Bremgarten*, etc. — Perennis. Fl. Apr. et Majo.

Obs. Affinis quidem præcedenti, facile tamen dignoscitur. — Hucusque ab omnibus fere pro *C. pedata* L. planta nuperis, quantum novi, ignota, habita est. Descriptio autem LINNÆÆ nequaquam cum nostra convenit. Nam *sua* folia rigida, angustissima, subuliformia, pedalia, culmum solidiorem, spicas fœmineas tantum duas, sessiles, ovato-oblongas, inferiorem axillarem tribuit, quibus notis a *C. pedata* auctorum abunde differre videtur. Ergo recte Cl. WILLDENOVIVS nomen inmutavit.

B. *Fructus glabri vel saltem tantum ad angulos scabri.*

45. *CAREX alba* Scop. — C. spicis fœmineis distantibus masculam subæquantibus scariosis pedunculatis paucifloris, foliis setaceo-canaliculatis. N. (Gall. *Caret argenté.*)

*Carex Hall. helv.* 1377. *Scheuchz. Gram.* 410. tab. 10. fig. 3. 4. 5. *C. alba Sut. Fl. helv.* 2. p. 258. *C. argentea Etr. de Fl.* p. 130.

- ~~~~~  
*C. alba Willd. Sp. pl. 4. p. 253. Pers. syn. 2. p. 545. Hoffm. l. c. p. 228. Decand. Fl. fr. 1752.*  
*C. scariosa Lam. Enc. méth. 3. p. 388.*

- ~~~~~  
*C. alba Schkuhr Car. n.º 81. tab. O. fig. 55. Host Gram. austr. 1. tab. 59.*

- ~~~~~  
*C. alba Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13. Seringe l. c. Dec. 2.*

RADIX repens , fibris nigris , capillatis , cespitosa.

FOLIA valde numerosa, vix ultra dimidiam lineam lata , longa , culmo tamen breviora , canaliculata , firma, erecta, scabriuscula , erecta , saturate viridia.

CULMI semipedales et pedales , obsolete trigoni , inter spicas scabriusculi , fere nudi , inferne tantum foliolis nonnullis parum conspicuis et vaginis eorum longis scariosisque instructi.

SPICA mascula terminalis, elliptico, linearis, acuta-lineas fere 6 longa , argentea.

GLUMÆ latae, obtusissimæ, laxæ, scarioso-hyalinæ.

SPICÆ fœminæ duæ vel tres oblongæ, mascula breviores, paucifloræ, florentes lineares , fructiferæ ellipticæ, distantes, pedunculatæ : suprema masculam apice plerumque æquans vel superans. Pedunculi modo brevissimi , modo fere unciales. Bracteæ plerumque aphyllæ, longe vaginantes , spathacæ, scarioso-argenteæ.

GLUMÆ obovatæ, latae, acuminatæ, scarioso-argenteæ, carinatæ, nervo dorsali viridi , exasperato , ad apicem extenso.



FRUCTUS 3-8 in quavis spica, distantes, læves, nitidi, subinflati, trigono-ovati, rostro brevi, scarioso, subvaginanti, truncato. (D. v.)

Planta pulchella habitat in sylvis montanis. In sylva *Bremgarten. Tiguri.* Circa *Burgdorf. Basileæ. A Roche.* In *M. Wasserfall.* Ad pedem *M. Juræ* supra *Bonmont* et *Trélex*, etc. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

44. *CAREX flava* L. — C. spica mascula lineari: foemineis subsessilibus confertis subrotundis, fructibus globosis rostratis recurvis. L. (Gall. *Caret jaune.*)

*Carex Hall. helv.* 1380. *Scheuchz. Gram.* 426. C. *flava Sut. Fl. helv.* 2. p. 247. *Etr. de Fl.* p. 134.

~~~~~

C. *flava* L. *Sp. pl.* 1384. *Good. Car. n.º* 24. *Smith brit.* 990. *Hoffm. l. c.* p. 214. *Decand. Fl. fr.* 1745. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 268. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 385. *Pers. syn.* 2. p. 542.

~~~~~

*Schkuhr Car. n.º* 68. tab. *H.* fig. 36. *Host Gram. austr.* 1. tab. 64. *Leers herb.* 202. tab. 15. fig. 6. *Fl. dan.* tab. 1047.

~~~~~

Schleich. l. c. p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c. Dec.* 3.

β. *patula*, spica mascula oblonga trigona, foemineis ovatis approximatis, pistillis patulis, fructuum rostris rectis reflexisque, foliis floralibus laxis.

C. *patula* *Host Gram. austr.* 1. tab. 64.

γ. *Oederi*, spicis foemineis subquaternis, fructuum rostro rectiusculo, culmo humili, radice fibrosa.

C. Oederi *Sut. Fl. helv.* 2. p. 247.

C. flava γ . *Willd. Sp. pl.* 4. p. 268. C. flava β . *Dec. Fl. fr.* 1745. C. Oederi *Hoffm. l. c.* p. 210. *Pers. syn.* 2. p. 542.

C. Oederi *Schkuhr Car. n.º* 55. tab. F. fig. 26. *Host Gram. austr.* 1. tab. 65.

C. flava β patula et γ Oederi *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. C. Oederi *Ehrh. Gram. exs. Dec.* 8. n.º 79.

α et β . RADIX transversa, gracilis, dura, fibras innumeras spargens, cespitosa.

FOLIA inæqualia, 2-4 lineas longa, circiter sesquilineam lata, caryophyllea, læte viridia, vix scabriuscula.

CULMI dimidia parte inferiori foliosi, spithamei vel pedales, teretiusculi, læves, nitidi, erecti.

SPICA mascula plerumque solitaria (rarissime gemina), oblonga, florens subclavata, deinde linearis gracilisque. Bractea concava, margine scariosa.

GLUMÆ ovato-lanceolatae, fusco-ferrugineae, nervo dorsali viridi, demum luteo.

SPICÆ femineae plerumque duae, subglobosae, rarius oblongo-ovatae, subsessiles, approximatae, infima pedunculo brevissimo, vagina brevissima folii floralis imi fere toti tecto insidens. Folia floralia culmum multo superantia, brevissime vaginantia.

GLUMÆ lanceolatae, mucronatae, rubellae, dorso viridiusculae, margine albido. Spicae maturae ob fructus undique divergentes glumisque multo longiores, squarrosae.

FRUCTUS dense imbricati, juniores virides, maturi flavescentes, inflati, subglobosi, longe rostrati, nitidi, ad angulos etiam glabri, rostro plus minusve incurvo, apice bifido. (D. v.)

In paludosis et locis aquaticis vulgarissima. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

γ. RADIX inere fibrosa, (cel. HOSTIO monente) per totam æstatem novos foliorum culmorumque cespites spargens, ut plantam semper florentem vel fructiferam reperire queas. — CULMUS humilis. SPICÆ numerosiores, confertæ, ceterum ut in vulgari. FRUCTUUM rostrum minus acutum, rectiusculum. (D. v.)

Locis arenosis, humidis, ad littora lacuum vulgaris. —
— Perennis. Fl. per totam æstatem.

OBS. *C. flava* mirum in modum variat, ut omnino nihil obstaret quin species 5 vel 4 novæ vel intermediæ eodem fere jure ac *C. patula* et *C. Oederi* præter *flavam* sisterentur.

45. *CAREX fulva*. Good. — *C. vaginis inferioribus subdimidiatis, superioribus subæquantibus, spicis remotis ovato-oblongis, fructibus ovatis rostratis*. Schk. (Gall. *Caret fauve.*)

Carex Hall. helv. 1382 β. *Nomencl.* 1383. *C. fulva Etr. de Fl.* p. 141.

~~~~~  
*C. fulva Good. l. c. n.º 26. Smith brit.* 991. *Hoffm. l. c. p.* 232. *Decand. Fl. fr.* 1755. *Pers. syn.* 2. p. 542. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 270.

~~~~~  
C. fulva Good. l. c. in Röm. Arch. II. 2. tab. 2. fig. 6. *Schk. Car. n.º 86. tab. T. fig. 67. Host Gram.*

austr. 1. tab. 77. (*Iconem vix mediocrem ob glumas omnino muticus, nervo dorsali evanido huc referimus*). *C. trigona* *All. pedem.* 2325. tab. 89. f. 4.

C. fulva *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13, *Seringe l. c. Dec. 2.*

RADIX repens.

CULMI trigoni, infra spicam infimam ad angulos scabri, pedales vel paulo longiores.

FOLIA fere sequentis, obscurius viridia; *floralia* culmo multa breviora, eodem modo ut sequentis vaginantia, *vaginis* truncatis, apice plerumque fuscis, nec antice in ligulam solutam albidamque desinentibus.

SPICA *mascula* gracilis, 6-9 lineas longa, erecta. *Fæmineæ* 2-5, florentes subapproximatæ, fructiferæ plus minusve remotæ, ovato-oblongæ, apice quandoque masculæ.

GLUMÆ omnes semper muticæ, obtusiusculæ, oblongæ, nervo dorsali unico, lævi, tenuissimo, evanido, fulvæ vel rubellæ, marginibus scariosæ, *Stigmata* 5.

FRUCTUS ex fusco virentes v. lividi, prioris fructibus fere duplo minores, breviter ovati, fere rotundi, obsolete trigoni, angulis lævissimis, vix exstantibus, nervis etiam minus quam in *C. distant* prominulis, rostro lineari, obiter exasperato, apice bidentato, dentibus vix divergentibus. (D. v.)

Hab. in pratis paludosis, minime rara. *Neviduni*, vulgo. *Michelfeldæ*. HALLER. Circa *Bernam*. SERINGE. In paludibus prope *Vervay*. SCHLEICHER. *Lausannæ*, etc. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

Obs. Affinis sequenti quacum sæpe confusa est. *A flava* distinctissima, v. g. fructuum rostris semper erectis, nec divergentibus, ut de reliquis taceam.

46. *CAREX distans*. L. — C. vaginis subæquantibus, inferioribus subdinidialis, spicis remotissimis axillaribus, fructibus ovatis angulosis acutis. N. (Gall. *Caret espace.*)

Carex Hall. helv. 1382. *Scheuchz. Gram.* 431;
Sut. Fl. helv. 2. p. 257. *Etr. de Fl.* p. 139.

~~~~~

*C. distans* L. *Sp. pl.* 1387. *Smith brit.* 992. *Good.*  
*Car.* n.<sup>o</sup> 27. *Hoffm. l. c.* p. 253. *Decand. Fl. fr.* 1756.  
*Lam. Enc. méth.* 3. p. 391. *Pers. syn.* 2. p. 542.  
*Willd. Sp. pl.* 4. p. 271.

~~~~~

Schkuhr Car. tab. T. fig. 68. *Fl. dan.* tab. 1049.

~~~~~

*Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c.*  
*Dec.* 3.

**RADIX** fibrosa, multiceps.

**FOLIA** radicalia carinata, margine scabriuscula, 5-6 lineas longa, 2 lineas lata, caryophyllæa, nitida, læte virentia. *Culmea* consimilia, sed minus longa, æoque breviora quo altius in culmo nascuntur.

**CULMI** obsolete trigoni, foliis et spicis tota parte dinidia superiori instructi, pedales et sesquipedales, læves vel nonnisi superne ad angulos scabriusculi.

**SPICA** mascula terminalis, vix uncialis, crassiuscula, lanceolata, obtusa, plerumque unica; subinde tamen minor priori subjicitur.

**GLUMÆ** oblongæ, obovatæ, obtusæ, fuscæ, mar-

gine ferrugineæ, nervo dorsali latiusculo usque ad apicem et sæpe in mucronulum brevissimum hispidulum excurrente. *Antheræ* mucronulatæ.

*SPICÆ* *femineæ* oblongo-ovatæ, vel cylindricæ, remotissimæ a mascula et inter se, plerumque tres vel quatuor. *Folia* floralia culmum superantia, *vaginis* elongatis, ad orificium extrorsum ligula albida, prominula instructis, *pedunculos* inferiores, fere integros, superiorum saltem dimidiam partem tegentibus.

*GLUMÆ* late ovatæ, brevës, nervis dorsalibus 3 contiguis, apice confluentibus, exasperatis et in mucronulum hispidum productis, masculis dilutius fuscæ, margine albidæ.

*FRUCTUS* glumis longiores, fere conici, subtrianguli, angulis duobus marginibus elevatis, lævibus, apice exasperatis, rostro plerumque abbreviato, nervosi, fusci, nitiduli, apice bifidi, laciniis divergentibus. (D. v.)

Non rara in locis palustribus. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

47. *CAREX punctata*. N. C. vaginis elongatis, pedunculo brevioribus, spicis foemineis remotis, fructibus rostratis lævibus pellucido-punctatis. N. (Gall. *Caret ponctué*.)

*Carex distans* Schkuhr tab. Yy. *absque descriptione*.



*C. helvetica* Schleich. *Car. exs. fasc. 3.* *Carex punctata* *Ejusdem. cat. nov. p. 9.*

Proximis prioribus utique affinis.



**RADICEM** integram non vidimus; fibris gaudet longis validisque.

**FOLIA** culmo adulto multo breviora, plana, lævia, superne margine carinaque scabriuscula, apice subtriquetra, lineam unam vel sesquilineam lata.

**CULMUS** trigonus, erectus, foliosus, tertia vel dimidia parte spicis instructus, lævissimus nec nisi infra spicas superiores angulis plus minusve scaber, 4-12 uncias longus.

**SPICA** *mascula* terminalis, linearis, obtusiuscula, basi attenuata, multiflora, fere uncialis, erecta.

**GLUMÆ** obovatæ, oblongæ, irregulares, plerumque subretusæ, ferrugineæ, marginibus pallidioribus, nervo dorsali valido, viridi, exasperato, prominulo, ultra apicem sæpius in mucronem producto. *Anthere* brevissime mucronulatæ.

**SPICÆ** *fœmineæ* florentes approximatae, fructiferæ remotissimæ, plerumque ternæ, cylindricæ, mascula multo crassiores, erectæ, axillares. **FOLIA** *floralia* culmum fere æquantia, erecta, longe vaginantia. *Vaginæ* ad orificium ligula duplici alba instructæ; interiori folio agglutinata, oblonga, obtusa; exteriori prominula, truncata. *Pedunculi* pro parte maxima vagina tecti, omnes tamen plus minusve exserti.

**GLUMÆ** dense imbricatæ, ovatæ, masculis multo breviores, pallidissime ferrugineæ, subretusæ, nervo valido in mucronem obiter exasperatum producto.

**FRUCTUS**, virides, nitentes, lævissimi, superficiei ad lentem minutissime crebreque punctis pellucidis notati, ovati, subtrigoni, nervis duobus marginalibus exstantibus, faciebus obsolete nervosis, vixque

striatis, rostro brevi lævissimo, apice breviter bifido instructi. *Semen* triquetrum. (D. s.)

SCHLEICHERUS in solo micaceo, ni fallor Helvetiæ *insubricæ* inventam misit. In Italia minime raram esse amiciss. LUD. THOMAS qui eam prope *Papiam* collegit attulitque nos certiores fecit. Eam etiam in herbariis Cl. BALBISI, circa *Taurinum* copiose repertam hoc anno (1811) apud virum celeberrimum vidimus. — Perennis. Fl. vere.

OBS. Nonnullis notis cum *C. binervi* Sm. convenire, pluribus autem ab ea recedere videtur. Differt, verbi gratia, statura minori, spicis minus numerosis, simplicissimis, colore fructuum intus haudquaquam sanguineorum, etc.

48. *CAREX pendula* Huds. — *C. vaginis* elongatis subæquantibus, spicis cylindricis longissimis: foemineis pendulis, fructibus confertis apice integerrimis. N. (Gall. *Caret élevé.*)

*Carex Hall. helv.* 1396. *Scheuchz. Gram.* 544. *C. maxima Sut. Fl. helv.* 2. p. 257.

~~~~~

C. pendula Good. Car. n.º 20. Smith brit. 981. *Hoffm. l. c.* p. 231. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 288.

~~~~~

*C. agastachys L. suppl.* 414. *Pers. syn.* 2. p. 544.

*C. maxima Lam. Enc. méth.* 3. p. 393. *Decand. Fl. fr.* 1754.

~~~~~

C. pendula Schkuhr Car. n.º 85. tab. Q. fig. 60. Host Gram. austr. 1. tab. 100.

~~~~~

*C. pendula Schleich. l. c.* p. 9. *C. maxima Thom. l. c.* p. 13.

RADIX longa, valida, crassa, lignescens, articulata, squamosa.

**CULMI** 3-5-pedales, triquetri, angulis tamen superne obtusiusculis, læves, inter spicas scabrinsculi, foliosi.

**FOLIA** culino breviora licet valde longa, superne sæpe recurva, totius generis latissima, dorso glauca, facie late viridia, carinata, dorso profunde bisulca, margine carinaque scabra.

**SPICA mascula** terminalis, erectiuscula, gracilis, cylindrica, 5-5 uncias longa, basi quandoque foeminea. Infra eam una subinde, duæve aliæ spicæ masculæ minores adsunt.

**GLUMÆ** parvæ, spadiceæ, vel ferrugineæ, angustæ, oblongæ, lanceolatæ, nervo dorsali albido, margine angusto, scarioso parumque conspicuo instructæ.

**SPICÆ foemineæ** 5-6, distantes, plerumque gracillimæ, 4-6 uncias longæ, arcte imbricatæ, florentes erectiusculæ, fructiferæ curvato-pendulæ: superiores subinde apice masculæ, quasi sessiles, bractea vaginanti in foliolum viride angustissimum producta instructæ: inferiores axillares. **FOLIA floralia** patentia, lata, longissima, vaginis elongatis, pedunculum integrum vel saltem maximam ejus partem obtegentes.

**GLUMÆ** arcte imbricatæ, media parte virides, ceterum ex fusco purpureæ, ovatæ, latiusculæ, nervo in mucronem producto.

**FRUCTUS** minimi, ovato-conici, subtrigoni, læves, apice submembranaceo, oblique truncato, integerrimo. (D. v.)

In locis aquaticis umbrosisque. *Bernæ* in sylva *Bremgarten*, supra villam *Häsele*. Supra villam *Höckler*, ad ascensum

M. Uetliberg. SCHEUCHZ. Ibi etiam invenimus. Prope Nevidunum ad littora Promenthusæ passim, v. gr. près du pont de Clarens et au-dessous du pont de la grande route, etc. — Perennis. Fl. Majo et fructus edit Junio.

49. *CAREX pallescens*. L. — C. spicis foemineis pedunculatis, glumis concinne imbricatis, vaginis floralibus subnullis, fructibus confertis obtusis. N. (Gall. *Caret pâle*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1393. Scheuchz. *Gram.* 430. C. pallescens Sut. *Fl. helv.* 2. p. 256.

~~~~~

C. pallescens L. *Sp. pl.* 1386. Willd. *Sp. pl.* 4. p. 291. Smith *brit.* 989. Hoffm. *l. c.* p. 234. Lam. *Enc. méth.* 3. p. 391. Vill. *delph.* 2. p. 210. Pers. *syn.* 2. p. 545. Decand. *Fl. fr.* 1758.

~~~~~

C. pallescens Schkuhr *Car. n.* 92. tab. Kk. fig. 99. *Pl. dan.* tab. 1050. Host *Gram. austr.* 1. tab. 74. Leers *herb.* 206. tab. 15. fig. 4.

~~~~~

Schleich. *l. c.* p. 9. Thom. *l. c.* p. 13. Seringe *Cat.* 2. Dec. 4.

RADIX fibrosa, dura, multiceps.

FOLIA carinata, dorso bisulca, lineam circiter unam lata, culnum florentem subæquantia, deinum duplo breviora, subtus pubescentia, vaginis subpilis.

CULMI pedales vel sesquipedales, foliosi, triquetri, scabriusculi, superne ad angulos pilis rigidis, brevissimis, oculo tamen nudo conspicuis pubescentes.

SPICA mascula terminalis, gracilis, linearis, acuta, albida, fere senuncialis.

GLUMÆ oblongæ, scariosæ, pellucidæ, flavescentes, acutiusculæ, nervo viridi valido, subevanido.

SPICÆ *femineæ* ovato-oblongæ vel ellipticæ, mascula breviores, 2-5. *Pedunculi* basi distantes, apice approximati ut spicæ plerumque omnes fere contiguæ sint, fructiferi sæpe penduli, axillares. *Folium* florale innum spicam masculam sæpe superans, *vagina* brevissima, subnulla; cetera breviora.

GLUMÆ scariosæ, ovato-lanceolatæ, nervo dorsali scabriusculo, in mucronem sæpius producto.

FRUCTUS glumis paulo longiores, conferti, pallide virentes, læves, ovati, subventricosi, obtusi, brevissime mucronati, apice integri, obiter striati. (D. v.)

In sylvis et pratis umbrosis, vulgo. Etiam in alpes adscendit et HALLERUS eam in *Gotthardo* legit. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

50. *CAREX limosa* L. — C. vaginis subnullis, spicis femineis obesis ovatis pendulis pedunculatis, fructibus ovatis muticis lævibus. N. (Gall. *Caret des fanges*.)

Carex Hall. helv. 1392. *Scheuchz. Gram.* 443. tab. 40. fig. 13 (*rudis*). C. *limosa* *Sut. Fl. helv.* 2. p. 235. *Etr. de Fl.* p. 175.



C. *limosa* L. *Sp. pl.* 1386. *Smith brit.* 985. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 394. *Decand. Fl. fr.* 1757. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 293. *Pers. syn.* 2. p. 545.



C. *limosa* *Schkuhr Car. n.º* 89. tab. X et *Ada. Fl. dan.* tab. 646. *Host Gram. austr.* tom. 1. tab. 89.



C. limosa Schleich. l. c. p. 9. Thom. l. c. p. 13.

RADIX longe repens, articulata, squamosa, stolonifera.

FOLIA radicalia culmo breviora, quandoque tamen eum etiam fructiferum æquantia, carinata, margine scabriuscula, glaucescentia, vix ultra lineam unam lata, sæpe angustiora. Culmea multo breviora.

CULMI erectiusculi vel nutantes, triquetri, fere læves, semipedales, rarius basi tantum foliosi, faciebus hisculcis.

SPICA mascula terminalis, lanceolata, per florescentiam subventricosa, deflorata gracilis, erecta, dense multiflora.

GLUMÆ ovato-oblongæ, acutæ, coloratæ, absque margine scarioso, nervis 2-5ve contiguis, confluentibus, viridibus, sæpe in mucronulum exeuntibus.

SPICÆ *femineæ* 1-2, rarissime 5, distantes, ovatæ, crassiusculæ. *Pedunculi* læves, spicis longiores, florigeri jam penduli, fructiferi autem haud raro rursus eriguntur. *Folia* floralia plus minusve longa, *vaginis* brevissimis, fuscis, margine albido, truncatis.

GLUMÆ ovatæ, latæ, carinatæ, ex fusco rutilantes, mucronatæ, nervis ut in masculis instructæ.

FRUCTUS glumis paulo longiores, pulchre cæsii, nervosi, ovati, subcompressi, obtusanguli, lævisimi, brevissime mucronati, apice subscarioso, integro. *Semen* triquetrum, fuscum. (D. v.)

In paludibus montanis et alpinis rarius. Ad lacum *Felinum*.

In M. Foully. *A la chaux d'Abelle. Au bord du lac de*

Brai, près de la Tour de Gourze. A la plaine des Mosses. In M. Grimsel. SERINGE. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

51. *CAREX panicea* L. — C. spicis foemineis pedunculatis distantibus cylindricis axillaribus, vaginis subdimidiatis, fructibus ovatis obtusis truncatis N. (Gall. *Caret Panic.*)

Carex Hall. *helv.* 1405. *App.* 2 ad Scheuchz. *Gram.* p. 44. n.º 20. *C. panicea* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 256.

~~~~~

*C. panicea* L. *Sp. pl.* 1387. *Smith brit.* 998. *Hoffm. l. c.* 235. *Vill. delph.* 2. p. 216. *Willd. Sp. pl.* 1387. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 394. *Pers. syn.* 2. p. 544. *Decand. Fl. fr.* 1759\*.

~~~~~

C. panicea Schkuhr *Car.* n.º 93. tab. *LL. Leers herb.* 206. tab. 15. fig. 4. *Fl. dan.* tab. 261. *Host Gram. austr.* 1. tab. 79.

~~~~~

*C. panicea* Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 7. nº 80. *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

β. Var. *spica* foem. radicali longissime pedunculata. *Leers herb.* l. c.

RADIX repens, cespites solitarios per intervalla spargens.

FOLIA erecta, caryophyllea, firma, glauca, apice subrecurva, culmo multo breviora, carinata, dorso bisulca, carina margineque scabriuscula, lineam fere unam lata.

CULMUS debilis, obtusiuscule trigonus, faciebus nempe rotundatis, angulis vix scabriusculis, inferne tantum foliosus, trientalis et pedalis.

SPICA *mascula* plerumque unica, rarius gemina, terminalis, saltem ante florescentiam medio subventricosa, utrinque acuta, fere uncialis.

GLUMÆ ovatæ, latæ, plus minusve obtusæ, ex fusco ferrugineæ, nervo dorsali viridi, valido, evanescente, ad marginem anguste scariosæ.

SPICÆ *fœmineæ* mascula paulo breviores, erectæ, distantes, pedunculatæ, una, duæ tresve, cylindricæ, graciles, acutæ. *Foliolum* florale infimum spicam suam raro æquans, erectum, viride; cetera minora.

GLUMÆ laxiusculæ, ovato-acuminatæ, atro-fuscæ, nervo dorsali viridi, vix evanido, ora anguste scariosæ.

FRUCTUS ovati, distantes, obtusi, læves, obiter striati, livide virentes, apice colorati, mucrone vix conspicuo, truncato, vaginanti, integerrimo. (D. v.)

In paludosis fere ubique. Plantam à SCHEUCHZERO onissam etiam circa *Tigurum* frequentem vidimus. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

52. *CAREX pilosa* All.—C. foliis margine pilosis, spicis fœmineis distantibus, fructibus remotis apice bifidis, vaginis dimidiatis. N. (Gall. *Caret poileux*.)

*Carex Hall. helv. 1379. Scheuchz. Gram. 412.*

*C. pilosa Sut. Fl. helv. 2. p. 259.*

*C. pilosa All. fl. pedem. 2323. Hoffm. l. c. p. 226.*

*Decand. Fl. fr. 1749. Loisel. Fl. gall. 640. Willd.*

*Sp. pl. 4. p. 278. Pers. syn. 2. p. 642.*

~~~~~  
C. pilosa Schkuhr. Car. n.º 78. tab. M. fig. 49.

Host Gram. austr. 1. tab. 78.



C. pilosa Schleich. l. c. p. 9. Seringe l. c. Dec. 3.

RADIX geniculata, gracillima, repens, stolonifera.

FOLIA radicalia saturate viridia, pedalia et longiora, 2-5ve lineas lata, carinata, dorso profunde bisulca, ad nervos marginales pilis densis et brevibus sed valde conspicuis hirsuta, scabriuscula; *culmea* brevissima: inferiora *vaginis* amplis, fissilibus, striatis, sæpius ex fusco purpurascentibus. *Ligula* ovata, obtusa, folio adglutinata.

CULMUS obtusiuscule trigonus, striatus, ad angulos obiter scabriusculus, superne et inferne foliosus, erectus, florens semipedalis vel trientalis, demum pedalis vel paulo longior.

SPICA mascula terminalis, oblonga, subtrigona, 6-9 lineas longa, obtusiuscula.

GLUMÆ arcte imbricatæ, oblongæ, modo acutæ, modo obtusæ, ex fusco purpurascentes, nervo dorsali viridi evanido, margine anguste scarioso. *Antheræ* mucronulatæ.

SPICÆ *fœmineæ* duæ vel tres, erectæ, remotæ, graciles, teretes, fere unciales, paucifloræ. FOLIA *floralia* erecta, spicam subæquantia, breviter pilosa; *vaginæ* subdimidiatæ, tubulosæ, glabræ. *Pedunculi* erecti, subpilosi, unciales vel biunciales: supremus multo brevior.

GLUMÆ dorso virides, ceterum fuscæ, ovatæ, obtusæ, nervo dorsali sæpe exasperato, in mucronem longiusculum validumque producto.

FRUCTUS pauci, remoti, totius generis laxissimi, inflati, ovati, oblique rostrati, læves, obiter striati, apice bifidi, laciniis divergentibus. *Semen* obovatum, triquetrum. (D. s.)

Planta formosa rarissimaque habitat in sylvis montanis. In M. Zürichberg. SCHEUCHZER. Circa *Tigurum* invenit etiam Cl. SERINGE. In sylva *Bremgarten*. IDEM. In sylvis supra *Urbam*. — Perennis. Fl. Aprili.


55. *CAREX nitida* Host — C. spica mascula gracili, foeminea ima pedunculata vagina subdimidiata, fructibus subglobosis lævibus nitidis. N. (Gall. *Caret à fruit lustré*.)

Carex nitida Etr. de Fl. p. 155. C. liparocarpos *Ibid.* p. 153.




C. nitida Hoffm. l. c. p. 222. C. alpestris Lam. Enc. méth. 3. p. 389. Decand. Fl. fr. 1747. (Excl. syn. Hall. Sut. et All.) Loisel. Fl. gall. 641. Pers. syn. 2. p. 543.

C. verna Willd. Sp. pl. 4. p. 284.



C. verna Schkuhr Car. n.º 74. tab. I. fig. 46. C. nitida Host Gram. austr. 1. tab. 71.



C. verna Schleich. l. c. p. 9. C. nitida Thom. l. c. p. 2. Dec. 2.

RADIX nigrescens, subrepens, stolonifera, multiceps.

FOLIA plana, subcarinata, rigidiuscula, recurvo-patentia, carina margineque subscabra, culmo bre-

viora, ad basin 1-2ve lineas lata, cespitosa, fasciculata.

CULMI graciles, triquetri, nonnisi ad basin foliosi, 5-6 uncias longi, ad angulos scabriusculi.

SPICA *mascula* terminalis, gracilis, 5-6 lineas longa, fere teres, obtusiuscula.

GLUMÆ pulchre ferrugineæ, ovatæ, obtusæ, margine scariosæ, nervo dorsali viridi.

SPICÆ *fœmineæ* 2-5, adultæ, subrotundæ, ovatæ, obtusæ, plerumque paucifloræ: superiores masculæ approximatae, inferior plus minusve remota, longe pedunculata. *Foliolum* florale imum, minimum, viride, sæpe aristiforme, *vagina* subdimidiata, bracteiformi, fissili, fusca, dorso viridi, facie scariosa, demum fissa ut bractea videatur vagina carere.

GLUMÆ concavæ, latæ, obtusæ, ex fusco purpurascentes, margine scarioso, nervo viridi prominulo, sæpius in mucronem producto.

FRUCTUS glumis multo majores, laxiusculi, demum castanei, lævissimi, nitentes, evidentius obscuriusve trigoni, subglobosi, rostro longiusculo crasso, oblique truncato, scarioso, vaginante. (D. v.)

Hab. locis apricis aridiusculisque planitie in pago *Vaudensi* et *Valesia inferiori*. Circa *Nevidunum*. *A Branson-Seduni*. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

Obs. Nomen *C. alpestris* nequaquam tolerandum est cum planta non tantum nusquam in alpidibus, sed ne quidem locis montanis occurrat. Nec melius videtur nomen *vernæ* quod multæ aliæ species sibi majore jure vindicarent; quibus etiam a nonnullis auctoribus revera tributum est.

54. *CAREX firma* Host. — *C.* foliis brevibus firmis patulis, spicis foemineis paucifloris, fructibus oblongis rostratis apice vaginantibus. N. (Gall. *Caret ferme.*)

Carex Hall. *Nomencl.* 126. n.^o 1339*. *EjUSD. helv.* 3. p. 189. *in addl.* *C.* strigosa Sut. *Fl. helv.* 2. p. 253. (*ipso amicissimo auctore teste, excl. tamen syn. Hall.*). *C. firma* Etr. de *Fl.* p. 136.

~~~~~

*C. firma* Host *Fl. austr.* 509. *Hoffm. l. c.* p. 220. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 286. *Pers. syn.* 2. p. 542. *Decand. Fl. fr.* 1734. *Loisel. Fl. gall.* 641.

~~~~~

C. firma Schkuhr *Car. n.*^o 69. tab. O et X. fig. 54. *Host Gram. austr.* 1. tab. 75.

~~~~~

*C. firma* Schleich. *l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 3.

**RADIX** obliqua vel subrepens, dense cespitosa, fibris nigris durisque.

**FOLIA** dense fasciculata, vix ultra 2 uncias longa et sæpe duplo breviora, ad basin fere 2 lineas lata, lanceolata, acutissima, subpungentia, patula, rigida, nitida, læte virentia, caryophyllea, plana, versus apicem subtriquetra, carinata, lævia, marginibus etiam vix scabriuscula.

**CULMUS** erectiusculus, gracilis, lævis, subtrigonus vel teretiusculus, florens 2-5-uncialis, adultus fere semipedalis, fere totus nudus, prope radicem uno alterove foliolo erecto ceterisque simili instructus.



SPICA *mascula* 2-4 lineas longa, ovata, ex fusco ferruginea; culmi pars terminalis sæpe ad punctum insertionis spicæ fœmineæ superioris vel inferioris refracta.

GLUMÆ ovato-lanceolatae, obtusiusculæ, nervo dorsali tenni, viridi, ad apicem fere producto, ferrugineo-rubellæ, margine albido, angustissimo vixque conspicuo.

SPICÆ *fœmineæ* 1-2, sæpe etiam ternæ, mascula minores, ovatae, paucifloræ, modo approximatae sessilesque, modo distantes vel remotæ, tuncque longius pedunculatae. *Bracteæ* vaginantes; *vagina* longiuscula in supremis fere aphylla, *pedunculum* fere integrum, in inferioribus quando remotæ sunt partem tantum dimidiam vel tertiam ejus tegens, plerumque in foliolum angustum viride, apicem spicæ suæ nunquam attingens producta.

GLUMÆ saturatius fuscae, carinatae, nervo dorsali exasperato, sæpius in mucronulum desinente, ceterum masculis similes.

FRUCTUS oblongi, triquetri, versus basin attenuati, læves, angulis elevatis, exasperatis, rostro quandoque obliquo, apice truncato, vaginanti, integerrimo vel lacero. (D. v.)

Hab. in alpihus editioribus, locis asperis molibusque glacialibus vicinis. In M. *Sempronio*, *Wiggis* et *Frohnalpe* Glaronensium, etc. — *Près du glacier de Panérossaz*.

— Perennis. Fl. Jul. et Aug.

55. *CAREX sempervirens*, Vill. — C. vaginis subdimidiatis, spicis erectiusculis: mascula subovata, fructibus rostratis angulis exasperatis apice scarioso. N. (Gall. *Caret toujours vert*.)

- Carex Hall. helv.* 1389. *Scheuchz. Gram.* 415. *C. saxatilis* *Sut. Fl. helv.* 2. p. 252 (*excl. syn. L.*).  
*C. alpestris* *N. Etr. de Fl.* 173.

~~~~~

- C. sempervirens* *Vill. delph.* 2. p. 214.
C. ferruginea Willd. Sp. pl. 4. p. 274. *Loisel. Fl. gall.* 640. (*confusis tamen synonymis*). *Decand. Fl. fr.* 1750. α? (*excl. syn. Vill.*). *Pers. syn. pl.* 2. p. 543.
C. erecta *Decand. Fl. fr.* 1741?
C. variegata *Lam. Enc. enc. méth.* 3. p. 389. (*excl. certe synonym.*)

~~~~~

- C. ferruginea Schkuhr Car. n.º* 77. tab. *M.* fig. 43.  
*C. varia* *Host Gram. austr.* 1. tab. 80.

~~~~~

- C. ferruginea Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.
Seringe l. c. p. 2. *Dec.* 3.

RADIX fibrosa, vix stolonifera, ex fibris ramosis, nigris lignosisque constans, valde cespitosa, foliorum reliquiis coronata.

FOLIA margine scabriuscula, plana, culmo multo breviora, erecta, superne recurva, lineam dimidiam vel integram lata, firma, nitentia, saturate viridia.

CULMUS trientalis, pedalis et altior, erectus, quandoque curvulus, lævis, inter spicas scabriusculus, obsolete trigonus, basi tantum foliolis paucis parumque conspicuis instructus, ad spicam scæmineam supremam quandoque refractus.

SPICA mascula terminalis, ovato-lanceolata, bre-

vis, vix ultra 4-5 lineas longa, ex fusco et albo vel griseo eleganter variegata.

GLUMÆ obovatæ, obtusæ, latæ, margine et apice late scariosæ, sæpe mucronatæ, nitentes, fuscæ, medio dorso albidæ, nervo tenuissimo. *Bractea* glumis consimilis, sed multo major.

SPICÆ *fœmineæ* vulgo 2-5, rarius unica, distantes, longitudine fere masculæ, pedunculatæ, erectæ. *Folium* florale immum spicæ adultæ apicem rarius attingens; *vagina* tertiam vel dimidiam partem *pedunculi* 6 lineas ad 5 uncias longi tegens.

GLUMÆ atro-fuscæ, apice et margine scariosæ, quandoque acutæ, frequentius obtusæ, sæpe mucronatæ, masculis minores, ovalæ, nervo conspicuo, modo excurrente, modo subevanido.

FRUCTUS glumis paulo longiores, viriduli, graciles, trigoni ad margines pilis rigidis exasperati, faciebus superne pilis nonnullis appressis nonnisi lentis ope acrioris conspicuis conspersi, longe rostrati, apice vaginanti, scarioso, albo, oblique truncato, integro, rarius emarginato. (D. v.)

Onium nostrarum in alpium locis siccioribus etiam in jugis meridionalibus Italiam spectantibus vulgatissima; propterea eam in Monographia mea *alpestrem* appellaveram; hoc nomen autem nunc ad confusionem vitandam rejeci. Occurrit etiam in M. Dolaz, Chasseral, Montendre et Thoiry. In M. Uetliaco. — Perennis. Fl. Junio, Julio et Augusto.

56. *CAREX Scopolii*. N. — *C. vaginis subdimidiatis*, spica mascula oblonga, foemineis subpendulis, fructibus apice colorato emarginato suberistato. N. (Gall. *Caret de Scopolii*.)

Carex Hall. helv. 1390. *Scheuchz. l. c.* p. 413. tab. 10. fig. 6. *C. ferruginea Sut. Fl. helv.* 2. p. 260. *Etr. de Fl.* 168.

α Spica foeminea suprema subsessili, fructibus gracilioribus ovatis.

C. Mielichhoferi Willd. Sp. pl. 4. p. 276. *Pers. syn.* 2. p. 544. *C. ferruginea Decand. Fl. fr.* 1750 β. (Sed suæ tribuit spicas erectas.)

C. Mielichhoferi Schk. Car. Nachtr. p. 66. n.º 85. tab. *Mmmm.* fig. 159.

C. Mielichhoferi Schleich. l. c. p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

β. Spicis foemineis omnibus pedunculatis, fructibus crassioribus obovatis.

C. scopoliana Willd. Sp. pl. 4. p. 292. *Pers. syn.* 2. p. 545.

C. ferruginea. Scop. Carn. n.º 1159.

C. spadicea (non Schkuhrri) Decand. Fl. fr. 1742?

C. ferruginea Host Gram. austr. 1. tab. 81. (Excl. syn. *Schk.*)

C. scopoliana Schleich. l. c. p. 9.

RADIX gracilis, dura, articulata, repens vel saepius descendens, stolonifera.

FOLIA radicalia fasciculata, longissima, culmo tamen adulto paulo breviora, lineam circiter unam lata, carinata, margine scabrinuscula; exteriora reliquis multo latiora et breviora, idque eo magis quominus a basi distant. *Vaginæ* infimæ ex fusco purpurascentes, profunde striatæ, plerumque aphyllæ.

CULMUS semipedalis, pedalis et sesquipedalis, obsolete trigonus, inferne foliosus, ad angulos superne obiter exasperatus, apice cum spicis sæpe nutans.

SPICA mascula terminalis, cylindrica, gracilis, ferruginea, fere uncialis vel longior.

GLUMÆ oblongæ, subito lanceolatæ, obtusæ, superiores mucronatæ, ex fusco purpurascentes vel ferrugineæ, effusæ decoloratæ, margine valde angusto, scarioso, nervo dorsali dilutioni, lato, exasperato.

SPICÆ *foemineæ* 2-5, subteretes, mascula breviores, plus minusve pendulæ, remotæ, longe pedunculatæ; suprema quandoque subsessilis. **FOLIA** floralia inferiora spicam suam semper superantia, erecta, *vaginis* quartam, tertiam vel dimidiam pedunculi partem superantibus. *Pedunculi* capillares, scabri, adulti nutantes.

GLUMÆ modo laxiusculæ, modo arcte imbricatæ, ovatæ, atro-fuscae, nervo dorsali viridi exasperato, plerumque in mucronulum producto.

FRUCTUS glumis paulo longiores, viriduli, ovati, mucronati, juniores modice compressi, margine infra apicem exasperati, superficie autem in nostris omnino læves, apice purpureo plerumque distincte bilobo, laciniis fimbriato-cristatis. (D. v.)

In alpium locis humidiusculis v. uliginosis non rara. In M. Neunenen, Tschiera; au marais de l'Eity, infra M. Crej. In Alpiibus valesiacis. In M. Dolaz. — Perennis. Fl. Julio et Augusto.

Obs. Habitu, radice, foliis, colore spicæ masculæ ferrugineæ nee variegato, capsularum forma et pilorum appressorum defectu, invito summo nostro HALLERO, abunde a priori differt. Planta valde polymorpha ut sæpe diversæ ejus varietates prototidem speciebus habitæ fuerint. Quas in descriptione conjunxi, me quidem judice, neatiquam separari possunt. Nomen optimum *C. ferrugineæ* à SCOPOLIO primum huic impositum ut aptissimum et antiquissimum omnibus prætulissem mi jam ab illustribus auctoribus ad designandam priorem cui multo minus convenit usurpatum fuisset.

57. *CAREX brachystachys* Schrank. — *C. spicis* fœmineis pedunculatis linearibus subpendulis, fructibus elongatis gracilibus lævissimis, foliis convolutose-
taceis. N. (Gall. *Caret de Scheuchzer.*)

Carex Hall. helv. 1386. *Scheuchz. Gram.* 416. tab. 10. fig. 7. *C. valesiaca Sut. Fl. helv.* 259.

~~~~~

*C. brachystachys Willd. Sp. pl.* 4. p. 276. *Pers. syn.* 2. p. 544. *Decand. Fl. fr.* 1748. *Loisel. Fl. gall.* 641. (*Excl. syn. All. et Hall.*)

~~~~~

Schkuhr Car. n.º 83. tab. *P.* fig. 58.

~~~~~

*C. brachystachys Schleich. l. c.* p. 9.

RADIX «repens.» SCHEUCHZER.

FOLIA radicalia cespitosa erecta, apice cito marcescentia tortiliaque, vix ultra dimidiam lineam lata et angustiora, convolutose-tacea vel canaliculata, rigidiuscula. Culmea inferiora brevissima. Vaginæ imæ aphyllæ.



**CULMUS** erectus, semipedalis, pedalis, filiformis, gracilis, lævis, foliosus, obscure trigonus, foliis modo brevior, modo longior.

**SPICA** *mascula* terminalis, linearis, erectiuscula, *fœmineis* sæpe brevior.

**GLUMÆ** arcte imbricatæ, obovatæ, obtusissimæ et quasi truncatæ, apice subciliatæ, ferruginæ, marginibus angustis, albescentibus, nervo dorsali lævi, valido, viridi, in mucronem hispidulum producto.

**SPICÆ** *fœmineæ* 2-5ve, juniores erectæ, demum nutantes, maturæ ex viridi et ferrugineo varizæ, remotæ, graciles, lineares, 4-6 lineas longæ. *Folia* floralia ceteris consimilia, spica sua plerumque breviora, erecta. *Flaginæ* abbreviatæ, tertiam seu quartam pedunculi partem obtegentes. *Pedunculi* inferiores longissimi: omnes filiformes, scabriusculi.

**GLUMÆ** laxæ, inferne remotiusculæ, masculis similes sed breviores, quandoque subemarginatæ.

**FRUCTUS** glumis duplo vel triplo longiores, viriduli, elongati, graciles, basi attenuati, sensim in rostrum modice incurvum producti, striato-nervosi, levissimi, apice sæpius bifidi, laciniis subscariosis, fragilibus. *Semen* fuscum, ovato-trigonum. (D. s.)

Rarissima. Hab. in udis Alpium *valesiacarum*. SCHEUCHZ.

Inter *Gsteig* et *Sanen* ad rupium pedem inventam misit

SCHLEICHERUS. *Au Frachy* supra *Bex*. L. THOMAS. —

Perennis. Fl. absque dubio Julio et Augusto.

*Obs.* Priori proxima; foliis fructibusque recedit.

58. *CAREX frigida* All. — C. vaginis subdimidiatis spicis numerosis: supremis subsessilibus, fructibus, angulis scabris gluma duplo longioribus. N. (Gall. *Caret des frimas.*)

*Carex* Hall. *helv.* 1391. *App.* 2. ad Scheuchz. *Gram.* p. 43. n.º 16. C. *frigida* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 260. *Etr. de Fl.* 166.

~~~~~

C. *frigida* All. *pedem.* 2334. Willd. *Sp. pl.* 4. p. 275. Pers. *syn.* 2. p. 544. Decand. *Fl. fr.* 1751. Loisel. *Fl. gall.* 640.

~~~~~

C. *spadicea* Schk. *Car.* n.º 75. tab. L. fig. 47. *Ap. Ejusdem* C. *fuliginosa* *ibid.* n.º 76. tab. Cc. fig. 47. c. *quam etiam* VV. DD. Willdenow et Persoon *huc referunt?* Nunc tamen in suo *Nachtr. Cl. Schkuhr* eam adhuc separat p. 47. n.º 40.

~~~~~

C. *frigida* Schleich. l. c. p. 9. *Seringe* l. c. 2. Dec. 3.

RADIX repens, stolonifera, lutescens, crassa, multiceps.

FOLIA læte viridia, culmo breviora, ad 2 lineas lata, acuta, carinata, margine scabriuscula.

CULMUS trientalis, pedalis, erectus, triquetrus, fere lævis, a basi medio tenuis foliosus.

SPICÆ 4-6, modo ex fusco et viridi variegatæ, modo atro-fuscae. *Mascula* oblonga, subtrigona, gracilis.

GLUMÆ masculæ lanceolato-triangulares, basi latæ, acutæ, nervo dorsali rubello, usque ad apicem et sæpe in mucronem producto.

SPICÆ *femineæ* 5-5, florentes erectæ, demum

nulantes, crassiusculæ: fructiferae ob fructus modice divergentes subsquarrosæ; apice sæpius masculæ, congestæ, supremæ fere sessiles; ima remota, reliquis longius pedunculata. *Foliolum* ejus erectum, spicanti raro æquans. *Vagina* tertiam s. dimidiam pedunculi partem tegens.


GLUMÆ masculis similes, sed breviores, nervo dorsali sæpe evanido.

FRUCTUS elongati, glumis duplo longiores, sensim ad apicem usque attenuati, subtrigoni, apice membranaceo, duro nec scarioso, bifido, spadicei vel atro-purpurei, angulis virentibus, scabris. (D. v.)

Hab. in Alpium editiorum pascuis. In M. *Seron au pied de la Cape au Moine*; in M. *Fouly, Javernaz, Bovonnaz, la Varaz*, etc. In *Grimsula*. *SERICEÆ*. — Perennis. Fl. Julio et Augusto.

59. *CAREX sylvatica*. Huds. — C. vaginis abbreviatis, pedunculis elongatis pendulis, spicis filiformibus laxiusculis, fructibus rostratis apice bifidis. N. (Gall. *Câret des forets*.)

Carex Hall. helv. 1395. *Scheuchz. Gram.* 418. C. *sylvatica Sut. Fl. helv.* 2. p. 256. C. *patula Etr. de Fl.* p. 183.



C. *sylvatica Good. Car. n.º* 31. *Smith brit.* 983. *Pers. syn.* 2. p. 544. *Hoffm. l. c.* p. 256.

C. *patula Lam. Enc. méth.* 3. p. 390. *Decand. Fl. fr.* 1760. C. *drymeja Willd. Sp. pl.* 4. p. 295. *L. suppl.* 414. *Loisel. Fl. gall.* 643.

C. *vesicaria B. Sp. pl.* 1389.



C. sylvatica Schk. *Car.* n.º 93. tab. *Ll.* fig. 101.

Host Gram. austr. 1. tab. 84. *Fl. dan.* tab. 404.

C. capillaris Leers *herb.* p. 205. tab. 15. fig. 2.



C. drymeja Schleich. *l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX transversa, nigra, ramosa, fibris duris horizontalibus instructa.

FOLIA læte viridia, carinata, nervosa, culmo breviora, 1 - 3 lineas lata, marginibus nervisque scabra.

CULMUS triqueter, foliosus, gracilis, læviusculus, adultus pedalis et cubitalis.

SPICA mascula terminalis, fere uncialis, erecta, gracilis, subtrigona, acuta.

GLUMÆ scariosæ, albidae vel dilute ferrugineæ, angustæ, elongatæ, acutæ, nervo dorsali viridi, exasperato, in mucronem sæpe producto.

SPICÆ *femineæ* mascula multo longiores, remotæ, filiformes, graciles, *pedunculis* elongatis, subtrigonis, capillaribus, floriferis erectis, deinde pendulis, exasperatis insidentes. *Folia* floralia, lata longaque, apicem suæ spicæ plerumque superantia; *raginæ* breves, quartam vel rarius tertiam pedunculi partem tegentes.

GLUMÆ laxè imbricatæ, subdistantes, ex flavo ferrugineæ, vel albidae, lanceolatæ, carinatæ, nervo viridi in mucronem vel aristam brevem exeunte.

FRUCTUS distantes, subtrigoni, regulares, subinflati, longe rostrati, lævissimi, apice bifido. (D. v.)

In sylvis, vulgo. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

Obs. Caricem Hall. helv. 1402. SCHEUCHZ. 454 et *emarcidam* Sut. Fl. helv. 2. p. 265, ad varietates *C. sylvaticæ*, quæ rarius masculis spicis geminis vel ternis gaudet, referendam esse putamus. Planta Schenebzeriana spicas masculas subinde etiam una plures, vel saltem fœminæam supremam apice masculam subsessilem profert. Gimma maturæ marcescentes habitum peculiarem spicis dant. Fl. medio et fine Augusti, supra villam *Höckler* ad ascensum *M. Uetliaci*. SCHEUCHZER. Ibi autem sollicito quæsitam invenire non potuimus. Nuperis omnino ignota.

60. *CAREX Pseudo-cyperus*. L. — *C. spicis cylindricis*, pedunculis pendulis, vaginis floralibus subnullis, glumis aristatis, fructibus rostratis divergentibus. N. (*Gall. Carex cypériforme.*)

Carex Hall. helv. 1397. Scheuchz. Gram. 440.

~~~~~

*C. Pseudo-cyperus* L. *Sp. pl.* 1387. *Smith brit.* 986. *Good. Car.* n.º 35. *Hoffm. l. c.* p. 237. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 295. *Pers. syn.* 2. p. 545. *Loisel. Fl. gall.* 644. *Decand. Fl. fr.* 1761. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 393.

~~~~~

C. Pseudo-cyperus Schk. *Car.* n.º 95. tab. *Mm.* fig. 102. *Host Gram. austr.* 1. tab. 85.

~~~~~

*C. Pseudo-cyperus* Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 9. n.º 90. *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c.* 2. *Dec.* 4.

RADICEM evulsu difficillimam, secundum SCHEUCHZERUM repentem, auctoribus SMITH et COODENOUGH fibrosam, integram non vidimus, ceterum tali caractere, optime momento celeb. SCHUHR, in specie tam distincta facile carere possumus.

FOLIA totius generis maxima, 4-8 lineas lata,

culmo longiora, lanceolata, apice triquetra, carinata, dorso sulcis duobus carinæ parallelis insculpta, rugosa, marginibus carinaque scaberrima.

CULMI pedales et cubitales, triquetri, superne ad angulos scabri, erecti.

SPICA mascula terminalis, subinde tamen apice foeminearum superiorum humilior, erecta, dilute ferruginea, foemineis plerumque brevior graciliorque.

SPICÆ foemineæ axillares 3, 4, 5, cylindricæ, multifloræ, virides, pedunculis subinde longiores, 4 lineas ad 2 uncias longæ, plerumque approximatae. Folia floralia, culmum multo superantia, ceteris similia, erecta. Vaginæ brevissimæ, fere nullæ. Pedunculi subtrigoni, asperrimi, per florescentiam quasi umbellati, nunc breves, nunc (præcipue inferiores) longissimi, primum erectiusculi, mox autem sub pondere spicarum omnino arcuato-penduli ut spicæ apices terram spectent.

GLUMÆ omnes virides, subulatæ, superne longe filiformes, scaberrimæ, arcte imbricatæ, nervo dorsali viridi, lato, exasperato, in aristam excurrente.

FRUCTUS valde numerosi, virentes, lanceolato-triquetri, graciles, læves, striati, patuli, vel divaricati, vel etiam retroflexi, rostro apice profunde bifido, laciniis divergentibus. (D. v.)

Rarius in paludibus torfaceis occurrit. Ad lacum *Felinum* et alibi circa *Tigurum*. *Basileæ* inter *Kliben* et *Klein-Hünningen*. Infra *Friedlingen*. Prope *Bex aux marais de Luessel*. Amiciss. *ROGER*. Circa *Seedorf* et *Aneth*. *SERINGE*. In paludibus circa *Fervay*. — Perennis. Fl. Junio et Julio.



61. *CAREX capillaris* L. — *C. spicis foemineis paucifloris masculam superantibus, fructibus distantibus utrinque acuminatis.* N. (Gall. *Caret capillaire.*)

*Carex Hall. helv. 1394. Ej. app. ad Scheuchz. Gram. p. 43. n.º 17. C. capillaris Sut. Fl. helv. 2. p. 255. Etr. de Fl. 149.*

~~~~~  
C. capillaris L. *Sp. pl. 1386. Smith brit. 985. Good. Car. n.º 29. Vill. delph. 2. p. 213. Hoffm. l. c. 229. Decand. Fl. fr. 1753. Willd. Sp. pl. 4. p. 390. Pers. syn. 2. p. 545. Loisel. Fl. gall. 641.*

~~~~~  
*C. capillaris Schkuhr Car. n.º 82. tab. O. fig. 56. Fl. dan. tab. 168. Host Gram. austr. 1. tab. 62:*

~~~~~  
C. capillaris Schleich. l. c. p. 9. Seringe l. c. Dec: 4. Thom. l. c. p. 13.

RADIX fibrosa.

FOLIA culmum florentem æquantia vel superantia, demum breviora, lineam unam lata, plana, acutissima, margine scabriuscula.

CULMI 9 lineas ad 5 uncias longi, plerumque bi-triunciales, nonnisi apice et basi foliosi, teretiusculi, lævissimi.

SPICA mascula subterminalis, vix ultra 2 lineas longa, linearis, gracilis, pauciflora, erecta, variegata.

GLUMÆ subdistichæ, obovatæ, obtusæ, dilute ferrugineæ vel rubellæ, margine albo latoque ampliatæ, nervo dorsali viridi, sæpe duplici, superne confluyente, evanido.

SPICÆ *foemineæ* masculam superantes, plerumque 2-5, rarius unica vel 4, mascula fere duplo longiores crassioresque, ejusdem fere coloris ac formæ, fere 12-floræ. *Foliolum* florale infimum viride, cito marcescens, foliis reliquis simile, sed multo brevius, erectum. *Vagina* tertiam quartamve pedunculi partem tegens. *Pedunculi* capillacei, plerumque approximati, rarius distantes, florentes quasi umbellati, nutantes vel incurvi, rarius erectiusculi.

GLUMÆ laxæ, masculis similes sed breviores, obtusissimæ, apice crenulatæ.

FRUCTUS distantes, nitidi, læves, parvi, ovato-oblongi, versus basin acuminati, superne in rostrum longiusculum, apice vaginanti, albido, truncato, desinentes. *Semen* « capsulam exacte implens. » VILLARS. (D. v.)

Grænen elegantissimum in alpihus editissimis passim occurrit.

In M. Enzeindaz inter ruinas montium Diablerets, la Varaz, Oberstafel, Bernardo; in M. Gallen supra Zermatten. In M. Frohnalpe. Sur les cols du Bonhomme et de la Seigne, etc. Fl. Junio, Julio et Augusto.

II. Spicæ masculæ una plures.

62. *CAREX hirta* L. — C. vaginis æquantibus, spicis foemineis erectis remotis, foliis vaginis glumis fructibusque hirsutis. N. (Gall. *Caret velu.*)

Carex Hall. *helv.* 1403. Scheuchz. *Gram.* 478. C. *hirta* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 262. *Etr. de Fl.* 185.

~~~~~

C. *hirta* L. *Sp. pl.* 1389. *Smith brit.* 1007. *Good. Car.* n.º 47. *Hoffm. l. c.* p. 243. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 311. *Decand. Fl. fr.* 1741. *Will. delph.* 2.

p. 220. *Pers. syn.* 2. p. 547. *Loisel. Fl. gall.* 650.  
*Lam. Enc. méth.* 3. p. 396.



*C. hirta* *Schkuhr Car.* n.º 105. tab. *Uu.* fig. 108.  
*Host Gram. austr.* 1. tab. 96. *Leers herb.* 208.  
 tab. 16. fig. 5. *V. etiam Fl. dan.* tab. 379. *spicam*  
*seorsim delineatam.*



*C. hirta* *Ehrh. Gram. exs. Dec.* 10. n.º 100. *Schleich.*  
*l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 9. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 4.  
 β. *Glabra*, fructibus tamen *hirtis*.

*C. hirtæformis* *Pers. syn. l. c. Vide etiam Good:*  
*Smith. Willd. etc. l. c.*  
*Schkuhr l. c.* tab. *Uu.* fig. 108. β.  
*Schleich. l. c. Seringe l. c.*

**RADIX** valde repens, longissima, articulata, dura,  
 lutescens.

**FOLIA** carinata, culinum florentem fere æquantia,  
 lineam 1-5 lineas lata, facie pubescentia, dorso pilis  
 albis, brevibus, numerosis conspersa, margine cari-  
 naque scabriuscula. *Vaginæ* crebrius etiam pilosæ.

**CULMUS** triquetrus, lævis, inter spicas scaber,  
 foliosus, semipedalis, pedalis.

**SPICÆ masculæ** 2-5ve: suprema terminalis, ellip-  
 tica, acutiuscula, fere seminuclialis; ceteræ priori  
 approximatae, fere sessiles, acutiores minoresque.

**GLUMÆ** latæ, ovatæ, obtusæ, concavæ, ferru-  
 gineæ, margine scariosæ, superne hirsutæ, nervo  
 dorsali viridi, valido, in mucronem producto.

**SPICÆ foemineæ** 2-5ve, erectæ, valde remotæ,  
 ovatæ vel cylindricæ, mascula crassiores, axillares

et quasi sessiles : *pedunculi* nempe breves et *vaginis* foliorum floralium longissimorum erectorumque fere toti tecti.

GLUMÆ oblongæ , viridulæ , margine scariosæ , in aristam longam , subulatam productæ.

FRUCTUS laxiusculi , hirti , conici , nervosi , rostro brevi , bifido. (D. v.)

Planta β priori simillima glabra est : vaginæ tamen ad orificium pilos nonnullos habent ; fructibus hirsutis perinde ac vulgaris gaudet. (D. v.)

Vulgatissima locis udis. β. *Neviduni*, *Neocomi*. Cl. CHAILLET.

— Perennis. Fl. Majo , Junio et Julio.

63. *CAREX glauca* Scop. — C. glumis obtusis , spicis foemineis nutantibus , fructibus obtusissimis muticis , culmo teretiusculo , foliis glaucis. N. (Gall. *Caret glauque*.)

*Carex Hall. helv.* 1408. *Scheuchz. Gram.* 467. C. *glauca Sut. Fl. helv.* 2. p. 263. *Etr. de Fl.* p. 198.

~~~~~

C. *glauca Scop. carn.* 1157. *Loisel. Fl. gall.* 149. *Decand. Fl. fr.* 1743. *Schkuhr Nachtr.* p. 80. *Pers. syn.* 2. p. 545.

~~~~~

C. *recurva Good. Car. n.º* 32. *Smith brit.* 999. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 198.

C. *flacca Hoffm. l. c.* p. 238.

C. *verna Lam. Enc. méth.* 3. p. 395.

β. Spicis foemineis erectiusculis.

C. *nigro-lutea Etr. de Fl.* 196.

C. *glauca β Sut. Fl. helv.* 2. p. 264. *Hall. helv.* 1407. *Scheuchz. Gram.* 462.

*C. acuta* *Sut. Fl. helv.* 2. p. 261.

β<sub>1</sub>. Minor, spica mascula sæpe unica.

*Carex* *Hall. helv.* 1406. *Scheuchz. Gram.* 460.

β<sub>2</sub>. Major, spicis foemineis subsessilibus.

~~~~~

α et β. *C. flacca* *Schkuhr Car. n.º* 98. tab. *O. P.*
fig. 57. a-b. *Host Gram. austr.* 1. tab. 90.

C. limosa β. *Leers herb.* 15. fig. 3.

~~~~~

*C. recurva* *Schleich. l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

**RADIX** repens, gracilis, valde dura.

**FOLIA** carinata, cespitosa, margine scabriuscula, 1-2 lineas lata, 5 uncias et pedem integrum longa, erecta, glaucescentia.

**CULMUS** teretiusculus vel obtuse trigonus, plerumque ad angulos infra spicas scabriusculus, ceterum lævis, rarissime exasperatus, inferne foliosus, in var. β<sub>1</sub> humilis, in reliquis adultus pedalis vel sesquipedalis.

**SPICÆ masculæ** plerumque 2, rarius plures, in β<sub>1</sub> sæpe unica, paulum ventricosæ, subteretes, acutiusculæ, atro-fuscae, per florescentiam ob antheras ex nigro et luteo variegatæ, 6-2 lineas longæ.

**GLUMÆ** fuscae, muticae, plerumque obtusissimæ, margine scariosæ, nervo dorsali luteo infra apicem evanido.

**SPICÆ foemineæ** 2-5, distantes, rarissime sessiles, plerumque pedunculatæ, juniores erectæ, maturæ fere semper nutantes vel pendulæ, longitudine fere masculæ, teretes, superiores apice sæpe masculæ. *Pedunculi* subinde brevissimi, plerumque 1, 2 et

5 uncias longi, teretiusculi, scabriusculi, rarius læves. *Folia* floralia longa, *vaginis* subnullis vel brevissimis, antice liguliformibus, scariosis, fuscis vel albidis, obtusis.

GLUMÆ masculis dilutius fuscæ minusque obtusæ, nervo nunquam in mucronem producto.

FRUCTUS ovati vel obovati, laxiusculi, omnino mutici, ore truncato, integerrimo, viriduli vel lividi, sæpius ad angulos scabriusculi, quandoque etiam undique exasperati. (D. v.)

Planta summopere variabilis, vulgatissima hab. locis humidiusculis, etiam in Alpibus; β<sub>2</sub> ad lacum littora, secus vias, etc.; ββ, in arvis, rarius. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

Obs. Spicæ pedunculatæ maturæ semper nutant. — A C. limosa, quacum confundi potest, toto habitu, spicis elongatis, cylindricis, glumisque masculis obtusioribus, semper muticis, præcipue differt.

64. *CAREX paludosa* Good. — C. spicis masculis subventricosis, fœmineis erectis subsessilibus gracilibus, glumis mucronatis, fructibus emarginatis. N. (Call. *Caret des marécages*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1404? 1398 et 1399. Scheuchz. *Gram.* 464. 465, etc. C. palustris et C. intermedia Sut. *Fl. helv.* 2. p. 261 et 262. C. rufa Etr. de *Fl.* 193.



C. paludosa Good *Cur. n.º* 43. *Smith brit.* 1002. *Hoffm. l. c.* p. 239. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 305. *Decand. Fl. fr.* 1765. *Pers. syn.* 2. p. 546. *Loisel. Fl. gall.* 645.

C. rufa Lam. *Enc. méth.* 3. p. 394.



~~~~~  
C. paludosa Schkuhr *Var.* n.º 101. tab. *Oo et Vv.*
 fig. 103. *Host Gram. austr.* 1. tab. 93.

~~~~~  
*C. acutiformis* Ehrh. *Gram. exs.* Dec. 3. n. 30. *C.*  
*paludosa* Schleich. *l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.

RADIX eximie repens.

FOLIA glaucescētia, longissima, plana, 1-4 lineas lata, acute carinata, margine carinaque scabra vel secantia,

CULMUS acute triqueter, durus, strictus, crassus, ad angulos plerumque scaberrimus, inferne foliosus, pedalis v. cubitalis.

SPICÆ masculæ 5-4 inæquales, atro-fuscæ, demum saturate ferrugineæ, subventricosæ, florentes fœminicis crassiores.

GLUMÆ ovatæ, plus minusve obtusæ, acutissime imbricatæ, margine et apice rufæ vel saturate ferrugineæ, nervo dorsali albido, evanescente. *Antheræ* mucronulatæ.

SPICÆ fœminæ axillares, graciles, longæ (bi- et triunciales), erectæ, cylindricæ, fructiferæ obtusiusculæ: superiores apice plerumque masculæ ideoque acutæ. *Pedunculi* subnulli vel breves: infimus tamen fere semper conspicuus, semuncialis et longior. FOLIA floralia longa, erecta, amplexicaulia, vaginis nullis.

GLUMÆ oblongæ, lanceolatæ, acutæ, fuscæ, nervo dorsali exasperato, usque ad apicem et plerumque in mucronulum protenso. *Stigmata* tria.

FRUCTUS subfusci vel lividi, læves, ovati, haud

appressi, breviter mucronati, apice modice emarginati. (D. v.)

Omniū fere vulgatissima, in vicinia fluviorum, rivulorumque et locis paludosis densissimōs cespites efficit. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

*Oss.* Habitus fere omnino *C. acutæ*, apud nos adeo rari, ut sæpe curiose quæsitam nunquam invenire potuerim. Facile tamen ab ea distinguitur herba glaucescente, spicis florentibus erectis, nec nutantibus et præcipue pistillis trygynis. Cum *stricta* neq̃ florens nec matura confundi potest.

65. *CAREX riparia* Curt. — *C.* vaginis subnullis, spicis oblongis acutis obesis: infima pedunculata, glumis elongatis aristatis. N. (Gall. *Caret des rives*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1404? *Synonyma scheuchzeriana* nimis obscura omittimus. *C. riparia* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 260? *Etr. de Fl.* 187.

*C. riparia* Good. *Car.* n.º 42. *Smith brit.* 1003. *Hoffm. l. c.* 240. *Decand. Fl. fr.* 1766. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 306. *Loisel. Fl. gall.* 645. *Pers. syn.* 2. p. 546.

*C. riparia* Schk. n.º 102. tab. *Qq et Rr.* fig. 105. *C. crassa* Host *Gram. austr.* 1. tab. 93.

*C. crassa* Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 6. n.º 59. *C. riparia* Schleich. *l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Spreng. l. c.* Dec. 4.

RADIX valde repens, evalsa difficillima.

CULMUS exquisite triqueter, superne ad angulos scaber, inferne lævis, crassus, solidus, erectus, foliosus, 5-5 pedes altus.

FOLIA dense cespitosa, longissima, carinata, apice subtriquetra, ceterum plana, rugulosa, facie viridia, dorso glaucescentia, margine carinaque asperima, 5-4 lineas lata.

SPICÆ masculæ 5-5, approximatae, sessiles, rufæ, trigonæ, graciles, longæ, acutæ: terminalis maxima.

GLUMÆ rufæ, unicolores, lanceolatae, longe acuminatae, acutissimæ, nervo dorsali concolori, subinde in mucronem producto.

SPICÆ foemineæ tres vel plures, cylindricæ, acutæ, 2 ad 5 lineas longæ, fructiferæ crassæ: superiores apice masculæ, subsessiles: inferiores pedunculatae, erectæ; infima longius pedunculata, matura plerumque pendula. Folia floralia erecta, longissima, vaginis brevissimis, subnullis.

GLUMÆ ovato-lanceolatae, virides, marginibus albidæ, nervo dorsali in aristam scabram longam protenso.

FRUCTUS glumarum aristis modo breviores, modo longiores, fusci, conici, patentes, subtrigoni, brevissime rostrati, nervosi, leves, subinflati, apice bifidi, laciniis subdivergentibus. (D. v.)

Hab. locis aquaticis, rarius. Aux marais de Gland et prope Duillers in agro Nevidunensi. — Perennis. Fl. Majo.

66. *CAREX ampullacea* Good. — C. spicis foeminis erectis cylindricis, fructibus inflatis subglobosis rostro filiformi bifurco, culmis teretiusculis. N. (Gall. *Caret ampoulé*.)

*Carex* Hall. *helv.* 1401 ?? *C. vesicaria* Sut. *Fl. helv.*

2. p. 267. *Scheuchz. Gram.* 472 et 476. *C. ampul-*

*acea* Etr. de *Fl.* 189.



- C. ampullacea* Good. *Car.* n.º 46. *Smith brit.* 1006.  
*Hoffm. l. c.* 243. *Fl. fr.* 1764. *Pers. syn.* 2. p. 547.  
*Loisel. Fl. gall.* 644. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 308.  
*C. vesicaria* β? *L. Sp. pl.* 1389.



- C. ampullacea* Schk. *Car.* n.º 104. tab. *Tt.* fig. 107.  
*Host Gram. austr.* 1. tab. 99.



- C. obtusangula* Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 5. n.º. 50.  
*C. ampullacea* Schl. *l. c.* p. 9. *Thom. l. c.* p. 13.  
*Seringe l. c.* 2. *Dec.* 4.

RADIX valde repens, evulsu difficillima.

FOLIA culmum florentem fere æquantia, 1-2 lineas lata, superne carinata et quasi canaliculata, inferne concava, margine carinaque scabriuscula, dorso glaucescentia. *Vaginæ* angulosæ.

CULMI plus minusve rotundati, subtrigoni, molli-ter spongiosi, crassiusculi, foliosi, infra spicas omnino læves, superne scabriusculi, pedales vel cubitales.

SPICÆ masculæ 2-3, terminales, approximatae, utrinque acutæ, gracillimæ, pallidæ, cinereæ vel ferrugineæ.

GLUMÆ oblongæ, ellipticæ, acutiusculæ, ferrugineæ, superne scariosæ, nervo dorsali luteolo.

SPICÆ fœminæ 2-3, remotæ, axillares, cylindricæ, semunciales, unciales, florentes gracillimæ, adultæ crassiusculæ. *Pedunculi* superiores quandoque subnulli, semper breves; inferiores longiores, læves. *Folia* floralia longa, inferiora *vaginis* sub-

nullis; *vaginæ* inferiores abbreviatæ, vix semunciales.

GLUMÆ oblongæ, lanceolatæ, acutiæ, quandoque mucronatæ, viridulæ, marginibus ferrugineæ.

FRUCTUS inflati, subglobosi, vesiculares, lævissimi, subito in rostrum filiforme longiusculum attenuati, ex viridi flavescentes, apice bifurcato, laciniiis divergentibus, maturi ad angulum fere rectum patuli. (D. v.)

In paludibus torfaceis montanis non rara. In M. Jura, à la grande Aine, aux Rousses, à Burtigny, circa lacum Felinum, etc. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

67. *CAREX vesicaria* L. — C. spicis fœmineis erectis cylindricis, fructibus oblongis inflatis conicis, culmo triquetro. N. (Gall. *Caret vésiculaire*.)

*Carex Hall. helv.* 1409?? *C. inflata* *Sut. Fl. helv.* 2. p. 265?? *C. vesicaria* *Etr. de Fl.* 191.

~~~~~

C. vesicaria L. *Sp. pl.* 1389 α et γ *auct. Smith. Good.* *Car.* n.º 43. *Smith brit.* 1005. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 305. *Loisel. Fl. gall.* 644. *Decand. Fl. fr.* 1765. *Pers. syn.* 2. p. 547. *Hoffm. l. c.* 239.

~~~~~

*C. vesicaria* *Schkuhr Car.* n.º 103. tab. *Tt. et Ss.* fig. 106. *Host Gram. austr.* 1. tab. 92.

~~~~~

Schleich. l. c. p. 9. *Thom. l. c.* p. 13. *Seringe l. c.* 2. *Dec.* 4.

RADIX repens.

FOLIA erecta, læte viridia, longissima, 1-2 lineas lata, plana, carinata, marginibus scabra.

CULMI pedales et cubitales, acutissime triquetri, infra spicas etiam plus minusve scabri, inferne foliosi, media parte longe nudi, firmi.

SPICÆ *masculæ* 2 vel subinde 3, valde inæquales, acutæ, graciles, cylindricæ, dilute fuscæ.

GLUMÆ ovato-lanceolatæ, acutiusculæ, vel obtusæ, pallide ferrugineæ, superne margine scarioso spectabili auctæ.

SPICÆ *fœmineæ* 2-5, erectæ, (ima nonnunquam pendula excepta) cylindricæ, plerumque fere duplo breviores quam in priori, modo satis longe pedunculatæ, modo *pedunculis* insidentes brevissimis, *vagina* quandoque subnulla, haud raro autem 2-5 lineas longa, tectis. *Folia* floralia prælonga, erecta.

GLUMÆ oblongæ, lanceolatæ, acutæ, viridulæ, marginibus dilute ferrugineæ.

FRUCTUS inflati, vesiculares, oblongi, conici, acuminato-rostrati, lævissimi, apice bifurcato, laciniiis validis divergentibus, erectiusculi, ut angulum acutum cum spicæ rachi efficiant. (D. v.)

Vulgaris in paludibus minus spongiosis v. g. *au Bois-Bougi* prope *Nevidunum*. — Perennis. Fl. Majo et Junio.

Obs. Omnibus rite perensis *Carex* HALLERI 1409 et præcipue *C. inflata* ipsius SUTERI magis cum *C. riparia* convenire videntur. Certe tamen Scheuchz. Gram. 470. quam summus vir ad suam 1409 trahit, *vesicariam* ad veram vesicariam pertinet; ideoque nihil immutandum esse putavi.

***** Species nonnullæ dubiæ insigniores ab HALLERO descriptæ.

† 68. *CAREX hirsuta* Sut. — *C.* spica unica ovata, foliis planis, fructibus rotundis hirsutis. *Hall. helv.* 1552.

Carex Hall. app. ad *Scheuchzeri Gram. C. hirsuta*
Sut. Fl. helv. 2. p. 240. (*Viro ipso amiciss. mon-*
nente, planta ei nova, id est, ignota).

« FOLIA plana, ad lineam lata, molliora, sub-
 glauca, retroversu aspera. CULMUS triuncialis ad
 summum semipedalis, ex triquetro compressus.
 CAPITULUM unicum, ovatum, apice et basi mascu-
 lum, in medio fœmineum. GLUMÆ fuscae, magno
 nervo divisæ. CAPSULÆ rotundæ, totæ hirsutæ, in
 longum rostrum productæ. » HALLER.

« Inter pagum *Münchenstein* et villam *die Grüt* prope
Basileam. LACHENAL et MEG. — *Sur le Bec-de-l'Oiseau*.
 GAGNEBIN. » HALLER.

OBS. Planta nuperis omnibus plane ignota, quamvis, ut
 videtur, a congeneribus distinctissima.

+ 69. *CAREX lobata* Schk. — C. spica unica com-
 posita lobata: spiculis subternis.

Carex Hall. *helv.* 1356?? *Vix hujusloci. Scheuchz.*
Gram. 493. tab. XI. fig. 8.



Schkuhr Car. n.º 20. tab. II. fig. 18.

De planta et nobis, et omnibus botanicis helveticis omnino
 ignota plura synonyma afferre non placet.

« RADIX viticulis reptantibus, haud articulatis,
 brevibus squamis tectis, gustu grato, subinde astrin-
 genti, saporem fere *Cyperiesculenti* referente.

FOLIA fasciculata, culmo longe breviora, 1-2
 lineas lata, margine scabriuscula, plana, obiter
 carinata.

CULMI semipedales, subinde fere pedales, tenues,

triquetri, inferne foliosi, superne ad angulos subscabri.

SPICA terminalis, lobata, tribus (subinde etiam 4 vel 5 : Schk.) *spiculis* alternis, apice distinctissimis, inferne autem fere confluentibus, subsessilibus, androgynis, apice masculis constans. *Spiculæ* laterales, breviores: terminalis ad 4 lineas longa. Omnes ovalæ, crassiusculæ, obtusæ. *Bracteæ* amplæ, ovato-lanceolatæ, nervo valido, superne attenuato, in aristam producto.

GLUMÆ fuscæ aut castaneæ, oblongæ, acutæ, nervo dorsali dilutius fusco.

FRUCTUS viriduli, oblongi, in rostrum attenuati, apice brevissime inciso (scarioso, subinde integro: Schk.). *Stigmata* duo.» SCHEUCHZ.

» In alpibus *Rhæticis*, præcipue in *M. Avicula*.—Perennis.
Fl. Junio. SCHEUCHZ.

+70. *CAREX fusca* All.—C. spicis foemineis ternis erectis petiolatis folio insidentibus, capsulis ovalis breviter mucronatis. *Hall. helv.* 1578.

C. spicis foemineis subternis axillaribus: mascula gracili elongata cylindrica, fructibus ovalis mucronatis.

Carex Hall. app. ad Scheuchz. Gram. 42. n.º 13.

J. J. Scheuchz. itin. alp. VII. p. 458.

Carex fusca All. pedem. 2324. *Sut. Fl. helv.* 2. p. 250.

C. rigida?? *Smith brit.* 997. *auct. Cl.* SMITHIO.

« RADIX longa, crassa, multiceps. CULMUS vaginatus, semipedalis. FOLIA intra lineam lata, culmi

fere longitudine, ora retroversu aspera. SPICA *mascula*, longa, fere nigra, teres, gracilis, GLUMIS lanceolatis, *ima* majori aristata. SPICÆ *fœminæ* duæ et tres: inferior breviter pedunculata, suprema sessilis, folio insidens biunciali, spicam superanti, ut supremum brevius sit. SPICA *fœminea* suprema absque folio est; si tres fuerint, eadem masculam attingit. GLUMÆ ovalæ, breviter mucronatæ, virentes ut spicæ ex viridi et nigro variæ sint. Unica subinde spica fuit fœminea floribus imis remotis. » HALLER.

In M. Enzeindaz. Fouly. *Au-dessus du Val de Lie et de Praborgne* (Zermatt.) HALL. In M. Speluga. J. J. SCHEUCHZER.

Obs. Planta botanicis recentioribus etiam helveticis prorsus ignota vix ac ne vix ad *rigidam* GOODENOVII pertinere potest, quæ rigidis foliis, recurvis, culmo nudo, sæpius rigido, foliis floralibus culmo brevioribus, spica mascula *brevi*, *ovata*, *crassa*, glumis *marginè albido* gaudet. Eam libentius ad var. alpinam nigriorem (Schkuhr Car. n.º 48 α) *C. cespitosæ* referrem, potissimum cum hæc varietas inter plantas discipulorum summi nostri HALLERI a doctissimo ejus filio, ut nos ipse certiores fecit, visa fuerit. De stigmatum numero nihil constat.

† 71. *CAREX foliosa* All. — C. spicis fœmineis sessilibus, ima petiolata, glumis perangustis. *Hall. helv.* 1584.

C. spica mascula cylindrica, fœmineis subsessilibus erectis, foliis floralibus longissimis, fructibus longe rostratis.

Carex spicis sessilibus approximatis teretibus folio insidentibus. *Hall. Nomencl.* 1584.

Scheuchz. Gram. 435. C. uetliaca. *Sut. Fl. helv.* 2. p. 251.

C. foliosa All. *pedem.* 2328.

RADIX fibrosa.

FOLIA radicalia culmum saltem florentem fere æquantia, 2-5-uncialia, sesquilineam ad 5 lineas lata, scabriuscula, carinata, dorso bisulcata.

CULMUS 5-9 uncias longus, lævis, durus, inferne *foliis vaginarum* longitudine insignibus instructus.

SPICA mascula trigono-cylindrica, obtusiuscula, ex fusco pulchre lutescens, aut etiam ex viridi variegata, semuncialis et uncialis, vix unam lineam lata.

GLUMÆ lanceolatae, elongatae, valde angustae, obtusae, olivaceae, margine albidæ.

SPICÆ *foemineæ* 2, 5 et 4, mascula breviores et crassiores, axillares, approximatae. *Folium* florale imum quandoque 5-5 unciale, culmum longe superans, *vagina* subdimidiata; *pedunculus* circiter semuncialis: *spicæ* superiores subsessiles, *foliolis* brevius vaginantibus.

GLUMÆ lanceolatae, masculis breviores, perangustae, dorso ex viridi lutescentes, margine aurantiaco.

FRUCTUS graciles, viriduli, trigoni, in rostrum lineam unam longum attenuati. *Stigmata* 3. — HALL. et SCHEUCHZ.

« In sylvis umbrosis ad radices M. *Uetliaci* rarius. Fl. Majo. »
SCHEUCHZERUS.

OBS. Loco indicato quæsitam invenire non potuimus. *Carex* auct. HALLERO distinctissima notis nonnullis cum *C. sylvatica* convenire videtur.

†72. *CAREX strigosa* All. (non Good.)—C. foliis cespitosis brevibus, spicis foemineis paucifloris, suprema sessili. *Hall. helv.* 1588.

Scheuchz. Gram. 416. n.º 4. *All. pedem.* 2331.

« FOLIA cespitosa, caryophyllea, sesquilineam lata, brevia, firma, retrorsum scabra. CULMUS debilis, curvulus, foliis sæpe brevior, 4 fere uncias longus. SPICA mascula grandiuscula, ovata, obtusa. GLUMÆ ovatae, obtusae, fuscae, margine albæ. *Eractea* glumis multo major. SPICÆ foemineæ mascula multo graciliores, paucifloræ, vulgo ternæ: suprema nuda, sessilis, minima, masculæ approximata. Inferiores *pedunculo* lineas paucas longo, ex axilla folioli spicam superantis, nascenti insidentes. CAPSULÆ rostro bifido longo insignes. »
HALLER.

« In M. Enzeindaz, Oberstafel, Isenau et Montendre. »
HALLER.

Obs. SCHEUCHZERUS suam pro mera varietate *C. sempervirentis* habebat. *Carex* HALLERI vix ad *C. firmam* (quæ eadem est ac *C. strigosa* Snt.) referri potest. SCHEUCHZERUS tribuit suæ folia, tum reliquas etiam partes, tenuiora tenerioraque quam *sempervirenti*, quod contrarium esset veritati si *firmam* in mente habuisset. Potissimum eam cum Viro oculatissimo ad varietates *sempervirentis* referre vellem, nisi forsitan sit species propria, nobis nuperisque ceteris ignota. Sagaciores videant.



ORDO III. TYPHACEÆ.

G. 43. TYPHA. L.

MASC. *Amentum* cylindricum. *Cal.* obsoletus, triphyllus. *Cor.* nulla. *Stam.* 5. FÆM. *Amentum* densissimum infra masculum. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla. *Semen* pedicellatum, pedicelli basi pilis longis papposis cincta.

Analysis.

Amenta contigua. — 1.

Amenta mascula femineaque remota. — 2.

1. TYPHA *latifolia*. Sp. 1.

2. Amentum fœmineum 4 — 5 uncias longum, cylindricum; Folia convexo-planiuscula. — 3.

Amentum fœmininum florens gracillimum, deinde subrotundum vel ellipticum, vix unciale. Folia canaliculato-setacea. — 4.

3. TYPHA *angustifolia*. Sp. 2.4. TYPHA *minima*. Sp. 3.

1. TYPHA *latifolia* L. — T. foliis subensiformibus, amento masculino fœmineoque contiguo. L. (Gall. *Massette à feuilles larges*.)

Typha Hall. *helv.* 1303. T. *latifolia* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 237.

T. *latifolia* L. Sp. pl. 1337. Smith *brit.* 959. Willd. Sp. pl. 4. p. 197. Desrousseaux *Enc. méth.* 3. p. 722. Pers. *syn.* 2. p. 532. Decand. *Fl. fr.* 1805. Loisel. *Fl. gall.* 625.

T. latifolia *Fl. dan.* tab. 645. *Moris. hist.* 3. p. 246.
tab. 13 fig. 1. *Fuchs.* 823.



Schleich. l. c. 26.

RADIX repens, crassa, lutescens, nodosa, fibris subverticillatis.

CULMI stricti, læves, glaberrimi, rigidi, obscure articulati, teretes, medulla spongiosa farcti, basi foliosi, 4-6-pedales.

FOLIA alterna, fere ensiformia, dorso subconvexa, facie plana, crassiuscula, subtiliter striata, lævia, 6-9 uncias lata, vaginantia. *Vaginæ* longæ, marginibus scariosæ.

AMENTUM quasi unicum, superne masculum; inferne foemineum, plerumque omnino continuum quandoque subinterruptum ut inter masculum et foemineum culmus paulisper compareat. *Masculum* terminale, 4-6-unciale, gracile, acutum, caducum; foemineum undique culmum cingens, densissimum, quasi pannosum, obtusum, saturate viride, demum ex badio nigrescens, 6-10 uncias longum, unciam unam fere crassum, persistens. *Spathæ* duæ caducæ, tenuissimæ, albidæ, monophyllæ: inferior utrique amento communis: superior masculo propria basi ejus adnascitur.

CALYX florum masculorum, foliolis tribus, vix distinctis, obsoletis, capillaceis.

STAMINA 5. *Filamentum* unicum, superne fissum in setulas tres capillaceas *antheras* gerentes quæ undique amentum tegunt.

FLORES foeminei densissimi, filamentis nume-

rosissimis constantes inter quæ *germina* latitant.

STYLUS subulatus, persistens. *Stigma* simplex.

SEMEN ovatum, acutum, longe pedicellatum :
pedicello filamentis longissimis undique cincto.
(D. v.)

Ex variis amentorum punctis nonnunquam *spathæ* partiales oriuntur.

Inter arundines, locis aquaticis haud raro provenit.—Perennis.
Fl. Junio et Julio.

2. *TYPHA angustifolia* L. — T. foliis lineari-lanceolatis dorso convexiusculis, amentis remotis.
N. (Gall. *Massette à feuilles étroites.*)

Typha Hall. helv. 1306 α? *T. angustifolia Sut. Fl. helv.* 2. p. 237?

~~~~~  
*T. angustifolia* L. *Sp. pl.* 1377. *Smith brit.* 959.  
*Willd. Sp. pl.* 4. p. 198. *Desrousseaux Enc. méth.*  
3. p. 733. *Pers. syn.* 2. p. 533. *Decand. Fl. fr.*  
1806. *Loisel. Fl. gall.* 626. *Vill. delph.* 2. p. 192.

~~~~~  
T. angustifolia Fl. dan. tab. 815. *Moris. hist.* t. 13
fig. 2.

~~~~~  
*Schleich. l. c.* p. 26. *Thom. l. c.* p. 14.

Priori utique similis FOLIIS triplo vel quadruplo angustioribus, dorso magis convexis, acutioribus, AMENTIS paulo gracilioribus, remotis, staturaque minori differt. (D. v.)

Priori multo rarius apud nos nonnisi in *Valesia* et circa *Bex au marais de Luizel* reperitur. In magnis paludibus *Rhodani* inter *Econaz* et *Ridde*. Circa *Prazfalcon*. Fl. Junio et Julio.

*Obs.* Amenta habet elongata, cylindrica, nec minus longa quam *latifolia*. Au eam in mente magnus HALLERUS habuerit ex descriptione citata valde incertum nobis videtur. Vix enim dubito quin potius ad sequentem pertineat.

5. *TYPHA minima* Moris. — T. culmo nudo basi vaginato, foliis linearibus canaliculatis, amentis remotis: foemineo abbreviato incrassato. N. (Gall. *Massette mineure*.)

*Typha Hall. helv.* 1306 certo quoad var. β. Credo utique var. ejus α etiam huc pertinere. T. angustifolia β. *Sut. Fl. helv.* 2. p. 237.



T. minima radice repente, culmo tereti vaginato, foliis canaliculatis, spica mascula foemineaque remotis bracteatis. *Hoffm. germ. ad annum* 1804. tom. 2. p. 251. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 198. *Decand. Fl. fr.* 1807. *Pers. syn.* 2. p. 533. *Loisel. Fl. gall.* 625.

T. minor. *Smith brit.* 960. *Loisel. Fl. gall.* 625. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 197.

T. media *Decand. syn.* 1806.\* *Pers. syn.* 2. p. 532.

T. angustifolia β. *Sp. pl.* 1378. *Desrousseaux Enc. méth.* 3. p. 723.



T. palustris minima duplici clava Moris. *hist.* 3. tab. 13. fig. 3.



T. minima *Seringe l. c.* 10. T. minor *Schleich. l. c.* p. 26. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX «repens.» HOFFMANN. Nobis etiam repere visa est.

CULMI teretes, erectiusculi, multo quam priorum

graciliores, longe nudi, basi *vaginis* nonnullis latis, amplis, teneris, ore scariosis, aphyllis, apice truncatis vel emarginatis, usque ad basin fissis, carina in aristam crassam plus minusve brevem, obtusiusculam protensa tecti, pedales vel sesquipedales, demum cubitales et tripedales.

FOLIA omnia radicalia, culmum adultum fere æquantia, setacea, linea dimidia vix latiora, lævia, dorso convexa, facie (præcipue in planta a radice separata nec omnino recenti) insigniter canaliculata. Exteriora reliquis breviora, *vaginis* fasciculos complanatos foventibus, culmeis fere similibus.

AMENTUM *masculum*, gracile, acutiusculum, unciale vel sescunciale. *Spatha* propria elongata. *Fœmineum* fere brevius, distans, ejusdem coloris substantiæque ac priorum, florens lineare, demum clavatum, ellipticum, vel subrotundum, rarius vere cylindricum. (D. v.)

In paludibus variis. *Genevæ* copiose sous Gaillard in paludosis insulis. Illustriss. DE SAUSSURE. In confluenta *Arvæ* et *Rhodani*. RAI et LOBELIUS. Nobiscum ibidem lectam benignissime communicavit mulier egregia PRIOR. — Prope *Bouveret* ad influxum *Rhodani* in lacum *Lemanum*. CAGNEBIN. Circa *Bodenacker* ad *Arolam*? HALLER. Circa *Prazsalcon*. Reverendiss. MURTH. Inter *Sideram* et *St Léonard*. THOMAS. — Perennis. Fl. certe Aprili et Maio ut jam observavit Cel. HOFFMANN nec ut vult SMITHIUS Julio.

Obs. Quia *T. minor* summi SMITHII ad nostram referenda sit nullus dubito, cum plantam suam ipso testante ex agro genevensi ubi nostra *minima* frequens reperitur, habuerit. De-cryptio tamen quoad folia minime convenit; nam sue folia latiuscula, ensiformia, plana, vix longitudine dimidii culmi

tribuit. Specimina sine dubio manca, nec folia fasciculorum vidit, ut vaginas solutas, latas acuminatasque culmorum pro veris foliis habuerit, quod, nisi cautius observentur, facile fieri potest. — Certum igitur videtur unam eandemque speciem Viros doctissimos nominibus *T. minoris*, *medicæ* et *minimæ* descripsisse; nam planta genevensis a valesiacis illis neutiquam recedit nec cum descriptionibus quas auctoritate SMITHII freti WILDENOVIVS, CANDOLLIUS, PERSOON et LOISELEUR de sua *media minorive* dederunt convenire videtur.

G. 44. SPARGANIUM. L.

*Amenta* globosa, monoica. MASC. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla. FOEM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla. *Drupa* exsucca, monosperma.

*Analysis.*

- |                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culmus erectus; folia erectiuscula, opaca. Stigma lineare. — 1. | Culmi cum foliis flaccidis, semipellucidis, reticulatis, natantes. Stigma ovatum, brevissimum. — 4. |
| 1. Pedunculus amentorum communis ramosus. — 2.                  | Pedunculus amentorum communis simplex. — 5.                                                         |
| 2. SPARGANIUM <i>ramosum</i> . Sp. 1.                           |                                                                                                     |
| 5. SPARGANIUM <i>simplex</i> . Sp. 2.                           |                                                                                                     |
| 4. SPARGANIUM <i>natans</i> . Sp. 3.                            |                                                                                                     |

1. *SPARGANIUM ramosum* Huds. — Sp. foliis (opacis) basi triquetris lateribus concavis, pedunculo communi ramoso, stigmate lineari, Smith. (*Call. Rubanier rameux*.)

*Sparganium* Hall. *helv.* 1304 æ. Sp. *ramosum* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 238.

~~~~~

Sp. ramosum *Smith brit.* 961. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 199. *Pers. syn.* 2. p. 533. *Loisel. Fl. gall.* 625. *Decand. Fl. fr.* 1808.

Sp. erectum α *L. Sp. pl.* 1378. *Poir. Enc. méth.* 6. p. 323.



Sp. ramosum *Lam. illustr. gen. tab.* 748. *Engl. bot. tab.* 744. *Schkuhr Handb.* 3. p. 223. *cum fig.*



Sp. ramosum *Schleich. l. c.* p. 25. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* p. 9.

RADIX «repens.» SMITH, fibris nigrescentibus, teneris.

FOLIA *radicalia* erecta, numerosa, vaginantia, culnum æquantia, 3-5. lineas lata, ensiformia, basi triquetra, facie plana, lateribus dorsalibus subconcavis; *culmea* superiora plana, reliquis multo minora. Omnia glaberrima, lævia, opaca, nervis transversis vix conspicuis.

CULMUS ex tereti angulosus, foliosus, vaginis foliorum inferne tectus, erectus, 1-5-pedalis.

RACEMUS ramoso-compositus, ramis 2-5ve ad amenta inferiora flexuoso-infractis, basi foliolo viridi longiusculo stipatis, ceterum nudis.

AMENTA *mascula* numerosa, distantia, sessilia partem superiorem ramorum obtinent.

FOLIOLA *calycina* fugacia; plerumque desunt, ut ea nunquam observare potuerimus.

AMENTA *feminea* pauciora, remotiora; inferiora longius pedunculata, matura undique squarrosa.

CALYCES foliolis 5 oblongis, scariosis, apice dilatatis, erectis.

STYLI elongati, lineares, *stigmatē simplici*.

DRUPÆ virides, longe rostratæ. (D. v.)

Ad stagna et aquas tranquillas, ubique. — Perennis. Fl. Junio et Julio.


2. *SPARGANIUM simplex* Huds. — Sp. foliis (opacis) basi triquetris lateribus planis, pedunculo communi simplici, *stigmatē lineari*. Smith. (Gall. *Rubanier à épi simple*.)

Sparganium Hall. *helv.* 1504 β. Sp. *simplex* Sut. *Fl. helv.* 2. p. 238.



Sp. *simplex* Smith *brit.* 962. Willd. *Sp. pl.* 4. p. 199. Pers. *syn.* 2. p. 533. Loisel. *Fl. gall.* 626. Decand. *Fl. fr.* 1809.

Sp. *erectum* β. L. *Sp. pl.* 1378. Poir. *Enc. méth.* 6. p. 323.



Sp. *simplex*. Schleich. *l. c.* p. 25. Thom. *l. c.* p. 14. Seringe *l. c.* p. 9.

Omnino affinis priori a qua STATURA fere duplo minori, FOLIIS minus opacis, planioribus, lateribus, ut Angli perhibent, planis nec concavis et præcipue racemo simplici, ceterum fere ut in *ramoso* disposito, AMENTIS foemineis 2-5, axillaribus, longius quam in priori pedunculatis.

FOLIOLA calycina « viridia nec fuscescentia » SMITH, certo minus fugacia. (D. s.)

Hab. in paludibus minus frequens. Circa *Aneth*; *Neviduni*; *ad Gürham*; *aux Grangettes* prope *Pennilucum*, etc.
— Perennis. Fl. Junio et Julio.

5. *SPARGANIUM natans*. L. — Sp. foliis decumbentibus planis subpellucidis reticulatis, stigmate brevissimo ovato, amento masculino unico. N. (Gall. *Rubanier flottant*.)

Sparganium Hall. helv. 1305. *Sp. natans Sut. Fl. helv.* 2. p. 238.

~~~~~  
*Sp. natans L. Sp. pl.* 1378. *Willd. Sp. pl.* 4. p. 200.  
*Smith brit.* 962. *Decand. Fl. fr.* 1810. *Loisel. Fl. gall.* 626. *Pers. syn.* 2. p. 533.

~~~~~  
Sp. natans Fl. dan. tab. 260. (*Auct. Cl. SMITH.*)

~~~~~  
*Schleich. l. c.* p. 25. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* p. 9.

♀. Var. minima.

*Thom. l. c.* p. 9.

RADIX repens, longa, crassa, fibris verticalibus, fuscis vel luteis, longissimis.

FOLIA dorso convexa, facie plana, subinde utrinque convexa, tenera, subpellucida, nervulis transversis longitudinales ad angulos rectos secantibus reticulata, culmo paulo breviora, ad 3 lineas lata, obtusissima, prostrata vel fluitantia, nervo carinali prorsus nullo (qua nota ea species insigniter etiam a prioribus differt), *vaginis* brevibus, membranula scariosa clausis.

RACEMUS terminalis simplex, paucis amentis constans.

AMENTUM *masculum* terminale, plerumque unicum, post florescentiam ob receptaculi exiguitatem evanidum.


CALYX obsoletus, foliolis 5 ægre distinguendis, albidis, minimis et valde caducis, ut amentum plerumque polyandrum nec triandrum esse videatur. *Stamina* longa, albida, delicata.

AMENTA *foeminea* 2, rarius 5-4, distantia, axillaria; inum pedunculatum, cetera sessilia et quasi amplexicaulia.

CALYX foliolis ex albo virentibus. *Stigma* « brevissimum, ovatum, peltatum, simplex. » SMITH.

DRUPA ovato-lanceolata, breviter mucronata. (D. v.)

Prioribus longe rarius. *Au Landeron. Circa Lachen in lacu Tigurino. Dans le marais du Bois-Bougi, prope Nevidunum. — Au lac de Céri et Penniluci. Reverendiss. MURITH. — β. Aux marais de Colonge infra M. Saleram, L. THOMAS. — Perennis. Fl. Junio et Julio.*



## ORDO IV. JUNCÆ.

## G. 45. ACORUS. L.

*Amentum* hermaphroditum, cylindricum, tessellatum; *perigonium* glumaceum, 6-phyl-lum. *Stamina* 6. *Capsula* 5-locularis, 5-sperma?

1. *ACORUS Calamus* L. — Ac. scapi mucrone longissimo foliaceo. SMITH. (*Gall. Acorus odorant.*)

*Acorus* Hall. *helv.* 1507. Ac. *Calamus.* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 206.

~~~~~  
Ac. *Calamus* L. *Sp. pl.* 462. *Pers. syn.* 1. p. 383. *Decand. Fl. fr.* 1820. *Smith brit.* 373. *Loisel. Fl. gall.* 207. *Lam. Enc. méth.* 1. p. 34. *Vill. delph.* 2. p. 226.

~~~~~  
Ac. *Calamus* Leers *herb. tab.* 13. fig. 2. *Fl. dan. tab.* 1158.

~~~~~  
Schleich. l. c. p. 5. *Etiam apud Cl. Seringe* *prostat,*

RADIX horizontalis, repens, nodosa, punctata, multis fibris stipata, intus alba, grate aromatica.

FOLIA longissima, 5 ad 4 pedes alta, 4-5 lineas lata, ensiformia, basi lateraliter vaginantia, medio crassa, marginibus membranaceis angustissimis instructa, nervo validissimo utrinque elevato inæqua-

liter divisa, parte angustiori undulata, erecta, glabra lævissimæque.

SCAPUS longitudine fere foliorum, simplex, erectus, anceps, foliis quibus simillimus est crassior, ultra medium lateraliter fissus et sic excavatus ut amento juniori pro spatha inserviat, supra amentum omnino foliaceus.

AMENTUM unicum, binucleale, adscendens, subarcuatum, anreum, pulchre flavicans, omnino nudum.

FLORES densissime et ut optime observat Cl. SMITHIUS tessellato-congesti, virides vel luteoli.

PERIGONIUM simplex, hexaphyllum, omnino glutaceum, foliolis scariosis, fusciscentibus, parvulis, oblongis, concavis, apice inflexis, obtusis.

STAMINA perigonio paulo longiora : *filamenta* latiuscula, breviora; *antheræ* breves, crassæ, didymæ, luteæ.

GERMEN oblongum, superne viride trigonumque, inferne albidum. *Stylus* nullus. *Stigma* simplex, obtusum, sessile.

CAPSULÆ parvæ, congestæ, trigonæ, triloculares, loculis monospermis? (D. s.)

Adoras stagnorum rarius. *Bernæ* circa villam *Holligen*. Prope *Schadau*; *Basileæ* circa *Tramlingen*, *Brüglingen*, et *S.^{tu}m Jacobum*. Prope *Gundeldingen* et *Bratteln*. In paludibus ad lacum *Riparium* circa *Wesen*; in ipsa urbe *Wallenstadt*. *A la Grange* prope *Lausannam*. Ad lacum *Moratensem*. Aiunt etiam in paludibus prope *Urban* occurrere. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

Obs. Nondum inter auctores constat an perigonium *Acori* calyx corollæ dici debeat; nam SMITHIUS, repugnante celeberr-

rino JUSSIEU, contendit stamina glumis alterna esse *). Ignoramus etiam adhuc an capsularum loculi ut HALLERUS ex iconc micheliana (tab. 45. fig. 51) affirmat monospermi, aut ut innuit LINNÆUS (gen. pl. 451. p. 172) polyspermi sint, quæ dubia in speciminibus siccis dilucidare, nobis non datum est. Planta recens igitur in solo suo natali denno investiganda erit. — Culmus et folia masticata saporem odoremque gratum perhibent.

G. 46. JUNCUS Decand.

Cal. hexaphyllus, glumaceus, persistens.
Cor. nulla. *Stamina* 6. *Stigmata* 3. *Caps.* trivalvis, trilocularis, polysperma. (*Folia* teretia, glabra. *Flores* corymbosi.)

Analysis.

- | | |
|--|--|
| Culmus omnino nudus, nec basi, nec apice foliosus. — 1. | Culmus saltem apice vel basi foliosus. — 12. |
| 1. Folia radicalia canaliculato-setacea; culmi vix ultra 4 uncias longi. — 2. | Folia nulla nisi culmos steriles dicas. — 5. |
| 2. JUNCUS <i>capitatus</i> . Sp. 8. | |
| 3. Capsulæ acuminatæ. Herba glaucescens. — 4. | Capsulæ obtusæ. Herba late viridis. — 5. |
| 4. JUNCUS <i>glaucus</i> . Sp. 1. | |
| 5. Culmus vix pedalis; panicula pauciflora. — 6. | Culmi sesquipediales et cubitales; panicula multiflora. — 9. |
| 6. Panicula medio fere culmo insidens; flores albidii, parvi; herba mollis. — 7. | Panicula prope apicem e culmo erumpens; flores atro-fusci, magni; herba rigida. — 8. |
| 7. JUNCUS <i>filiformis</i> . Sp. 4. | |

*) In specimine recenti plantæ florentis, ad lacum *moratensem* lectæ, hodie (X Kal. Jul. 1811) stamina quævis a singulo perigonii foliolo tecta, et eidem utique opposita observo. In germi-nibus autem ne vestigia quidem seminum deprehendi possunt.

8. *Juncus arcticus*. Sp. 5.
9. Culmus mollis, spongiosus; Culmus rigidus, durus; panicula
panicula laxa, effusa. — 10. arcte conglobata. — 11.
10. *Juncus effusus*. Sp. 2.
11. *Juncus conglomeratus*. Sp. 3.
12. Folia teretia, fistulosa. — Folia setacco-canaliculata. — 24.
15.
13. Folia plus minusve conspi- Folia omnino enodia. Culmi tan-
cuae articulato-nodosa. Culmi tum basi apiceve foliosi. — 21.
toti foliosi. — 14.
14. Panicula decomposita vel Flores pauciores, capitati, vel pa-
supradecomposita, multiflora. nicula simpliciuscula. — 18.
Culmi sæpe elati. — 15.
15. Folia compressa. Flores spa- Folia teretia. Flores pallide vi-
dicei, foliolis calycinis acutis; rentes, foliolis calycinis ob-
capsulae acuminatae. — 16. tusis, mucronulatis. Capsulae
obtusae. — 17.
16. *Juncus acutiflorus*. Sp. 10.
17. *Juncus obtusiflorus*. Sp. 9.
18. Panicula simpliciuscula. Cap- Capitula in quovis culmo unum
sulae obtusae. Culmi semipe- alternave. Folia obsolete ar-
dales vel altiores. Planta al- ticulata. Culmus vix 4 uncias
pina. — 19. altus. — 20.
19. *Juncus acutiflorus* β.
20. *Juncus affinis*. Sp. 11.
21. Folia vaginis culmi basin Foliū in quovis culmo subso-
tegentia. Bractea communes litarium, capitulum plerum-
capituli aphyllae. — 22. que superans. Bractea com-
munes aristatae. — 25.
22. *Juncus triglumis*. Sp. 16.
23. *Juncus Jacquini*. Sp. 17.
24. Culmi simplices. — 25. Culmi ramosi. — 30.
25. Culmus triflorus. Folia tria Flores corymbosi, numerosi. —
terminalia, erecta. — 26. 27.
26. *Juncus trifidus*. Sp. 6.
27. Folia pauca, tenera; flores Folia numerosissima, rigida.
parvi. Radix repens. — 28. Flores magni. Radix fibrosa.
— 29.
28. *Juncus bulbosus*. Sp. 13.

29. *JUNCUS squarrosus*. Sp. 7.

30. Culmi decumbentes vel adscendentes ; flores glomerati. — 31. Culmi erecti ; flores solitarii. — 32.

31. *JUNCUS supinus*. Sp. 12.

32. Flores clausi elongati, viriduli ; foliola calycina inæqualia, capsulis longiora. — 33. Flores clausi ovati, spadicei ; foliola calycina subæqualia ; capsulæ calycem æquantes. — 34.

35. *JUNCUS bufonius*. Sp. 14.

34. *JUNCUS Tenageja*. Sp. 15.

* Culmus nudus.

1. *JUNCUS glaucus* Ehrh. — J. culmo nudo stricto glauco panicula laterali erecta (rigida), capsulis ellipticis acutis. Smith. (Gall. *Jonc glauque*.)

Juncus Hall. helv. 1311; *an var. a?* Scheuchz. *Gram.* 345.

J. inflexus (non L.) *Sut. Fl. helv.* 1. p. 207.

~~~~~  
*J. glaucus* *Smith brit.* 575. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 205. *Pers. syn.* 1. p. 382. *Loisel. Fl. gall.* 208. *Decand. syn.* 1834.

*J. inflexus* *Decand. Fl. fr.* 1834. *Vill. delph.* 2. p. 231. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 265 ?

~~~~~  
J. glaucus *Host Gram. austr.* 3. tab. 81. *J. inflexus* *Leers herb.* 88. tab. 13. fig. 2.

~~~~~  
*J. glaucus* *Ehrh. Gram. exs. Dec.* 9. n° 85. *Schleich. l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX tenacissima, transversa, fibris verticalibus, plerumque parum capillatis.

FOLIA nulla, nisi culmos steriles, ceteris tamen plerumque breviores dicas.

**CULMI** fasciculati, dense cespitosi, glauci, basi vaginis nonnullis fissis, aphyllis, apice obtusis, vel rarius acutis, inferioribus profunde striatis, brevissimis, atro-fuscis nitentibus vestiti, graciles, stricti, durissimi, medulla arcta parce faretæ, profunde striati, apice attenuati, acuti et fere pungentes, supra corymbum per exsiccationem tortuoso-inflexi, pedales et cubitales.

**CORYMBUS** lateralis, supradecompositus, totus erectus, *pedunculis* numerosis, valde inæqualibus, rigidis, basi bracteatis, lævibus, hinc convexis, inde quasi canaliculatis, corymbiferis; *pedunculis secundi ordinis* subcorymbiferis: *pedicellis* brevissimis, uni-vel bifloris. Corymbus hic e fovea oblonga, superne culmo insculpta marginibusque scariosis aucta nascitur.

**FLORES** solitarii, terminales et sessiles, vel laterales in pedicellis, spadicei, contracti fere cylindrici. *Bracteæ* duæ ad basin floris, ovatæ, spadiceæ, apice scariosæ, acutæ, floribus multo breviores.

**CALYCIS** *foliola* elongata, angusta, subulata, erectiuscula, subæqualia, canaliculata, lævia, rigida, nervo unico in mucronulum protenso. *Stigmata* rubra, foliolis breviora, *antheras* superantia.

**CAPSULE** elliptico-trigonæ, acutæ, mucronatæ, fuscae, nitidæ, trivalves, polyspermæ. *Semina* minima, oblonga, acuta, irregularia, dilute ferruginea, striis undulatis percursa. (D. v.)

Ubique ad vias et locis humidiusculis. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

2. *JUNCUS effusus* L. — *J. culmo nudo stricto* (molli), panicula laterali effusa, capsulis obtusis. Sin. (Gall. *Jonc épars.*)

*Juncus Hall. helv.* 1311. (*Var. β?*) *Scheuchz. Gram.* 311. *J. effusus Sat. Fl. helv.* 1. p. 207.

~~~~~

J. effusus L. Sp. pl. 464. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 205. *Smith brit.* 376. *Dècand. Fl. fr.* 1833. *Pers. syn.* 1. p. 383. *Loisel. Fl. gall.* 208. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 265.

~~~~~

*J. effusus Host Gram. austr.* 3. tab. 83. *Leers herb.* 88. tab. 13. fig. 3.

~~~~~

J. effusus Ehrh. Gram. exs. Dec. 8. n.º 75. *Schleich. l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 3.

HABITUS et RADIX fere prioris.

CULMI basi vaginati, nudi, crassiusculi, molles, medulla spongiosa quæ facile sub digitis comprimitur farcti, pallide virentes, tenuissime striati, ad corymbi basin anguste coarctati, supra corymbum etiam exsiccati rectiusculi. *Vaginæ* ad basin culmi fere absque nitore, obtusæ, in *aristam* setaceam brevem sæpe productæ. *Culmi* steriles reliquis similes.

CORYMBUS supradecompositus, ut in priori ex parte superiori culmi erumpens, lateralis, in orbem expansus et divaricatus, *pedunculis* bis terque corymbiferis, subancipitibus, vix rigidis, valde inæqualibus. *Bracteæ* ad eorum basin albidæ, parvæ, subvaginantes.

FLORES duplo minores quam in *J. glauco*, viridiusculi, similiter dispositi. *Bracteæ* florales oculo nudo vix conspicuæ, albidæ, acutæ.

CALYCIS *foliola* subæqualia, planiuscula, lanceolato-linearia, marginibus albidis, nervo viridi prominulo, in mucronulum brevem producto. *Genitalia* fere prioris.

CAPSULÆ lividæ, absque nitore, breves, ovatæ, trigonæ, omnino obtusæ, breviter mucronulatæ, triloculares, polyspermæ. *Semina* minima, albida, striato-corrugata. (D. v.)


Vulgaris in locis umbrosis, humidis, in sylvarum paludibus, etc. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

5. *JUNCUS conglomeratus*. L. — J. culmo nudo stricto, panicula laterali conglobata, capsulis retusis, floribus triandris. Sm. (Gall. *Jonc aggloméré*.)


Juncus Hall. *helv.* 1312. Scheuchz. *Gram.* 343. J. conglomeratus Sat. *Fl. helv.* 1. p. 207.



J. conglomeratus L. *Sp. pl.* 464. Willd. *Sp. pl.* 2. p. 205. Smith *brit.* 376. Decand. *Fl. fr.* 1832. Loisel. *Fl. gall.* 208. Pers. *syn.* 1. p. 383. Lam. *Enc. méth.* 3. p. 264.



Host Gram. austr. 3. tab. 82. *Leers herb.* 87. tab. 13. fig. 1.



Ehrh. Gram. exs. Dec. 7. n.º 65. *Schleich. l. c.* p. 16. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 2. J. glomeratus Thom. *l. c.* p. 14.

RADIX priorum.

CULMI cespitosi, fasciculati, numerosi, stricti, rigidiusculi, duri, læves, vix conspiciene striati, graciles, pedales, sesquipedales, basi *vaginis* nonnullis striatis, oblongis, obtusis, rubellis fuscisve, vulgo in *aristam* filiformem desinentibus tecti. *Culmi* steriles breviores, ceterum reliquis consimiles.

PANICULA lateralis, quasi sessilis, dense conglobata, 5-5 uncias infra apicem e culmo erumpens; *pedunculis* brevibus, inæqualibus, glomeruliferis; florum glomerulis densis, subsessilibus. *Fovea* lateralis dilatata, marginibus albida. *Bracteæ* communes oblongæ, albidæ; universalis lanceolata, aristata.

FLORES minuti, breves, spadicei vel ferruginei, brevissime pedicellati. *Bracteæ* florales minutissimæ, albidæ, ovato-acutæ.

CALYCIS *foliola* fere æque longa, rigidiuscula, dorso viridia, marginibus rubella: *exteriora* subulata, angustiora, canaliculata, in mucronem longiusculum producta; *inferiora* lineari-lanceolata, acutissima, planiuscula. *Stamina* (bene monente LEERSIO) tria nec sena. *Stigmata* rubra.

CAPSULÆ parvæ, subrotundæ, obtusissimæ, subretusæ, vix mucronatæ, fuscae, nitidulæ, triloculares, polyspermæ. *Semina* omnino minutissima, tenuissima, striata. (D. v.)

In pascuis humidiusculis et ad vias minime rarus. — Perennans.

Fl. Junio et Julio.

4. *JUNCUS filiformis* L. — J. culmo nudo filiformi, panicula laterali bracteata pauciflora, capsulis subglobosis obtusis. N. (Gall. *Jonc filiforme*.)

Juncus Hall. helv. 1313. *Scheuchz. Gram.* 347.
tab. 7. fig. 11. *J. filiformis Sut. Fl. helv.* 1. p. 207.



J. filiformis L. Sp. pl. 465. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 207.
Decand. Fl. fr. 1835. *Loisel. Fl. gall.* 208. *Peis.*
syn. 1. p. 383. *Smith brit.* 377. *Lam. Enc. méth.*
3. p. 265. *Vill. delph.* 2. p. 231.



Host Gram. austr. 3. tab. 84. *Leers herb.* 89. tab.
13. fig. 4.



Ehrh. Gram. exs. Dec. 10. n.^o 95. *Schleich. l. c.*
p. 16. *Thom. l. c.* p. 14.

RADIX gracilis, longe repens, fibras albas longiusculas demittens, parum cespitosa.

CULMI erectiusculi, filiformes, semipedales, rarius fere pedales, fistulosi, nec ut in prioribus medulla farcti, læte virides, vix striati, nudi, basi *vaginis* paucis, valde inæqualibus, fissis, modo obtusiusculis aphyllisque, modo in *aristam* brevem, rarius in *foliolum* longiusculum, canaliculatum protensis vestiti.

PANICULA lateralis, erecta, medio fere culmo insidens, floribus paucis (5-5, rarissime 8-10) nunc fere sessilibus, nunc conspiciens pedunculatis constans. *Pedunculi* inæquales, plerumque uniflori, rarius 2-5-flori. *Bractea* communis, parva, scariosa, in foliolum setaceum producta. *Fovea* in culmo basi vaginans, oblonga, marginibus late scariosis. Culmi *elongatio* supra paniculam canaliculata; foliolisque bascos similis, quandoque decedit et tunc (monente jam SCHEUCHZERO), panicula terminalis videtur.

FLORES lineam circiter unam longi latique, viriduli lenique purpura suffusi. *Bractew* florales scariosæ, concavæ: *exterior* major obtusissima; *interior* acutiuscula.

CALYCIS *foliola* angusta, mutica, lanceolata; *exteriora* nervis tribus approximatis percursa, rigidiuscula, apice canaliculato-cucullata, *interiora* paulo breviora, latiora, planiuscula, obtusiora. *Stigmata* spiraliter contorta.

CAPSULÆ magnæ, fere globosæ, subtrigonæ, obtusæ, mucronulatæ, lividæ, nitidulæ, triloculares, polyspermæ. (D. v.)

In paludibus torfaceis Alpium. In M. *Gotthardo*, *Fouly*, *Sanetsch*, *Enzeindaz*; inter *Lauterbrunn* et *Grindelwald*; in Alpibus supra *Château-d'Oex*; *au-dessus des Plans*, etc. — Perennis. Fl. Julio et Augusto.

5. *JUNCUS arcticus* Willd. — J. culmo nudo rigido, apice acuminato pungenti, umbella laterali sessili simpliciuscula, capsulis obtusis. N. (Gall. *Jonc boréal*.)

Juncus arcticus Willd. *Sp. pl.* 2. p. 206, *Decand. Fl.* fr. 1839. *Pers. syn.* 1. p. 383. *Loisel. Fl. gall.* 208.

♀ *J. acuminatus* Balb. *Add. Fl. pedem.* 87.

J. paucillorus Mönch. ex Schleich. *catalog. priori* 57.

~~~~~

*J. Jacquini* (non L.) *Fl. dan.* tab. 1095.

~~~~~

J. arcticus Schleich. *l. c.* p. 16. *J. acuminatus* Thom. *l. c.* p. 14.

RADIX gracilis, longe repens, squamosa, fibras albidas, longissimas, tortuosas demittens.

CULMI approximati, cespitosi, nudi, 6-9 uncias longi, stricti, rigidi, vix striati, fistulosi nec medulla farcti, apice membranaceo, acuminato, pungenti, basi *vaginis* plerumque aphyllis, rarius brevissime aristatis, subfuscis, obtusis, striatis fissisque tecti. *Culmi* steriles paucissimi, reliquis simillimi.

UMBELLA lateralis, omnino sessilis nec ulli pedunculo communi insidens, brevis, pauciflora, simpliciuscula, conglobata, prope apicem culmo inserta. *Fovea* angustissima, marginibus scariosis aucta. *Pedunculi* sæpe subnulli, semper breves, inæquales, erecti, uniflori, rarius bi- vel triflori. *Pedicelli* partiales nulli. *Bracteæ* communes floralibus similes, subinde breviter aristatæ.

FLORES magni, ex atro-fusco et albido varii, terminales vel sessiles. *Bracteæ* florales calyce duplo breviores, basi fuscae, superne albidæ, ovatæ, acutæ.

CALYCIS *foliola* atro-fusca, dura, marginibus late scariosa, albida, subcarinata, nervo dorsali viridi prominulo; *exteriora* lanceolata, acutiuscula; *interiora* ovata, latiora brevioraque.

CAPSULÆ magnæ, nigrescentes, nitidæ, calyce paulo longiores, obovatæ vel subrotundæ, obtusæ, vix mucronatæ, polyspermæ, triloculares. (D. v.)

Hab. in solo micaceo vallium alpinarum editissimarum. *Au Breuil* ad descensum M. *Sylvu* versus *Austrum*. Rever. MURTH. Ad lacum *Mar-Hor* infra M. *Moro* supra vallem *Saas*. Etiam in valle asperima *l'Alée-blanche* ad pedem meridionalem gigantei *Montblanc* hanc rarissimam plantam abunde reperimus. — Perennis. Fl. Junio et Julio. Incipiente Aug. capsulæ maturæ erant.

Ons. Rigiditate peculiari et floribus ad *squarrosus* accedit : differt umbella laterali culmoque nudo. Quoad habitum *J. Jacquini* simillimus : ab eo tamen umbella sessili nec pedunculata, defectu folioli floralis, floribus semiscariosis et præcipue capsulis globosis facile distinguitur. A *filiformi* culmorum rigiditate et crassitie, figura coloreque calycis abunde etiam differt.

6. *JUNCUS trifidus* L. — *J.* culmo nudo, foliis subternis terminalibus erectis. N. (Gall. *Jonc à trois pointes.*)

Juncus Hall. *helv.* 1315. *Scheuchz. Gram.* 325. *J.* trifidus Sut. *Fl. helv.* 1. p. 208.

~~~~~

*J. trifidus* L. *Sp. pl.* 465. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 208. *Smth brit.* 378. *Decand. Fl. fr.* 1837. *Lam. Enc. meth.* 3. p. 271. *Vill. delph.* 2. p. 231 et 242. *Loisel. Fl. gall.* 208. *Pers. syn.* 1. 384.

~~~~~

J. trifidus Host *Gram. austr.* 3. tab. 85. *Fl. dar.* tab. 430. (*mediocris*). *Krock. Fl. sil.* 1. p. 557. tab. 48.

J. monanthos Jacq. *Obs.* 33. tab. 4. fig. 1.

~~~~~

*J. trifidus* Schleich. *l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* p. 2. Dec. 2.

**RADIX** repens, dense cespitosa, fibris gracilibus, subligiosis,

**CULMI** teretes, stricti, vix striati, graciles, filiformes, cum foliis terminalibus florentes 2-4 uncias longi, adulti semipedales et pedales, inferne vaginati, apice foliosi, ceterum nudi. *Vaginæ* baseos latissimæ, striatæ, breves : ceteræ stramineæ, elongatæ, appresso-tubulosæ, fissæ, vix striatæ, graciles,

in foliola brevīa, aristiformia productæ. *Ligula* oppositifolia, membranacea, oblonga, piloso-multifida.

FOLIA terminalia, plerumque terna, 1-4 uncias longa, erecta, stricta, setacea, canaliculata, inæqualia, læte viridia, breviter vaginantia, *ligula* fere ut in vaginis inferioribus.

FLORES mediocres (sesquilineam longi), in alpi-  
bus nostris plerumque in quovis culmo solitarii,  
subinde duo, rarissime tres, in culmo ad ortum  
foliorum terminales, brevi tamen insidentes pedun-  
culo. *Bractee* parvæ, ovatæ, acutiusculæ: exterior  
lanceolata in aristam seu foliolum setaceum, plus  
minusve longum producta.

CALYCIS *foliola* atro-fusca, rarius viridia, mar-  
ginibus late scariosa, erectiuscula: *exteriora* lan-  
ceolata, mucronata; *interna* vix breviora sed la-  
tiora, ovata, obtusa, modo mutica, modo mucro-  
nulata. *Stigmata* pallida, spiraliter convoluta.

CAPSULAS (secundum Cl. Host subrotundas, tri-  
gonas, longius mucronatas) auctore SMITH ellip-  
ticas (quod melius cum ipsius HOSTII figura con-  
venit), acuminatas, polyspermas, maturas nondum  
reperire potuimus. (D. v.)

Ad fissuras rupium primordialium in alpi-  
bus editionibus non  
raras. In M. Gotthardo, Bernardo, Fouly, Sempronio,  
Salanfe, Ferpels; in valle D. Nicolai. In summo M.  
Joch. Infra pontem Diaboli in den Schöllinen. Sur le  
Côté du Bonhomme, etc. — Perennis. Fl. Julio et Augusto.

7. *JUNCUS squarrosus* L. — J. culmo subnudo stricto, foliis setaceo-canaliculatis, panicula terminali composita glomerata. Sm. (Gall. *Jonc rude.*)

*Juncus Hall. helv.* 1317. *Scheuchz. Gram.* 322.


*J. squarrosus Süt. Fl. helv.* 1. p. 208.



*J. squarrosus L. Sp. pl.* 465. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 209; *Smith brit.* 378. *Decand. Fl. fr.* 1838. *Lam. Enc. méth.* 2. p. 267. *Pers. syn.* 1. p. 384. *Loisel. Fl. gall.* 209. *Vill. delph.* 2. p. 232.



*Fl. dan. tab.* 430. *Krock Fl. sil.* 1. p. 556. *tab.* 47.



*Ehrh. Gram. exs. Dec.* 4. n.º 39. *Schleich. l. c.* p. 16.

RADIX fibrosa, fibris crassis, teneris, elongatis,

FOLIA radicalia valde numerosa, dense cespitosa, rigida, alia erecta, alia patentia, alia recurva, culmo duplo breviora, angusta, setacea, canaliculata, lævissima. Culmea perpauca, ceteris consimilia, vaginis membranaceis, semiscariosis fissisque instructa. Vaginæ exteriores squamiformes, ovatae, latissimæ, duræ, fasciculum foliorum culmumque amplectentes.

CULMUS basi tantum foliosus, semipedalis, trientalis, compressus vel obsolete angulosus, strictus, rigidus, lævis.

PANICULA terminalis, stricta, paniciflora, ex pedunculis paucis, valde inæqualibus, compositis, rigidis, basi bracteatis constans. Bractea communis inferne demum tota fissa, membranacea, oblonga, in foliolum



florale panicula modo longius, modo multo brevius producta.

FLORES 1-5ve in quovis pedunculo, approximati, vix pedicellati, magni. *Bracteæ* florales appressæ, ovato-acutæ, calyce fere duplo breviores, basi ferrugineæ, ceterum scariosæ.

CALYCIS *foliola* fere æqualia, atro-livida, nitida, in marginibus scariosa, concava, lanceolata, obtusiuscula, patentia. *Stigmata* spiraliter convoluta. *Stamina* sena, brevissima.

CAPSULÆ obovato-trigonæ, obtusæ, vix mucronatæ, calyce fere breviores, polyspermæ. (D. v.)

In *Helvetia* rarissimus, nusquam nisi in *Gotthardi* paludibus supra vallem *Ursariam* repertus est. — Perennis. Fl. Julio et Augusto.

8. *JUNCUS capitatus* Weig. — J. culmo nudo filiformi, capitulo terminali subsolitario involucrato. Willd. (Gall. *Jonc en tête*.)

J. capitatus Willd. *Sp. pl.* 2. p. 209. *Loisel. Fl. gall.* 209. J. ericetorum *Decand. Fl. fr.* 1836.

~~~~~

J. capitatus Hoppe in *Sturm. Fl. germ.* 1. fasc. 13. tab. 7.

Schœnus ferrugineus Krock. *Fl. sil.* 1. p. 57. tab. 57: (*mediocris*.)

~~~~~

J. capitatus Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 1. n.º 8.

RADIX fibrosa, capillacea.

FOLIA pauca, filiformia, canaliculata, erectiuscula, lævia, biuncialia, angustissima.

CULMI filiformes, omnino nudi, erecti, modice compressi, foliis nunc breviores, nunc duplo fere longiores.

CAPITULUM ex viridi albidum, subrotundum vel orbiculare, 5-10-florum, in quovis culmo terminale, plerumque solitarium et sessile. Subinde tamen alterum capitulum pedunculo proprio insidens supra prius adest. *Involucrum* 5-6-phyllum, *bracteis* inæqualibus, ovatis, concavis, in acumen longum aristiforme productis constans: *extima* foliolum v. culmi prolongationem mentiens, erecta, capitulum superans ut flores fere laterales videantur; *ceteræ* multo minores.

FLORES sessiles, contigui.

CALYCIS *foliola* inæqualia: *exteriora* latiora longioraque, acute carinata, oblonga, acuminato-aristata, apice demum incurva vel recurva. *Stigmata* (in nostris \*) tria. *Stamina* 6.

CAPSULÆ calyce breviores, obtusæ, muticæ, elliptico-triquetræ, angulis fere alatis, faciebus excavatis. *Semina* numerosa. (D. s.)

Planta in Helvetia nondum observatam prope balneas *Weisenburg* detexit ac nobiscum benignissime communicavit amplissimus vir ALB. HALLERUS. — Annua. Fl. Junio et Julio.

OBs. Nec tamen dissimulare debco doctissimum HALLERUM ipsum nunc de natali loco dubitare ut nos per litteras certiores fecit. Itaque quamvis planta quam nobis dedit absque omni dubio ad *J. caplatum* Weig. pertinet, tamen fatendum est eam adhuc dubiam esse civem.

---

\*) Cl. HOPPE duo tantum stigmata observavit.

9. *JUNCUS obtusiflorus* Ehrh. — J. culmo erecto, foliis fistuloso-articulatis teretiusculis, panicula supradecomposita, foliolis calycinis obtusiusculis. N. (Gall. *Jonc à fleurs obtuses.*)

*Juncus* Hall. *helv.* 1323. *Scheuchz. Gram.* 334.

*J. obtusiflorus* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 209.

~~~~~

J. articulatus γ *L. Sp. pl.* 463. *J. articulatus* β. *Smith brit.* 379. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 268 β.

J. sylvaticus *Willd. Sp. pl.* 2. p. 211. (*confusis synonymis notisque diagnosticis*). *Loisel. Fl. gall.* 209. *Pers. syn.* 2. p. 384. *Decand. Fl. fr.* 1849.

~~~~~

*Host Gram. exs.* 3. tab. 86. (*Bona.*)

~~~~~

J. obtusiflorus *Ehrh. Gram. exs. Dec.* 8. n.° 76. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 2. *J. sylvaticus* *Schleich. l. c.* p. 16 ?

RADIX horizontalis, cespitosa.

FOLIA longa, crassa, multo obscurius quam sequentis articulata, vix compressa, fere teretia. *Vaginae* breves, dorso cylindricæ, utrinque membrana viridiuscula, pallidiori, culinum amplectente auctæ. *Ligula* brevis, obtusa, bifida.

CULMI erecti, lævissimi, nitidi, subfistulosi ut sub digitis facile comprimantur, medulla rara farcti, foliosi, plerumque elati, cubitales, tripedales, ad basin squamis tecti.

CORYMBUS terminalis, repetito-ramosus, pedunculis ultimi ordinis sæpe refractis. *Folium* florale corymbo brevius, erectum, reliquis simile. *Bractea*

ad basin pedunculorum albidæ, oblongæ, involutæ, acutiusculæ, numerosæ.

FLORES fasciculati, in quovis fasciculo terni-quini, sessiles, laterales, pallidi, linea una breviores. *Bracteæ* florales scariosæ, albidæ, concavæ, acutiusculæ.

CALYCIS *foliola* ovata, concava, dilutius spadicæa, subcarinata, fere æqualia, obtusa, mucronulo inflexo, albido aucta. *Stigmata* plumosa, longissima, flexuosa, alba.

CAPSULÆ calycem vix superantes, rubellæ, ovatæ, parvæ, obtusiusculæ, mucrone crassiusculo.

In paludibus spongiosis, vulgo. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

Obs. Cl. SMITH hanc a sequente non separat: eas tamen multo melius descripsit quam plerique auctores qui species seorsim duas exhibentes synonyma et notas diagnosticas egregie confunderunt. HALLERUS eas optime distinxit.

10. *JUNCUS acutiflorus* Ehrh. — J. culmo ascendente, foliis fistuloso-articulatis compressis, calycibus acutis. N. (Gall. *Jonc à fleurs pointues.*)

α. Panicula subsupradecomposita, vulgatio.

Juncus Hall. *helv.* 1322. *Scheuchz. Gram.* 331 et 332. J. acutiflorus Sut. *Fl. helv.* 1. p. 208.

~~~~~

J. articulatus α *L. Sp. pl.* 463. *Smith brit.* 379 α. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 268 α.

J. articulatus *Decand. Fl. fr.* 1848. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 211. *Loisel. fl. gall.* 209.

J. acutiflorus *Hoffm. fl. germ. ed.* 1. p. 125.

J. aquaticus *Pers. syn.* 1. p. 384. (*Vide observationem ad priorem Juncum spectantem.*)

J. adscendens *Host Gram. austr.* 3. tab. 87.

J. acutiflorus *Ehrh. Gram. exs. Dec.* 7. n.º 66.  
*Thom. l. c. p.* 14. *Seringe l. c. p.* 2. *Dec.* 2. J.  
 ascendens *Schleich. l. c. p.* 16.

αβ. Var. panicula folioso-prolifera.

*Scheuchz. Gram.* 333. n.º 2.

β. Var. alpina, minima, panicula subsimplici.

*Juncus Hall helv.* 1321. *Scheuchz. Gram.* 333.  
 n.º 3. J. alpinus *Sut. Fl. helv.* 1. p. 208.

*Juncus alpinus Vill. delph.* 2. p. 233. *Decand. Fl.*  
*fr.* 1850. *Pers. syn.* 1. p. 384. *Loisel. fl. gall.* 209.

J. articulatus β. *Willd. Sp. pl. l. c.*

J. alpinus *Schleich. l. c. p.* 16. *Thom. l. c. p.* 14.

RADIX transversa, grumosa, substolonifera, fere prioris.

FOLIA, præsertim exsiccata, nodoso-articulata, nodis approximatis, compressa nec teretia. *Vaginæ* et *ligula* ut in *obtusifloro*.

CULMI duriusculi, ut vix comprimi possint, foliosi, inferne vaginis foliorum emarcidorum tecti, nec squamosi, semipedales, trientales vel pedem integrum longi, adscendentes.

CORYMBI plerumque multo minus quam in priori ramosi, *pedunculis* ultimi ordinis erecto-patentibus vel refractis. *Folium* florale brevissimum, tenue, acutissimum. *Bractee* prioris.

FLORES fasciculati, sessiles, atro-spadicei, per flo-

rescentiam acutissimi, lineam unam aut sesquilineam longi. *Bracteæ* florales, spadiceæ, longiusculæ, acutæ.

CALYCIS *foliola* parum inæqualia, lanceolata, acutissima, mucrone semper erecto.

CAPSULÆ ovatæ, calycem superantes, superne attenuatæ, obtusiusculæ, mucronatæ, nitidæ, atrospadiceæ. (D. v.)

β. RADICEM nunquam ut vult SCHEUCHZERUS mere fibrosam, sed semper ut in var. α transversam vidimus.

CULMI humiles, adscendentes.

FOLIA plerumque crassiora, compressa, frequenter nodosa.

CORYMBUS simpliciusculus, ex duobus tribusve pedunculis brevibus constans. *Folium* florale plerumque corymbo longius, erectum.

FLORES omnino prioris.

CAPSULÆ magis obtusæ, mucronatæ. (D. v.)

α. In paludibus minus profundis ubique vulgaris. β. In alpium paludibus minime rara. — Perennis. Fl. α. Majo et Junio. β. Jul. et Augusto.

Obs. Nullus dubito quin α et β unam eandemque speciem efficiant.

11. *JUNCUS affinis* N. — J. foliis obsolete articulatis, capitulo terminali in culmo subsolitario. N. (Gall. *Jonc rapproché*.)

RADIX gracilis, transversa.

CULMI vix cespitosi, foliosi, flexuosi, decumbentes vel adscendentes, 2-4-unciales.



FOLIA crassiuscula, teretia, subulata, obsolete nodosa, ut plerumque omnino enodia esse videantur, exsiccata tortilia. *Vaginæ* elongatæ, fissæ, ad margines superne scariosæ; inferiores purpurascentes; imæ paucae, solutæ, ovato-lanceolatae, subcœruleæ.

CAPITULUM 5-5-florum, parvum, in quovis culmo terminale, plerumque solitarium; quandoque tamen alterum pedunculo brevi supra capitulum solitum insidet. *Folium* florale erectiusculum, capitulo longius, *vagina* pedunculum sive culmi apicem tegens.

FLORES parvi, glomerati, 5-5 in quovis capitulo, ex viridi spadicei. *Bracteæ* florales lanceolatae, acutæ, albidæ.

CALYCIS *foliola* vix inæqualia, lineari-lanceolata, obtusiuscula, subapiculata, concava, carinata, uninnervia, pallide spadicea, nervo dorsali viridi, margine anguste scariosa. *Stamina* 6.

CAPSULÆ spadiceæ, oblongæ, trigonæ, subacutæ, mucronatæ. (D. v.).

Locis innudatis rarissime. *Aux Grangettes* ad caput *Lemani* copiosum ante decem annos inveni, et anno præterito (1810) eodem loco denuo observavi. — Perennis. Fl. per totam æstatem.

Obs. Habitu plane a priori recedit: speciem tamen nondum satis observatam nonnisi dubitantes proponimus. Inter priores et *J. subverticillatum* cujus speciem fere refert intermediam fere diceret: sed magis cum illis convenire videtur. Ab eo glomerulis nunquam profliferis foliisque crassioribus subnodosis differt. Magis adhuc cum *J. uliginoso* Roth (V. STURM Fl. germ. 1. Fasc. 15.) convenit licet in nostro capitula neutiquam foliosa sint nec radículas demittant.

12. *JUNCUS supinus* Roth.—J. foliis capillaceo-canaliculatis, glomerulis subtrifloris subproliferis, floribus subtriandris, culmo radicante diviso. N. (Gall. *Jonc setacé.*)

*Juncus* Hall. *helv.* 1320. Scheuchz. *Gram.* 330. tab. 7. fig. 10? J. subverticillatus Sut. *Fl. helv.* 1. p. 209.

~~~~~

J. subverticillatus β. Willd. *Sp. pl.* 2. p. 212. Lois. *Fl. gall.* 209. J. verticillatus Pers. *syn.* 1. p. 384.

~~~~~

J. supinus Roth. *germ.* 1. p. 156 et 2. p. 409. Hoffm. *germ. ed.* 1. p. 125. Decand. *Fl. fr.* 1846.

J. mutabilis γ. Lam. *Enc. méth.* 3. p. 270.

~~~~~

J. supinus *Fl. dan.* tab. 1099. J. subverticillatus Host *Gram. austr.* 3. tab. 88. (bona.)

~~~~~

J. setaceus Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 9. n.º 86. J. uliginosus Schleich. *l. c.* p. 16.

RADIX fibrosa, cespitosa.

CULMI nonnulli procumbentes, radicem repentem mentientes, uno alterove geniculo subinde radicante, foliola capitulaque edente instructi; alii adscendentes vel rarius erecti, subdichotomi, foliosi.

FOLIA culmis breviora, angustissima, omnino enodia, facie canaliculato-sulcata, dorso convexa. *Vaginæ* fissæ, appressæ, superne ad margines albidæ, in ligulas duas obtusas desinentes.

GLOMERULI plerumque bi- vel triflori, numerosi, laterales, et terminales, sessiles vel pedunculati.

*Pedunculi* sæpe ex vagina folii nascentes, bractea vaginante instructi.

FLORES parvi, conglomerati, subpedicellati. *Bractea* floralis sæpe unica, subinde gemina, scariosa, concava, ovata, acutiuscula, parva.

CALYCIS *foliola* spadicea vel purpurascentia, dorso viridia, marginibus scariosa: *exteriora* paulo longiora, uninervia, carinata, lanceolata, acutiuscula; *interiora* latiora, ovato-oblonga, obtusa, trinervia. *Stamina* plerumque tria.

CAPSULÆ obovatæ, obtusæ, acute triquetrae, calyce paulo longiores. (D. s.)

In uliginosis exsiccatis rarissime. *Basileæ*. STÆHELIN. Circa M. *Belligardum*. LA CHENAL. — Perennis. Fl. æstate.

*Oss.* *J. uliginosus* Smith brit. 380 et Hoppe in Sturmii Fl. germ. 1. fasc. 15. n.º 8, propter folia teretia, obscurius articulata, ad *J. fluitantem* Lam. Enc. méth. 5. p. 270. pertinere videtur. Cf. obs. nostram ad speciem præcedentem. *Supinicap-sulæ* sæpe in bulbillum proliferum foliolis constantem immutantur.

15. *JUNCUS bulbosus* L. — *J.* foliis linearibus canaliculatis, culmo basi folioso, corymbo terminali, capsulis obovatis obtusissimis. N. (Gall. *Jonc bulbeux*.)

*Juncus* Hall. helv. 1318. Scheuchz. Gram. 322. *J. bulbosus* Sut. Fl. helv. 1. p. 210.

~~~~~

J. bulbosus L. Sp. pl. 466. Willd. Sp. pl. 2. p. 213. Smith brit. 381. Decand. Fl. fr. 1842. Pers. syn. 1. p. 385. Loisel. Fl. gall. 210. Lam. Enc. méth. 3. p. 269.

~~~~~

*J. bulbosus* *Leers herb.* 90. tab. 13. fig. 7. *Fl. dan.*  
tab. 431. *Host Gram. austr.* 3. tab. 89.



*J. bulbosus* *Ehrh. Gram. exs.* Dec. 2. n°. 18. *Schl.*  
*l. c.* p. 16. *Thorn. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* 2. Dec. 2.

**RADIX** longe repens, per intervalla cespites edens, nequaquam bulbosa.

**CULMI** subinde unciales vel binnciales, plerumque circiter pedales, inferne tantum foliosi, erecti, stricti, teretinsculi, subcompressi, simplicissimi.

**FOLIA** tenera, hinc convexa, inde canaliculata, erectiuscula, linearia, acuta, vix dimidiam lineam lata, culmo breviora. *Vaginæ* fissæ, superne ad margines scariosæ, vix auriculatæ.

**CORYMBUS** terminalis, supradecompositus, multiflorus, erectus, *pedunculis* corymbiferis strictis. *Folia* floralia erecta, ceteris consimilia, breviter vaginantia, longitudine varia, pedunculis principibus subjecta, imum corymbum plerumque superans.

**FLORES** solitarii, ad divisiones sessiles, laterales et terminales, parvi, juniores virides, adulti spadicei. *Bracteæ* florales minimæ, oculo nudo vix conspicuæ, inæquales.

**CALYCIS** *foliola* longitudine fere æqualia, enervia, dorso læte viridia, ora pulchre spadicea, cum margine angusto scarioso: *interiora* ovata, obtusissima; *exteriora* angustiora, acutiuscula.

**CAPSULÆ** obovatæ, ad angulos rotundatæ, obtusissimæ, mucrone brevissimo deciduoque instructæ, spadiceæ, nitidæ, calyce paulo longiores. (D. v.)

In pascuis uliginosis, vulgo. Prope *Tigurum*. *À la Léchette près la plaine des Mosses*. Ad *Rhodanum* à la porte de *Sex*. Infra *Michelfelden* et *St. Jacob in der Hart*. Ad ripas *Rheni* et *Wiesæ*. *Neviduni* à *Calève*, au bord du *Boiron*, etc. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

14. *JUNCUS bufonius* L. — J. foliis canaliculatis, culmo superne dichotomo, floribus solitariis subsessilibus, capsulis oblongis calyce brevioribus. N. (Gall. *Jonc des argiles*.)

*Juncus* Hall. *helv.* 1319. Scheuchz. *Gram.* 327. J. *bufonius* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 210.

~~~~~

J. *bufonius* L. *Sp. pl.* 466. Willd. *Sp. pl.* 2. p. 214. Smith *brit.* 381. Decand. *Fl. fr.* 1844. Lam. *Enc. méth.* 3. p. 269. Loisel. *Fl. gall.* 210. Pers. *syn.* 2. p. 385. Vill. *delph.* 2. p. 234.

~~~~~

J. *bufonius* Leers *herb.* 89. tab. 13. fig. 8. Host *Gram. austr.* tab. 90. *Fl. dan.* tab. 1098.

~~~~~

J. *bufonius* Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 10. n.º 96. Schleich. *l. c.* p. 16. Thom. *l. c.* p. 14.

RADIX fibrosa, annua, cespitosa.

CULMI inferne simplices, parte florifera repetitodichotomi, teretes, foliosi, altitudine mire variabiles, unciales et fere pedales; exteriores obliqui, interiores erecti.

FOLIA culmo plerumque breviora, linea dimidia angustiora, tenera, pallide virentia, hinc convexa, inde canaliculata, apice setaceo-teretia, acuta, erecta. *Vaginæ* fissæ, angulosæ, marginibus superne albidæ, vix auriculatæ.

PANICULA dichotoma, elongata, ut sæpe partem plantæ maximam efficiat, ramis angulosis, longis, paucifloris, erecto-patentibus. FOLIA *floralia* ramis præcipuis subjecta ceteris consimilia; maximum paniculam sæpe superans. *Bracteæ* ramorum lanceolatae, acuminatae, in aristam productæ.

FLORES oblongi, ex albido virides, solitarii, secundi, interiora spectantes, remotiusculi, terminales, laterales et ad ramorum dichotomias sessiles, vel brevissime pedicellati. *Bracteæ* florales breves, inæquales, concavæ, scariosæ, albæ.

CALYCIS *foliola* valde inæqualia, acuta, dorso viridia, marginibus albida, fere enervia, per florescentiam erectiuscula: *exteriora* carinata, angusta, carina in aristam breviorē desinente; *interiora* multo breviora, lata, ovata, plana, mutica.

CAPSULÆ calyce breviores, oblongæ, ellipticæ, obtusæ, muticæ. (D. v.)

Ubique in locis humidis argillosis, ad vias, in sylvis, ad fœcæas marginesque agrorum. — Annuæ. Fl. per totam æstatem.

15. *JUNCUS Tenageja* L. fil. — J. foliis canaliculatis, culmo superne dichotomo, floribus solitariis sessilibus, capsulis subrotundis calycem æquantibus. N. (Gall. *Jonc de Vaillant*.)

J. *Tenageja* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 209.

~~~~~

J. *Tenageja* L. *fil. suppl.* p. 208. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 213. *Pers. syn.* 1. p. 385. *Loisel. Fl. gall.* 210. *Decand. Fl. fr.* 1841.

~~~~~

J. *Tenageja* Sturm. *fl. germ.* 1. fasc. 10. tab. 15.

(optima.) *Vaill. paris* 109. tab. 20. fig. 1. *Fl. dan.* tab. 1160.



J. Tenageja Schleich. l. c. p. 10.

HABITUS prioris a quo nonnisi paniculæ ramis magis patentibus, sæpe divaricatis, et fructificationis partibus differt.

FOLIA paulo latiora, linearia, breviora. *Vaginæ* in auriculas duas obtusas desinentes.

CULMI et PANICULA fere præcedentis: *rami* et *pedunculi* patuli, sæpe divaricati. *Folia* floralia panicula multo breviora.

FLORES ut in *J. bufonio* dispositi: laterales, axillares, sessiles, subrotundi, nentiquam elongati, spadicei.

CALYCIS *foliola* subæqualia, ovato-acuta, nervosa, colorata: omnia planiuscula nec carinato-plicata, nervo dorsali viridi, prominulo, evanido, margine angusto scarioso instructa: florentia omnino patula.

CAPSULÆ subglobosæ, obtusissimæ, muticæ, calycem æquantes. (D. v.)


In pratis uliginosis, subtorfaceis, rarissime. Primus hunc *Juncum* in Helvetia detexit Cl. SCHLEICHERUS. Diu frustra quæsitum etiam tandem inter *Bironicum* et *Tabernas*, via qua itur *Luganum* in prato aquatico cum *Scirpo ovato*, planta quoque rarissima, copiose inveni. — Annua. Fl. Junio et Julio.

Obs. J. Tenageja Host Gram. austr. 3. tab. 91. varietas *J. bulbosi* esse videtur. A veriori *Tenageja* floribus elongatis, ex a'bo virentibus, foliis calycinis inæqualibus, erectis, capsulis minus rotundis differt. Capsulæ tamen calycem fere æquant.

ramos habet subdivaricatos foliaque ramis principibus subjecta panicula multo breviora. Hanc varietatem intermediam etiam cum *Tenageja* invenimus collegimusque.

16. *JUNCUS triglumis* L. — J. foliis semitere-
tibus, culmo basi folioso, capitulo terminali subtri-
floro aphylo bracteato. N. (Gall. *Jonc à trois*
fleurs.)

Juncus Hall. *helv.* 1314. *J. triglumis* Sat. *Fl. helv.*
1. p. 211.



J. triglumis L. *Sp. pl.* 467. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 216.
Smith brit. 382. *Decand. Fl. fr.* 1841. *Pers. syn.*
1. p. 385. *Loisel. Fl. gall.* 211. *Lam. Enc. méth.*
3. p. 267. *Vill. delph.* 2. p. 243.



J. triglumis Host *Gram. austr.* 3. tab. 92. *Fl. dan.*
tab. 132.



J. triglumis Schleich. *l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14.
Seringe l. c. p. 2. *Dec.* 2.

RADIX fibrosa, plus minusve cespitosa.

CULMUS erectus, teres, 5-4-uncialis, inferne fo-
liosus.

FOLIA culmo multo breviora, angusta, fistulosa,
enodia, rigidiuscula, erecta, superne modice re-
curva, subulata, dorso convexa, subcarinata, facie
sulcato-canaliculata. *Vaginae* longae lataeque, sca-
riose, subcoloratae, culmum amplectentes, utrin-
que in auriculam obtusam brevissimamque pro-
ductae. *Folia radicalia* ceteris longiora, sed *vaginis*
brevioribus instructa.

CAPITULUM terminale parvum, plerumque triflorum, rarius 2- vel 4-florum, totidem bracteis quot flores habet instructum. *Folia floralia* nulla.

FLORES grandiusculi, sessiles, contigui. *Bracteæ* ovato-lanceolatæ, erectæ, fuscæ, marginibus anguste scariosæ, floribus breviores, carinatæ, modo obtusæ, modo acutiusculæ.

CALYCIS *foliola* parum inæqualia, oblonga, elliptica, obtusiuscula: *exteriora* ferruginea; *interiora* pallidiora. *Stamina* sex, longiuscula. *Antheræ* parvæ. *Stigmata* crassiuscula.

CAPSULÆ calyce multo longiores, obtusiusculæ, trigonæ, oblongæ, polyspermæ, triloculares. *Semina* utrinque apiculata. (D. v.)

In uliginosis Alpium. In M. Oberstafel, Salanfe, Bernardo, Javernaz (à la source du torrent de l'Ivoëttaz). Supra Zermatt. In M. Furcula Rhætorum. In M. Pilato. Ad littora lacus amoenissimi M. Lioson, etc. — Perennis. Fl. Julio et Augusto.

17. *JUNCUS Jacquini* L. — J. culmo monophyllo, folio erecto, capitulo terminali, capsulis superne alato-triquetris. N. (Gall. *Jonc de Jacquin*.)

Juncus Hall. helv. 1316. *Scheuchz. Gram.* 322. tab. 7. fig. 9. *J. Jacquini Sut. Fl. helv.* 1. p. 210.

J. Jacquini L. mant. 63. *Gilib. Sp. pl.* 1. p. 390. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 215. *Pers. syn.* 1. p. 385. *Loisel. Fl. gall.* 210. *Decand. Fl. fr.* 1810. *Vill. delph.* 1. p. 241.

J. atratus Lam. Enc. méth. 3. p. 271.

J. Jacquini *Host Gram. austr.* 3. tab. 92. *Jacq. Fl. austr.* 3. tab. 211.



J. Jacquini *Schleich. l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 2.

RADIX transversa, per intervalla cespites numerosos edens.

CULMI multi, plerumque fere semipedales, erecti, fasciculati, fere nudi, basi vaginati, folio terminali erecto instructi: steriles ceteris consimiles, sed humiliores. *Vaginae* superiores oblongæ, subcoloratæ, fissæ, apice in aristam tenuissimam brevissimamque desinentes; inferiores numerosæ, omnino aphyllæ, breves, ovatæ, obtusæ, spadiceæ, nitentes.

FOLIUM unicum, pedunculo sive culmi elongationi cui capitulum insidet subjectum, erectum, capitulum fere semper superans, strictum, teretiusculum, subulatum. *Vagina* pedunculum fere integrum vel saltem ejus tertiam dimidiamve partem tegens. *Folium* rarius prope basin oritur et culmo brevius manet: tunc capitulum nudum est.

CAPITULUM erectum, terminale, modo pauciflorum, modo 6-10 floribus constans. *Bractee* communes, plerumque duæ, oppositæ, appressæ, inæquales, oblongæ, amplexicaules, nervosæ, fusæ vel ferrugineæ: *exterior* maxima, carinata, acuta, nervo dorsali in *aristam* capitulum superantem producta.

FLORES atro-fusci, nitidi, rarius ex fusco ferruginei, in rachi communi brevi brevissime pedicel-

lati, dense fasciculati: contracti acutissimi, oblongi, habitum fere florum *Scirpi nigricantis* referentes. *Bracteæ* florales parvæ, ovatæ, plus minusve obtusæ, atro-fuscae, apice quandoque albescentes.

CALYCIS *foliola* florentis patula, parum inaequalia, absque margine scarioso: *exteriora* lanceolata, canaliculato-concava, oblonga, mucronata: *interna* latiora, paulo breviora, ovato-lanceolata, acuta, planiuscula. *Stigmata* longissima, spiraliter convoluta.

CAPSULÆ « oblongæ, obovatæ, triquetrae, angulis superne alatis, obtusæ, polyspermæ. » Host. In alpinis nostris vix unquam maturæ reperiuntur. (D. v.)

In alpinis editioribus, rarius. In summo M. *Ochsenstock* vallis *Angelimontane*. In M. *Salanfe*, *Bernardo*, *Rosshoden*, *Oberstafel*, *Ferpels* vallis *D. Nicolai*, *Gemmio* (SUTER). In ipso ponte *Diaboli* infra vallē *Ursariam*. In M. *Sempronio*, etc. - Perennis. Fl. Augusto.

G. 47. LUZULA Decand.

Cal. hexaphyllus, glumaceus, persistens. *Cor.* nulla. *Stamina* 6. *Stigmata* 5. *Caps.* trivalvis, unilocularis, trisperma. (*Folia* plana, plerumque pilosa.)

Analysis.

- | | |
|---|---|
| Folia plus minusve pilosa; vaginæ ad orificium pilosæ. — 1. | Folia cum vaginis glaberrima. Flores lutei, nitentes. — 18. |
| 1. Folia longa: floralia corymbum superantia. Flores nivi vel albidii, unicolores. — 2. | Folia breviora: floralia corymbum vix æquantia vel breviora. Flores nec nivi, nec albidii. — 5. |

2. Flores albidi, clausi ovato-oblongi; foliola calycina subæqualia. — 5. Flores nivei, clausi elongati; foliola calycina interna exterioribus fere duplo breviora. — 4.
3. *LUZULA albida*. Sp. 6.
4. *LUZULA nireæ*. Sp. 7.
5. Flores corymbosi, in pedunculis solitarii. — 6. Flores corymbosi vel spicati, conferti vel glomerati. — 11.
6. Corymbus decompositus, demum divaricatus. — 7. Corymbus pauciflorus, simpliciusculus, erectus. — 8.
7. *LUZULA pilosa*. Sp. 1.
8. Corymbus subcompositus, irregularis. Flores spadicei. Capsulæ ovato-acutæ. — 9. Corymbus plerumque simplicissimus, subumbellatus. Flores flavescentes. Capsulæ acuminatæ. — 10.
9. *LUZULA Forsteri*. Sp. 2.
10. *LUZULA flavescens*. Sp. 3.
11. Flores corymbosi; glomeruli pauciflori. — 12. Spicæ una pluresve multifloræ. — 15.
12. Folia lata, pilosa. Flores grandiusculi. Calyx capsulis longior. — 13. Folia angusta, glabriuscula. Flores minimi. Capsulæ calyce paulo longiores. — 14.
13. *LUZULA sylvatica*. Sp. 4.
14. *LUZULA spadicea*. Sp. 5.
15. Spicæ erectæ, distinctæ (2-9). Bractæ communes spicamul- toties breviores. Calyces marginæ alidi. — 16. Spica unica, composita, nutans. Bractæ communes spiculis fere longiores. Calyces atrofusci, unicolores. — 17.
16. *LUZULA campestris*. Sp. 8.
17. *LUZULA spicata*. Sp. 9.
18. *LUZULA lutea*. Sp. 10.

1. *LUZULA pilosa* N. — L. corymbo demum divaricato composito, floribus solitariis, capsulis obtusis. N. (Gall. *Jonc poileux*.)

Juncus Hall. *helv.* 1325. *Scheuchz. Gram.* 315.

J. pilosus Sut. *Fl. helv.* 1. p. 211.

~~~~~



*Luzula vernalis* Decand. *Fl. fr.* 1825.

*J. pilosus*. *L. Sp. pl.* 468. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 216.

*Smith brit.* 384. *Löisel. Fl. gall.* 211. *Pers. syn.*

1. p. 385.

*J. nemorosus* *Lam. Enc. méth.* 3. p. 273.

*J. luzulinus* *Vill. delph.* 2. p. 235.

~~~~~

J. pilosus *Leers herb.* 91. tab. 13. fig. 10. *Host Gram. austr.* 3. tab. 100 (*corymbo simpliciusculo, pedunculis tamen divaricatis capsulisque obtusis.*)

J. pilosus *Schleich. l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14.

J. vernalis *Ehrh. Gram. exs. Dec.* 11. n.^o 109.

Seringe l. c. p. 2. *Dec.* 1.

RADIX subrepens, stolonifera, dense cespitosa.

FOLIA radicalia fasciculata, culmo florente paulo breviora, 5-5 lineas lata, erectiuscula; culmea sensim sensimque breviora, subpatula, lanceolata. Omnia tenera, lineari-lanceolata, læte viridia, oris valde pilosa, apice calloso obtusiusculo. *Vaginæ* breves, tubulosæ, glabræ, ad orificium pilosissimæ.

CULMI erecti, foliosi, infra vaginas quasi articulati, spithamæi, pedales et sesquipedales, teretes, glaberrimi.

CORYMBUS patens, laxus, florens acutiusculus, multiflorus. *Rachis* brevissima. *Pedunculi* basi bracteato-pilosi: inferiores longissimi, sæpe corymbiferi, semel et bis ramosi, florentes erectiusculi, demum patuli et divaricati; ceteri gradatim breviores, pauciflori et uniflori. *Folium* corymbo subjectum unum alteramve, brevissime vaginans, pedunculis multo brevius.

FLORES spadicei, solitarii, distantes, terminales; nonnulli laterales vel subsessiles ad divisiones pedunculorum. *Bracteæ* florales duæ, subæquales, carinate, adpressæ, concavæ, scariosæ, ovatæ, apice sæpius emarginatæ, quandoque subciliatæ.

CALYCIS *foliola* subæqualia, ovato-lanceolata, acuta, sæpe mucronulata, nitida, fusca, uninervia, per florescentiam patentia, margine scarioso-albida.

CAPSULÆ calyce paulo breviores, trigonæ, ovatæ, obtusæ, mucronatæ, virescentes. *Semina* atrofusca, subrotunda, hinc convexa, inde planiuscula, membranula albida coronata. (D. v.)

In sylvis vulgatissima. — Perennis. Fl. Martio, Aprili et Majo.

2. *LUZULA Forsteri* Decand. — L. corymbo subcomposito irregulari erecto, floribus solitariis, capsulis acutis. N. (Gall. *Luzule de Forster.*)

Juncus Forsteri Smith brit. 1395 in add.

Luzula Forsteri Decand. syn. 1824.*

~~~~~

*J. Forsteri* Engl. bot. tab. 1293.

~~~~~

J. Forsteri Schleich. l. c. p. 16. Thom. l. c. p. 14.
Seringe l. c. p. 2. Dec. 1.

RADIX fibrosa, vix stolonifera.

CULMI filiformes, erecti, teretes, superne nudi, minusque foliosi quam in priori, trientales et pedales.

FOLIA angusta, vix ultra 2 lineas lata, plerumque duplo vel triplo angustiora, nervis exstantibus percursa, ceterum fere ut in priori. Sic *vaginæ*.

CORYMBUS sæpe compositus, quandoque simpliculus, irregularis, pedunculo nempe uno alterove inferiori ceteris multo longiore, omnibus etiam adultis erectis, nec unquam patulis, vel divaricatis.

FLORES solitarii, approximati, spadicei, nitidi.
Bracteæ florales ovato-acutæ.

CALYCIS *foliola* lanceolata, acuminata, longius mucronata.

CAPSULÆ acute triquetrae, ovatae, acutæ, mucronulatae, flavescentes, nitidæ, calyce paulo longiores.

SEMINA obsolete trigona, viridia, faciebus excavatis, membranula albida ancta. (D. v.)

In sylvis minime rara. Cl. CHAILLET in M. *Creux du Van* inventum misit. In sylva *Belini* prope *Lausannam*. J. GAX.
Etiam in sylvis *Juranis* et planitie hanc novam speciem, in hortis, mouente celeberr. SMITHIO immutatam, hinc inde observavimus. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

5. *LUZULA flavescent*. N. — L. corymbo umbellato erecto paucifloro, pedunculis subunifloris subæqualibus, capsulis acuminatis. N. (Gall. *Luzule jaunâtre*.)

Juncus flavescent Host *Gram. austr.* 3. tab. 94.

~~~~~  
J. *flavescent* Thom. l. c. p. 14.

RADIX articulata, squamosa, sæpe descendens, stolonifera.

CULMUS erectus, foliosus, 4-6 uncias altus.

FOLIA brevissima, vix ultra 2 lineas, plerumque lineam unam lata, ceterum fere ut in prioribus: radicalia patula, recurva; culmea erectiuscula.

**CORYMBUS** terminalis, umbellatus, plerumque simplicissimus, pauciflorus, adultus etiam erectus, *pedunculis* 4-6, unifloris (rarins divis 2- vel 5-floris), filiformibus, superne incrassatis, vix uncialibus, modice divergentibus, basi bracteatis. *Bracteæ* vaginantes, oblongæ, truncatæ, scariosæ, basi dilute ferrugineæ, ciliatæ.

**FLOS** in *rachi* brevi terminalis fere sessilis, minimus, abortivus *bracteas* duas habet florales, latas, breves, triangulares, acutas, aristatas, scariosas ciliatasque. *Flores* reliqui omnes pedunculati, pallidi; *bracteæ* ut in terminali, patentes, plerumque glaberrimæ.

**CALYCIS** *foliola* lanceolata, acutissima, breviter aristata, subæqualia, dilutissime ferruginea, marginibus albida, acute carinata, uninervia.

**CAPSULÆ** grandes, ovato-acuminatæ, acutæ, mucronatæ, flavicantes, nitidæ, calyce paulo longiores. *Semina* rugulosa, elliptica, subtrigona, faciebus modice excavatis, ceterum ut in prioribus. (D. v.)

In sylvis montium editiorum et in subalpinis. In *Valesia* circa *Solalex*, et *aux Frachis* supra *Bex* inventum misit Rever. MURITH. In M. Jura à la grande *Aîne* supra *Arsier* et alibi. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

**Obs.** Affinis utique prioribus; ab utraque tamen vere differre existimamus.

4. *LUZULA sylvatica* N. — L. corymbo decomposito laxo, floribus subteruis aristatis, calyce capsulam superante. N. (Gall. *Luzule des forets.*)

*Juncus* Hall. *helv.* 1524. *Scheuchz. Gram.* 317.

*Juncus maximus* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 211.

~~~~~

J. sylvaticus Smith *brit.* 388.

J. maximus Willd. *Sp. pl.* 2. p. 218. *Pers. syn.* 1. p. 385. *Loisel. Fl. gall.* 211.

Luzula maxima Decand. *Fl. fr.* 1826.

Juncus montanus Lam. *Enc. méth.* 3. p. 237.

J. pilosus Vill. *delph.* 2. p. 234.

J. pilosus & L. *Sp. pl.* 468.

~~~~~

*J. maximus* Host *Gram. austr.* 3. tab. 98. *Fl. dan-*  
*tab.* 441.

~~~~~

J. maximus Schleich. *l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14.
Seringe l. c. p. 2. *Dec.* 1.

RADIX transversa, lignosa, cespitosa.

FOLIA latissima generis, læte viridia, culmo breviora, lanceolata, sæpius in acumen lineare producta, apice calloso obtusiusculo.

CULMUS fere ut in *pilosa*, sed plerumque duplo triplove longior.

CORYMBUS decompositus vel supradecompositus, pedunculis numerosis, semel, bis vel ter corymbiferis, demum nutantibus. Bracteæ pedunculorum et florum ciliatæ, quandoque laceræ, demum griseæ.

FLORES spadicei, plerumque sessiles, bini, terni vel rarius quaterni; nonnulli etiam solitarii.

CALYCIS foliola subæqualia, atro-fusca, nitida, marginibus scariosis, breviter aristata: exteriora lanceolata, acuta: interiora paulo latiora et bre-

viora , ovata , apice obtuso , sæpe lacero vel refuso , brevius aristata.

CAPSULÆ trigonæ, obtusæ, calyce apud nos multo breviores. *Semina* membranula carent. (D. v.)

In sylvis montanis vulgaris. In M. Jura supra *Nevidunum*.
Au Creux du Van. Circa *Turicum*. Sur les *Eloges*. Au
mont de la Suze, etc. — Perennis. Fl. Junio et Julio.

5. *LUZULA spadicea* Decand. — L. foliis cul-
 meis subglabris, corymbo composito, floribus appo-
 ximalis mucronatis, capsulis subrotundis calycem
 superantibus. (Gall. *Luzule spadicee*.)

Juncus Hall. *helv.* 1326. *Scheuchz. Gram.* 312.

J. spadiceus Sut. *Fl. helv.* 1. p. 212.

~~~~~

*Luzula spadicca* Decand. *Fl. fr.* 1824.

*J. spadiceus* All. *sol. pedem.* 2083. *Vill. delph.* 2.  
 p. 236. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 218. *Pers. syn.* 1.  
 p. 385. *Loisel. Fl. gall.* 211.

*J. montanus* γ *Lam. Enc. méth.* 3. p. 273.

~~~~~

J. spadiceus Host *Gram. austr.* 3. tab. 96. *Vill. l. c.*
 tab. 6 bis. *Scheuchz. Prodr.* tab. 6.

~~~~~

*J. spadiceus* *Schleich. l. c.* 16. *Thom. l. c.* p. 14.  
*Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 1.

RADIX transversa , gracilis.

CULMI erecti , trientales vel fere pedales, foliosi.

FOLIA vix ultra 2 lineas lata, plerumque fere  
 duplo angustiora, brevia, acuta, apice minus quam  
 in prioribus conspicue calloso : radicalia quandoque  
 ciliata, culmea fere omnino glabra, subinde ad



marginem pilo uno alterove instructa. *Vaginæ* ad orificium pilosæ.

CORYMBUS parvus, erectus vel nutans, *pedunculis* modice divergentibus, inæqualibus, quandoque flexuosis, brevibus, corymbiferis, basi *bractea* oblonga pilosaque instructis. *Corymbi* partiales brevissimi, plerumque subsimplices.

FLORES minimi, patentes, lineam dimidiam vix superantes, approximati brevissimeque pedicellati ut fasciculos 5-5-flores efficiant. *Bracteæ* florales ovato-lanceolatae, concavae, inferne plus minusve coloratae, superne albidæ, ciliatae, acutiusculæ.

CALYCIS *foliola* plerumque atro-spadicea, ovato-lanceolata, brevia, latiuscula, in mucronem brevem producta: *interiora* sæpe quasi tricuspidata.

CAPSULÆ subrotundæ, obtusæ, mucronatæ, calycem æquantes vel parum superantes. *Semina* membranula carentia, minima. (D. v.)

In alpium pascuis editioribus nec in sylvis ut priores. In valle Schams. In M. Bernardino, Gotthardo, Furca, Javernaz, Prapiaz, Fouly, Pennino, Sempronio, etc. — Au Creux du Van. — Nonnunquam in valles alpibus subjectas descendit mutatoque solo natali habitum mutat ut culmi sæpius cubitales evadant, nec tamen magnitudo proportione florum et capsularum immutentur. V. g. in valle Champé supra Octodurum. J. GAY. — Perennis. Fl. Julio et Aug.

6. *LUZULA albida* Decand. — L. folio corymbum decompositum laxum superante, floribus subternis ovatis muticis, foliolis calycinis subæqualibus. N. (Gall. *Luzule blanchâtre*.)

*Juncus Hall. helv.* 1327. *Scheuchz. Gram.* 318. *J. albidus Sut. Fl. helv.* 1. p. 213.



*Luzula albida Decand. Fl. fr.* 1822.

*Juneus albidus Hoffmann germ.* 1. ed. 1. p. 126.  
*Willd. Sp. pl.* 2. p. 219. *Pers. syn.* 1. p. 286.  
*Loisel. Fl. gall.* 211.

*J. luzuloides Lam. Enc. méth.* 3. p. 272.

*J. pilosus L. Sp. pl.* 468.



*J. albidus Hoffm. l. c.* tab. 6. *Host Gram. austr.* 3. tab. 95. *J. niveus Leers herb.* 91. tab. 13. fig. 9.



*J. albidus Schleich. l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14.  
*Seringe l. c.* 2. *Dec.* 1.

**RADIX** teres, subrepens, stolonifera.

**FOLIA** læte viridia, 1-5 lineas lata, duplo triplove longiora quam priorum (semipedalia et trientalia), erectiuscula, superne subito in acumen lineare canaliculatum attenuata, acuta, apice vix callosa, marginibus copiose pilosis. *Vaginæ* tubulosæ, totæ virides, breves, ad orificium valde pilosæ.

**CULMUS** erectus, fere sesquipedalis, foliis internodio longioribus instructi.

**CORYMBUS** subsupradecompositus, laxis, erectus, pedunculis elongatis, semel vel bis corymbiferis, demum divaricatis. *Folium* florale unum alterumve erectum, angustissimum: maximum corymbo plerumque longius. *Bracteæ* pedunculorum pilosæ.

**FLORES** fasciculati, terni vel quaterni, sessiles vel brevissime pedicellati, sordide albi, ovato-oblongi.

*Bracteæ* florales oculo nudo vix conspicuæ, albidæ, ovatæ, obsolete ciliatæ, sæpe laceræ.

CALYCIS *foliola* unicoloria, ovato-lanceolata, acuta, mutica: *exteriora* carinata; *interna* paulo longiora, plana. *Antheræ* aurantiacæ.

CAPSULÆ trigonæ, ovatæ, mucronatæ, calyce multo breviores, demum atro-spadiceæ. (D. s.)

In sylvis submontanis vulgo. In M. *Uetliaco*, *Bernæ* etc.  
In pago *Vaudensi* paulo rarius, v. g. *Lausannæ* in sylva *Belini*, prope *Bex*, etc. — Fl. Junio et Julio.

7. *LUZULA nivea* Decand.—L. folio corymbum fasciculatum superante, floribus subternis elongatis muticis, foliolis calycinis valde inæqualibus. N. (Gall. *Luzule blanc de neige*.)

*Juncus* Hall. *helv.* 1328. *Scheuchz. Gram.* 320.

*J. niveus* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 213.

~~~~~

Luzula nivea Decand *Fl. fr.* 1821.

J. niveus L. *Sp. pl.* 468. Willd. *Sp. pl.* 2. p. 220.

Lam. Enc. méth. 3. p. 272. *Vill. delph.* 2. p. 241.

Pers. syn. 1. p. 386. *Loisel. Fl. gall.* 212.

~~~~~

*Scheuchz. l. c.* tab. 7. fig. 7. *Moris. sect.* 8. tab. 9. fig. 39.

~~~~~

Schleich. l. c. p. 16. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 1.

RADICE, CULMO FOLIISQUE vix a priori distinguenda.

CORYMBUS minus divisus, quasi umbellatus, corymbis partialibus approximatis et fere fasciculatis, folio florali plerumque multo brevioribus.

FLORES approximati, terni quaternive, sessiles vel breviter pedicellati, elongati (clausi ultra 2 lineas longi), elliptici, nitidi, vere nivei. *Bracteæ* florales parvæ, appressæ, integræ, glabræ; pedicellorum et pedunculorum ciliatæ pilosæque.

CALYCIS *foliola* unicoloria, nitida; *exteriora* carinata, fere ovata, obtusiuscula; *interiora* latiora duploque longiora, plana, acutiora. *Antheræ* albidæ.

CAPSULÆ trigonæ, ovatæ, mucronatæ, foliolis calycinis multo breviores. (D. v.)

In sylvis præcipue planitiei. In *Rhætia* non rara; ad *Viam-malam*. Circa thermas *Fabarias*. In *Aquilejensibus*. Prope *Gingins*. In sylva *Allamand* copiose. Ascendit etiam in alpes: infra *Wasen*; in M. *Gotthardo*, *Speluga*, *Grimsula*, etc. Fl. Junio et Julio.

Obs. Exemplum in M. *Grimsula* a viro amicissimo SERINGE lecta possideo. Flores habent minus elongatos, vel latiores sordidiusque albos, foliola calycina autem valde inæqualia. Capsulæ desunt.

8. *LUZULA campestris* Decand. — L. foliis subpilis, spicis subumbellatis pedunculatis sessilibusque, capsulis obtusis calyce brevioribus. N. (Gall. *Luzule champêtre*.)

Juncus *Hall. helv.* 1330. *Scheuchz. Gram.* 310 et 312. *J. campestris* *Sut. Fl. helv.* 1. p. 213.

~~~~~

*Luzula campestris* *Decand. Fl. fr.* 1827.

*J. campestris* *L. Sp. pl.* 468. *Smith brit.* 385. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 210. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 273. *Lois. Fl. Gall.* 212. *Pers. syn.* 386. *Vill. delph.* 2. p. 237.

~~~~~

J. nemorosus Host *Gram. austr.* 3. tab. 97. *J. campestris* Leers *herb.* 92. tab. 13. fig. 5.

~~~~~

*J. campestris* Ehrh. *Gram. exs. Dec.* 7. n.° 67. *Schleich. l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 1.

β. *Alpina*, spicis capitatis, nigrioribus.

*J. sudeticus* Willd. *Sp. pl.* p. 210? *Pers. syn.* 1. p. 386?

~~~~~

J. spicatus Krock. *sil.* 1. p. 572. tab. 52?

J. sudeticus *Schleich. l. c.* p. 16. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 1.

RADIX transversa, dense cespitosa.

CULMI erecti, graciles, 6-8-unciales, pedales, foliosi.

FOLIA lineam unam duasve lata, obtusiuscula, apice callosa, marginibus pilis plus minusve copiosis hirsuta, superne recurva, subpatentia: *radicalia* numerosa, fasciculata, cespitosa, culmo multo breviora; *culmea* internodiis in planta adulta breviora.

SPICÆ 5-9, ovatae, breves, in β subrotundæ, laxiusculæ, imbricatæ, in corymbum umbellatum dispositæ, pedunculatæ: intermedia in centro corymbi sessilibus. *Pedunculi* valde inæquales, bracteati. *Folia* floralia duo corymbo fere æqualia vel breviora, superne canaliculata et in acumen durum callosumque producta. *Bractea* communis ad spicarum basin nulla.

FLORES in spica subsessiles, atro-fusci. *Bractea* exterior ovata, concava, scariosa, ciliata, acuta,

floribus brevior : florales valde inæquales, glabræ : major ovato-lanceolata, inferne spadicea, ceterum albida.

CALYCIS *foliola* lanceolata, atro-fusca, margine albida, fere æqualia : *exteriora* carinata, breviter aristata, *interna* paulo latiora, planiuscula, mucronulata. In β omnia paulo obtusiora, mucronata.

CAPSULÆ obtusæ, trigonæ, subrotundæ, fere muticæ, foliolis calycinis paulo breviores; in β calycem fere æquantes. *Semina* obscurius angulosa, rotundata, nec coronata. (D. v.)

Ubique in pratis, sylvis, etc. Ascendit etiam in Alpes et tunc sæpe culmos habet proceriores, folia minus pilosa, spicas magis numerosas, rotundiores, nigriores, etc. — Perennis. Fl. Aprili et Majo.

9. *LUZULA spicata* Decand. — *L. spica* composita subterete nutante, bracteis aristatis spica pariali longioribus, capsulis calycem subæquantibus. N. (*Luzule en épi.*)

Juncus Hall. helv. 1330 7. *Juncus spicatus Sut. Fl. helv.* 1. p. 213.

~~~~~

*Luzula spicata Decand. Fl. fr.* 1828.

*Juncus spicatus L. Sp. pl.* 469? *Smith brit.* 386? *Willd. Sp. pl.* 2. p. 221. *Lam. Enc. méth.* 3. p. 274. *Vill. delph.* 2 p. 239. *Pers. syn.* 1. p. 386? *Loisel. Fl. gall.* 212.

~~~~~

Fl. lapp. tab. 10. fig. 4? *Fl. dan. tab.* 270?

~~~~~

*J. spicatus Schleich. l. c.* p. 16. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe l. c.* p. 2. *Dec.* 1.



**RADIX** transversa, subrepens, parum cespitosa.

**CULMUS** semipedalis, foliosus, erectus, superne cum spica demum nutans.

**FOLIA** brevissima, vix ultra lineam unam lata, plerumque duplo angustiora, plana, superne acuminato-canaliculata, apice callosa, obtusiuscula, juniora margine pilosa, demum glabrata. *Vaginæ* orificio pilosæ.

**RACEMUS** spicatus, terminalis, nutans, solitarius, 5-12 lineas longus, irregulariter cylindricus, obtusus, spicis partialibus numerosis, sessilibus, confertis, inferne laxioribus, lobos plus minusve conspicuos efficientibus. *Rachis* inferne parte qua spica nutat hinc nuda ut ibi spicæ partiales quasi secundæ sint. *Folium* florale erectum, longitudine variabili, spicam subinde superans. *Bracteæ* ad basin spicarum partialium latæ, amplæ, ovato-lanceolatæ, fuscæ, marginibus copiose ciliatæ, acutissimæ, in acumen aristiforme, longum, incanum, debile, spicas partiales sæpius superans desinentes.

**FLORES** minimi, clausi vix ultra  $\frac{2}{3}$  lineæ longi, atro-fusci. *Bracteæ* florales parvæ, acutæ, subaristatæ, ceterum fere ut reliquæ.

**CALYCIS** *foliola* subæqualia, unicoloria, atro-fusca, nilentia, oblonga, angusta, in aristam brevem producta: *exteriora* acute carinata; *interna* plana. *Stigmata* «sessilia.» VILLARS.

**CAPSULÆ** subrotundæ, obsolete trigonæ, obtusissimæ, omnino muticæ, calyce vix breviores. *Semina* tria, dorso acute angulosa. (D. v.)

In pascuis humidiusculis alpinum non rara. In *M. Sempronio*, *Gotthardo*, *Pennino*, etc. Etiam in *Jura*, nempe in *M. Warne* infra rupem *M. Delaz.* — Perennis. Fl. Junio, Julio et Augusto.

*Obs.* Planta nostra, ut jam jam summus *HALLERUS* suspicatus est, a septentrionali linuxana utique capsulis obtusissimis, nec, ut perhibet *Cl. SMITH*, acutis vere differre videtur. Nec cum *pediformi* Vill. neque cum *sudetico* Willd. ut vult amicissimus *SUTERUS* confundi debet.

10. *LUZULA lutea* Decand. — *L.* foliis vaginisque glaberrimis, spicis pedunculatis laxiusculis subcorymbosis, floribus muticis. N. (Gall. *Luzule dorée*.)

*Juncus Hall. helv.* 1329. *Scheuchz. Gram.* 314.

*J. luteus Sut. Fl. helv.* 1. p. 212.

~~~~~

Luzula lutea Decand. Fl. fr. n.º 1823.

Juncus luteus All. Fl. pedem. 2085. *Willd. Sp. pl.*

2. p. 218. *Vill. delph.* 2. p. 235. *Lam. Enc. méth.*

3. p. 271. *Pers. syn.* 1. p. 386. *Loisel. Fl. gall.*

212.

J. campestris L. Sp. pl. 469.

~~~~~

*J. luteus Vill. l. c. tab.* 6. bis.

~~~~~

J. luteus Schleich. l. c. p. 16. *Thom. l. c. p.* 14.

Seringe l. c. p. 2. *Dec.* 1.

RADIX repens, articulata, squamosa, longa.

CULMI erecti, 4-8-unciales, foliosi.

FOLIA erecta, glaberrima, plana, brevica (internodiis tamen subinde longiora): inferiora et radicalia in acumen teretiusculum et canaliculatum producta. *Vaginæ* etiam glaberrimæ.


CORYMBUS erectus, plerumque subconfertus, apicis nonnullis pedunculatis, subcorymbosis, laxiusculis, subrotundis constans. *Pedunculi* basi bracteati, erecti, vix divergentes, intermediis brevissimis, quandoque subnulli. *Bracteæ* pedunculorum scariosæ elongatæ, glabræ, apice laceræ. *Polium* florale vaginans, corymbo multo brevius, sæpe bracteiforme et scariosum.

FLORES breviter pedicellati, subconferti, erecti, lutei, nitentes: clausi ovati. *Bracteæ* florales, glabræ, valde inæquales, luteæ, inferne nonnunquam spadiceæ: *exterior* acuta; *interior* obtusa, multo latior, lacera.

CALYCIS *foliola* inæqualia, ovata, obtusa, mucronata, unicoloria: *exteriora* carinato-concava, retusa, et sæpe quasi tricuspidata; *interna* latiora longioraque, integra, planiuscula. *Stylus* brevissimus.

CAPSULÆ parvæ, calyce breviores, subrotundæ, trigonæ, obtuse mucronatæ. (D. v.)

Hab. in alpium editiorum pascuis. In *M. Avicula*, prope *Viam-malam*, in *M. Javernaz*, *Cl aux-commun*, *Fouly*, *Valorsine*, *Pennino*, *Sempronio*, *Catogne*, *Cols du Bonhomme*, *de la Seigne*, *de Balme*, etc. — Perennis, Fl. Julio et Augusto.



G. 48. TRIGLOCHIN L.

Cal. 6-phyllus; *foliola* 5 superiora cum 3 inferioribus alternantia, decidua. *Cor.* nulla. *Stamina* 6, foliolis calycinis opposita. *Styli* nulli. *Stigmata* 5, radiantia. *Caps.* basi dehiscens.

1. *TRIGLOCHIN palustre* L. — Tr. capsulis trilocularibus lævibus linearibus basi attenuatis. Willd. (*Gall. Troscart des marais.*)

Triglochin Hall. helv. 1308. Tr. palustra *Sut. Fl. helv.* 1. p. 219.

~~~~~  
[ *Triglochin palustre* L. *Sp. pl.* 482. *Smith brit.* 398. *Willd. Sp. pl.* 2. p. 264. *Pers. syn.* 1. p. 396. *Loisel. Fl. gall.* 217. *Decand. Fl. fr.* 1892. *Poir. Enc. méth.* 8. tab. 89. *Vill. delph.* 2. p. 228. *Krock. sil.* 1. p. 590.

~~~~~  
Tr. palustre *Sturm Fl. germ.* 1. fasc. 13. *Fl. dan.* tab. 490. *Leers herb.* 93. tab. 12. fig. 5.

~~~~~  
[ Tr. palustre *Ehrh. Gram. exs. Dec.* 12. n.º 119. *Schleich. l. c.* p. 26. *Thom. l. c.* p. 14. *Seringe. l. c.* p. 10.

RADIX collo incrassata et sæpe quasi bulbosa, fibris multis longissimisque stipata, præterea vilicenos nonnullos longos, tenuissimos, squamosos, articulatos eximieque repentes emittit.

CAULIS solitarius, enodis, pedalis, sesquipedalis, erectus, nonnisi inferne versus radicem foliosus, simplicissimus, gracilis.

FOLIA erecta vel recurva, angustissima, semicylindrica, facie canaliculata: radicalia fasciculata. *Vaginæ* breves, lissæ, ad margines albidæ vel subcoloratæ.

RACEMUS subspicatus, longissimus, strictus, multiflorus. *Pedunculi* solitarii, parum distantes, appressi, 1-2 lineas longi, uniflori. *Bracteæ* nullæ.

FLORES parvi, viriduli, numerosi. CALYCIS *foliola* duplicis ordinis: *inferiora* seu *exteriora* paulo majora, viridia, quandoque purpurascentia, patentia, subrotunda; *superiora* vel *interiora* erecto-patentia, etiam concava, ovata, obtusa, plus minusve colorata, etiam decidua. *Stamina* foliolis opposita, calyce breviora: *filamenta* brevissima, subnulla. *Antheræ* flavæ, didymæ, magnæ.

CAPSULÆ triloculares, trispermæ, lineares, graciles, basi attenuatæ, longæ, appressæ, valvis tribus inferne dehiscentibus tuncque triplicem hamum (unde nomen generi) efficientibus. *Semina* longa, acute triquetra, linearia, inferne attenuata. (D. v.)

In palustribus minime rarum. Circa *Nevidunum*, etc. —  
Pereunis. Fl. Majo et Junio.



## G. 49. TOFIELDIA Huds.

*Perigonium* hexaphyllum, basi involucreatum, persistens: *involucrum* subtriphyllum, minimum. *Stamina* 6. *Pistilla* 5. *Stigm.* subsessilia. *Caps.* 5, appressæ, polyspermæ.

1. *TOFIELDIA palustris* Huds.—T. foliis planis ensiformibus, cespitibus basi compresso-complanatis. N. (Gall. *Tofieldie des marais.*)

*Anthericum Hall helv.* 1205. *Anthericum calyculatum Sut. Fl. helv.* 1. p. 202.

~~~~~

Anthericum calyculatum L. Sp. pl. 447.

Tofieldia palustris Smith brit. 397. *Decand. Fl. fr.* 1891. *Pers. syn.* 2. p. 399.

Helonias borealis Willd. Sp. pl. 2. p. 274.

Narthecium calyculatum Poir. Enc. méth. 4. p. 431.

N. iridifolium Vill. delph. 2. p. 225.

Scheuchzeria Pseudo-asphodelus Scop. carn. 1. p. 322.

~~~~~

*Anth. calyculatum Fl. dan.* tab. 36.

~~~~~

Tofieldia palustris Seringe l. c. p. 10. *Helonias borealis Schleich. l. c.* p. 14.

RADIX fibrosa, albida, cespitosa.

FOLIA *fasciculorum* cespites basi complanatos efflicentia, lateraliter vaginantia, seseque mutuo amplectentia; ceterum plana, ensiformia, nervosa, acutissima, erecta, dura, lævissima, 1-4 lineas lata. *Caulina* pauca, minora, etiam lateraliter vaginantia.

CAULES teretes , pedales , cubitales , (quandoque pygmaei) , foliis multo longiores , erecti , simplicissimi , parum foliosi.

RACEMUS spicaeus , uncialis , biuncialis , teres , densus , basi quandoque interruptus.

FLORES solitarii , approximati , flavescentes , brevissime pedicellati , vix tres lineas lati. *Pedicelli* ad basin *bracteola* acutiuscula suffulti.

INVOLUCRUM 2-5phyllum , squamis calyciformibus subrotundis , viridibus , margine sæpius purascentibus , perigonio multoties minora.

PERIGONII *foliola* ovato-lanceolata , subpatentia , sublatea , acutiuscula , quandoque mucronulata , persistentia , staminibus paulo breviora.

STAMINA 6 , foliolis opposita , ut perigonium rectius calycem quam corollam dicas.

PISTILLA tria. *Styli* brevissimi , persistentes. *Stigmata* parva , brevissime pubescentia.

CAPSULÆ tres , virides , basi connatæ , appressæ , polyspermæ. *Semina* subrotunda , fusca , minima. (D. v.)

Hab. locis paludosis , præcipue montanis , vulgo. In pagis *Tigurino* , *Bernensi* , *Vaudensi* , etc. *Neviduni au bois de Prangins*. In alpes etiam ascendit. — Perennis. Fl. Junio , Julio et Augusto.

Obs. Planta alpina flores nonnunquam habet capitatos nec racemosos.



G. 50. SCHEUCHZERIA L. *)

Perigonium basi nudum 6-phyllum, simplex, deciduum. *Stamina* 6. *Pistilla* 3, 4, 5, 6. *Stigmata* sessilia. *Caps.* totidem, subinflatae, acuminatae, polyspermæ.

1. SCHEUCHZERIA *palustris* L. — Sch. foliis canaliculatis setaceis, racemo erecto paucifloro. (Gall. *Scheuchzère des marais.*)

Scheuchzeria Hall. helv. 1310. Sch. *palustris* Sut. *Fl. helv.* 1. p. 211. *Scheuchz. Gram.* 336.

~~~~~

*Scheuchzeria palustris* L. *Sp. pl.* 482. *Decand. Fl. fr.* 1891. *Pers. syn.* 1. p. 396. *Loisel. Fl. gall.* 217. *Poir. Enc. méth.* 6. p. 729. *Vill. delph.* 2. p. 227.

~~~~~

Sch. *palustris* *Fl. dan.* tab. 76. L. *Fl. lapp.* tab. 10: fig. 1. *Lam. illustr. gen.* tab. 268.

~~~~~

Sch. *palustris* *Schleich. l. c.* p. 23. *Thom. l. c.* p. 11.

RADIX transversa, albida, fibrosa, squamis multis veterum foliorum vaginarumque reliquiis superne lecta:

CAULIS erectus, simplex, 4-8 uncias longus, crassiusculus, subteres, striatus, foliosus, ad basin

---

\*) « SCHEUCHZERIA est graminea et alpina, a celebri isto fratre pari, quorum alter in Graminibus, alter in Alpibus plantis excellit. » L. *crit. bot.* § 258.

vaginarum articulatus, ad genicula plerumque flexuoso-infractus.

FOLIA pauca, semicylindrica, dorso convexa, facie canaliculata, brevia, angustissima. *Vaginae* foliis breviores, plerumque à caule solutæ et in eodem plano ac folia sitæ, amplæ, marginibus scarioræ, basi subventricosæ, superne angustatæ, ex viridi albidae.

RACEMUS paniciflorus (5-10 floribus constans), erectus, sæpe flexuosus. *Pedunculi* uniflori, erecto-patentes, plerumque solitarii, distantes, rarius subumbellati. *Foliola* floralia ima pedunculo multo longiora, foliis consimilia sed minora; *bractee* ad basin pedunculorum superiorum aristatæ vel aphyllæ: superiores pedunculo multo breviores.

FLORES distantes, 4-5 lineas lati.

PERIGONI foliola ex luteo viridia, lanceolata, acuta, angusta. *Stamina* 6; *filamenta* brevia; *antheræ* angustæ, longissimæ, erectæ.

CAPSULÆ 5-6, distinctæ nec appressæ, inflatæ, modice tamen compressæ, acuminatæ, apice incurvo-rostratæ, grandiusculæ, polyspermæ, bivalves. *Semina* 2-5, parva. Capsulam nunquam monospermam invenimus. (D. v.)

In paludibus torfaceis montanis vel subalpinis, rarissima. *Mühlhusiae* HOFER, et circa *Einstedlen* nec non ad M. *Pilati* lacum BURSERUS olim viderunt, sed nemo post eos. Ad lacum *Felinum*. SCHEUCHZERUS. Nec ibi ut diu creditum est interit; nam denuo ab amiciss. AER. THOMAS et Cl. REMERO observata fuit. *Aux marais de la plaine des Mosses, entre Château-d'Oex et les Ormonds*. SAMUEL BRIDEL. Viro præeunte celeberrimo plantam raram eodem

loco frequentem plus semel invenimus. Dicitur etiam ad lacum prope *Châtel-St.-Denis* provenire. In paludibus torfaceis ad lacum *des Rousses*, licet ab illustris. De SAUSURE indicatam, sollicitè quæsitam invenire non potuimus. — Perennis. Fl. Majo et Junio ; Julio capsulas maturas profert.



# CONSPECTUS GENERUM SPECIERUMQUE.

## GRAMINEÆ.



### § I. UNIFLORÆ.

#### A. Hermaphroditæ.

##### I. Calyx nullus.

##### Genus I. NARDUS.


*Spiculæ* sessiles, spicatæ. *Cal.* o.  
*Cor.* bivalvis, gluma exterior apice  
breviter aristata. *Stigma* unicum,  
simplex.

1. *NARDUS stricta* L.—N. spica setacea recta  
secunda.

##### G. 2. LEERSIA.

*Cal.* o. *Cor.* 2-valvis, clausa, mutica.

1. *LEERSIA oryzoides* Willd. — L. paniculis  
vaginatis.



2. Corolla univalvis (nec priorum  
notæ).

##### G. 5. ALOPECURUS.

*Cal.* bivalvis, *valvulis* subæqua-  
libus, concavis, carinatis. *Cor.* uni-  
valvis, plerumque aristata.


1. *ALOPECURUS geniculatus* L. — Al. culmo geniculato, panicula spiciformi cylindrica, valvulis liberis obtusis carina pubescentibus.
2. *ALOPECURUS agrestis* L. — Al. culmo erecto scabriusculo, panicula spicata simplici glabra, valvulis basi connatis.
3. *ALOPECURUS pratensis* L. — Al. culmo erecto lævi, panicula spiciformi lobata crassa villosa, valvulis basi connatis.
4. *ALOPECURUS utriculatus* Schrad. — Al. vagina suprema vesiculari, panicula ovata, valvularum liberarum carina basi marginata.

## G. 4. KNAPPPIA.

*Cal.* 2-valvis, obtusus, muticus.

*Cor.* univalvis, truncata, hirsuta, mutica. (*Flores* in rachi flexuosa alterni, sessiles.)

- a. *KNAPPPIA agrostidea* Sm. — Kn. racemo spicato filiformi, spiculis ellipticis retusis muticis.



5. *Cor.* vel *cal.* 3-4-valvis (nec priorum).

## G. 5. PANICUM.

*Cal.* 5-valvis (vel 4-valvis), val-



vula tertia minima ad basin dorsalem alterius posita. *Cor.* bivalvis, persistens, cartilaginea, semen corticans.

\* Panicula spicata, vix interrupta.

1. *PANICUM verticillatum* L. — *P.* panicula spiciformi subverticillata, involu-cellis aristiformibus retrorsum scabris.
2. *PANICUM glaucum* L. — *P.* panicula spicata cylindrica, calyce 4-valvi, seminibus transverse undulato-rugosis.

5. *PANICUM viride* L. — *P.* panicula spicata sublobata subcylindrica, valvulis ternis, seminibus minutissime muricatis.

$\beta$  majus. — *P.* panicula spiciformi dense lobata, involucris multisetis longissimis, rachi pedunculis pilosis.

4. *PANICUM italicum* L. — *P.* panicula spiciformi lobata, rachi tomentoso-villosa, involucris subbisetis.

\* Racemi spicati, subdigitati.

5. *PANICUM sanguinale* L. — *P.* racemis subdigitatis basi inferiore glabris, spiculis ellipticis, valvulis valde inæqualibus.

6. *PANICUM glabrum* N. — *P.* racemis spicatis subgeminis, basi interne nodosis, spiculis ovatis, valvulis subæqualibus.

7. *PANICUM ciliare* Retz. — *P.* racemis spicatis subdigitatis, valvulis inæqualibus :

externa nervis lateralibus ciliatis, vaginis punctato-villosis.

\*\*\* Panicula perfecta.

8. *PANICUM miliaceum* L. — *P. panicula* laxa flaccida, vaginis hirtis, valvulis mucronatis.

\*\*\*\* Panicula decomposita, racemospicata.

9. *PANICUM Crus-galli* L. — *P. racemis* spicatis alternis conjugatisque subdivisis, calycibus subaristatis hispidis, rachi subquinguangulari.

\*\*\*\*\* Racemus spicatus, compositus, interruptus.

10. *PANICUM undulatifolium* Ard. — *P. fasciculis* subdenis, rachi pilosissima, valvulis subaristatis glabris subciliatis, foliis ovato-acuminatis undulatis.

#### G. 6. PHALARIS.

*Cal.* 2-valvis, valvulis subæqualibus, *cor.* duplicem (4-valvem) includentibus. *Semen* corolla interiori corticatum.

1. *PHALARIS arundinacea* L. — *Ph. spiculis* paniculatis, corolla exteriori penicilliformi, interiori nitente.
2. *PHALARIS canariensis* L. — *Ph. panicula* spicata ovata, valvulis navicularibus

marginē arcuato superne truncato,  
vagina suprema vesiculari.

~~~~~

4. Calyx corollaque bivalvis.

G. 7. DIGITARIA.

Cal. valvulis patulis, lanceolato-linearibus. *Cor.* calyce major, gluma ext. compresso-carinata. *Semen* corolla corticatum. (*Racemi* spicati, *digitati.*)

1. DIGITARIA *Dactylon* Schrad. —

G. 8. PHLEUM.

Cal. valvulis æqualibus, mucronato-aristatis apice sæpius divergentibus, carinatis, margine membranaceo superne plerumque truncato, corollam includentibus. *Semen* liberum. (*Panicula* spiciformis.)

1. PHLEUM *pratense* L. — Phl. panicula spicata cylindrica, valvulis carina ciliatis, arista multo longioribus.

β nodosum.

2. PHLEUM *alpinum* L. — Ph. panicula spicata ovato-cylindrica, valvulis carina ciliatis, aristam extrorsum ciliatam subæquantibus.

3. PHLEUM *commutatum* N. — Phl. panicula

spicata abbreviata, valvulis carina ciliatis aristam nudiusculam æquantibus, vagina suprema ventricosa *).

4. *PHILEUM asperum* Vill. — Phil. panicula spiciformi lobata cylindrica, valvulis nudis superne incrassatis, culmo ramoso.

5. *PHILEUM phalaroides* Kœl. — Phil. panicula spiciformi lobata subcylindrica, valvulis lanceolatis subciliatis, margine apice subtruncato.

6. *PHILEUM hirsutum* Sut. — Phil. panicula spiciformi laxius lobata, valvulis lanceolatis carina ciliato-hirsutis brevissime aristatis.

G. 9. ANTHOXANTHUM.

Cal. valvulis valde inæqualibus.

Cor. gluma utraque aristata! *Stamina* duo. *Squamæ* duæ inter corollam, magnæ.

1. *ANTHOXANTHUM odoratum* L. — Anth. panicula spiciformi ovato-oblonga.

G. 10. STIPA.

Cal. valvulis subæqualibus, apice aristatis vel aristiformibus. *Gluma* ext. *arista* terminali, basi articulato-nodosa, longissima.

*) *Phil. Gerardi* PANZER in Sturm, Fl. germ. fasc. 29, tab. 1, utique ad nostram *commutatum* pertinet.

1. *STIPA capillata* L. — St. aristis nudis demum curvatis.
2. *STIPA pennata* L. — St. aristis plumosis. *)

G. 11. TRAGUS.

Cal. valvula ext. nervis muricatis armata : interior minima (vix nisi lentis ope conspicua), inermis. *Glumæ* subæquales, valvula ext. breviores.

1. *TRAGUS racemosus* Desf. — Tr. panicula spicato-racemosa.

G. 12. MILIUM.

Cal. valvulis subæqualibus, ventricosis, concavis. *Cor.* calyce minor, cartilaginea, *semen* corticans, persistens.

1. *MILIUM effusum* L. — M. spiculis paniculatis, muticis.
 β confertum.

2. *MILIUM lendigerum* L. — M. panicula spiciformi, calycibus acuminato-elongatis nitidis basi ventricosa.

G. 15. AGROSTIS.

Cal. valvulis acuminatis, subinnerviis, demum patentibus. *Cor.* ca-

*) Pulchram plantam in colle gypsaceo, la Plâtrière, inter Sideram et Sedunum hoc anno (1811) inveni. Fl. Majo nec usque priori diximus Julio et Augusto.

lyce minor, scariosa, decidua. *Semen* liberum.

* *Aristatæ.*

3. *AGROSTIS rupestris* Willd. — Agr. foliis setaceis, gluma exteriori basi aristata, apice breviter biaristata, pedunculis scabris.
 β filiformis.
 γ aurata.
2. *AGROSTIS alpina* Willd. — Agr. foliis setaceis, gluma exteriori dorso aristata, apice binucronulata, pedunculis lævibus.
3. *AGROSTIS canina* L. — Agr. foliis culmeis inferioribus fasciculatis setaceis, spiculis ovato-acutis, valvulis inæqualibus, arista dorsali.
4. *AGROSTIS hybrida* N. — Agr. culmo basi ramoso, foliis inferioribus angustissimis, spiculis oblongis, valvulis subæqualibus, arista dorsali.
5. *AGROSTIS Spica-venti* L. — Agr. gluma exteriori infra apicem longissime aristata, arista longissima recta, panicula patula multiflora.
6. *AGROSTIS interrupta* L. — Agr. gluma exteriori infra apicem longissime aristata, panicula attenuata coarctata stricta subinterrupta.

7. *AGROSTIS purpurea* N. — Agr. gluma exteriori infra apicem longissime aristata, panicula patula pauciflora, spiculis sparsis.
8. *AGROSTIS Calamagrostis* L. — Agr. gluma exteriori tota villosa, arista terminali tortili, culmo subramoso.
9. *AGROSTIS arundinacea* L. — Agr. corolla basi penicillo pilorum pedicellato stipata, arista dorsali valvulis duplo longiore.
- * * Muticæ.
10. *AGROSTIS pilosa* Schlecht. — Agr. culmis erectiusculis, valvulis lineari-lanceolatis, corolla pilis fasciculatis spicula duplo brevioribus cincta.
- β aristata.
11. *AGROSTIS alba* L. — Agr. culmo basi repente, ligula oblonga, panicula laxiuscula, spiculis ovato-lanceolatis, pedunculis scabris.
12. *AGROSTIS decumbens* Hall. fil. — Agr. culmo repente subramoso, ligula oblonga, panicula desiccatione contractiori, spiculis lanceolatis, pedunculis scabris.
15. *AGROSTIS patula* N. — Agr. culmo infracto, ligula oblonga, spiculis ovato-lanceolatis, pedunculis divaricatis scabris, basi nodosis.

14. *AGROSTIS gigantea* Roth. — Agr. culmo erecto, ligula elongata, spiculis lanceolatis, panicula ampla, pedunculis scabris, basi nodosis.

15. *AGROSTIS vulgaris* With. — Agr. culmo erectiusculo, ligula brevi truncata, panicula trichotoma, spiculis ovatis, pedunculis læviusculis,

β tenella.

γ pumila.

*** Dubia.

16. *AGROSTIS vinealis* Sut. — Agr. panicula sparsa, arista spiculam superante.

G. 14. ARUNDO.

Cal. valvulæ elongatæ, demum patentes. *Cor.* glabræ basis pilis copiosis, calycem fere æquantibus persistentibusque cineta.

* Multifloræ.

1. *ARUNDO Donax* L. — Ar. calycibus subtrifloris corollam æquantibus, panicula diffusa, culmo basi lignoso.

2. *ARUNDO Phragmites* L. — Ar. calycibus subquinquefloris, corollis valvulas superantibus, panicula laxa, culmo herbaceo.

** Unifloræ.

3. *ARUNDO montana* N. — Ar. spiculis ovato-

acutis, corolla basi aristata, pilis hinc penicillatis, arista geniculata exserta.

β Pseudo-arundinacea.

4. ARUNDO *epigejos* L. — Ar. valvulis elongato-linearibus, spicalis imbricato-congestis, arista dorsali pilis breviori.

5. ARUNDO *Pseudo-phragmites* Hall. fil. — Ar. panicula laxiuscula, spiculis subsecundis, valvulis elongato-linearibus, arista terminali calycem æquant'e.

6. ARUNDO *halleriana* N. — Ar. panicula diffusa, spiculis subsparsis, valvulis lanceolatis, arista dorsali brevi.

7. ARUNDO *Calamagrostis* L. — Ar. panicula diffusa, spiculis subsparsis, valvulis lanceolatis, arista terminali exigua lævi, culmo subramoso.

B. *Polygamæ*.

G. 15. HORDEUM.

Cal. uniflori, bivalves, unilaterales, ternati, ut involucrium hexaphyllum simulent. *Flores* spicati.

1. HORDEUM *vulgare* L. — II. spiculis omnibus hermaphroditis aristatis, ordinibus duobus oppositis erectionibus.

2. HORDEUM *hexastichon* L. — II. spiculis omnibus hermaphroditis scissariam æqualiter positus.

3. *HORDEUM distichon* L. — H. spiculis lateralibus masculis distichis, spica compresso-disticha.
4. *HORDEUM murinum* L. — H. spiculis lateralibus masculis aristatis, valvulis intermediis lanceolatis ciliatis.
5. *HORDEUM secalinum* Schreb. — H. spiculis lateralibus masculis breviter aristatis, valvulis omnibus setaceis scabris.

G. 16. ANDROPOGON.

Flores polygami: masculi vel steriles pedicellati, plerumque mutici; hermaphroditi sessiles aristati, *cor.* subtrivalvi.

1. *ANDROPOGON Gryllus* L. — Andr. panícula pedunculis simplicissimis trifloris, spicula hermaphrodita aristata basi barbata.
2. *ANDROPOGON Allionii* Decand. — Andr. spica solitaria, floribus masculis muticis glaberrimis, fertilibus longissime aristatis, aristis contortis.
3. *ANDROPOGON Ischemum* L. — Andr. spicis subdigitatis, spiculis geminis: mascula pedunculata mutica; fertili sessili aristata, rachi villosa.
4. *ANDROPOGON distachyon* L. — Andr. spicis binis terminalibus.

§ II. MULTIFLORÆ.

1. Calyx biflorus,
vel 2 corollas fertiles cum tertiæ corollæ sterilis rudimento continens.

G. 17. AIRA.

Cal. biflorus, valvulis scariosis, erectis. *Cor.* 2 (rudimento nullo tertiæ sterilis interjecto), aristatæ, rarius muticæ: *arista* plerumque glumæ basi inserta.

1. *AIRA aquatica* L. — A. panicula patente, corollis muticis lævibus obtusis calyce longioribus, foliis planis.
2. *AIRA subspicata* L. — A. culmo superne tomentoso, panicula spiciformi, corollis medio dorso aristatis, arista demum reflexa.
3. *AIRA cespitosa* L. — A. foliis planis facie sulcatis, panicula patente, glumis basi villosis, arista brevi.
4. *AIRA canescens* L. — A. foliis setaceis, culmo folioso, panicula (demum) coarctata, aristis apice clavatis calyce brevioribus.
5. *AIRA præcox* L. — A. foliis setaceis, vaginis angulatis, panicula subspiciformi, corollis sessilibus basi nudis dorso aristatis.

6. *AIRA flexuosa* L. — A. foliis setaceis, panicula trichotoma flexuosa, corollis basi villosis calycem æquantibus : altera pedicellata.
7. *AIRA caryophyllea* L. — A. foliis setaceis, panicula trichotoma divaricata, corollis calyce minoribus basi glabriusculis sessilibus.

G. 18. MELICA.

Cal. 2-valvis, 1-2-floris, valvulis subæqualibus. *Cor.* calyce vix longiores, ovatæ. *Rudimentum* secundæ vel terciæ corollæ inter flosculos fertiles. *Spiculæ* ovatæ.

1. *MELICA uniflora* Retz. — M. petalis imberbibus, panicula secunda patente ramosa, spiculis erectis unifloris.
2. *MELICA nutans* L. — M. petalis imberbibus, panicula subsimplici racemosa secunda, spiculis pendulis bifloris.
5. *MELICA ciliata* L. — M. panicula coarctata, corollæ infimæ gluma exteriori longe ciliata.

G. 19. HOLCUS.

Cal. plerumque biflorus : corolla altera mascula. *Cor.* bivalvis : exterior (dorso) aristata.

1. *HOLCUS odoratus* L. — H. trianthus locustis

panientatis hiantibus, flosculo tertio imperfecto. Hall.

3. *HOLCUS avenaceus* Wigg. — H. valvulis inæqualibus glabris, corolla hermaphrodita superiori submutica, mascula arista geniculata refracta.

β. bulbosus.

γ. palustris.

5. *HOLCUS lanatus* L. — H. valvulis villosis, corolla hermaphrodita mutica, mascula arista (brevis) arcuato-recurva.

4. *HOLCUS mollis* L. — H. valvulis subæqualibus glabriusculis, corolla hermaphrodita inferiori mutica, mascula arista geniculata, radice repente.

G. 20. ELYMUS.

Cal. laterales, in quovis racheos dente ternati, ut involucrium hexaphyllum mentiantur. *Cor.* omnes hermaphroditæ. *Flores* spicati.

1. *ELYMUS europæus* L. — El. spica erecta, spiculis subbifloris aristatis, calycibus exstriatis.

G. 21. SECALE.

Cal. bivalvis, valvulis oppositis, corollarum basin includentibus, biflorus, in quovis racheos dente soli-

tarius. *Gluma* ext. ex apice longissime aristata. *Flores* spicati.

1. *SECALE cereale* L. — *S.* glumis aculeato-ciliatis.

Calyx tri- vel pluriflorus (nec priorum).

G. 22. *ENODIUM*.

Cal. 2-4-florus, valvulis inæqualibus. *Cor.* conicæ, calyce multo longiores : suprema sterilis, abortiens; sæpe etiam nomisi rudimentum informis. *Spiculæ* teretes.

1. *ENODIUM cæruleum* N.

G. 23. *KÆLERIA*.

Cal. herbaceus, vage subtriflorus. *Cor.* acuminato-oblongæ, fasciculato-cristatæ, calyce longiores. *Arista* terminalis vel nulla. (*Panicula* spiciformis.)

1. *KÆLERIA cristata* Pers. — *K.* panicula spiciformi basi interrupta glabriuscula submutica, foliis inferioribus planis ciliato-pubescentibus.
2. *KÆLERIA valesiaca* N. — *K.* panicula dense spicata glabriuscula submutica, foliis inferioribus convoluto-setaceis glaberrimis.
3. *KÆLERIA hirsuta* N. — *K.* panicula spici-

formi hirsuta aristata, culmo superne tomentoso.

G. 24. DACTYLIS.

Cal. compressus, *valvula* majore naviculari, acute carinata, subaristata. (*Spiculæ* apud nos subquadri-floræ.)

1. DACTYLIS *glomerata* L. — D. panicula secunda supradecomposita, spiculis glomeratis.

G. 25. DANTHONIA.

Cal. 2-valvis, submultiflorus, maximus. *Cor.* calycem non excedentes, gluma ext. valvulis multo minori, concava, apice emarginata, mucronata, aristata vel omnino mutica, tuncque trifida.

1. DANTHONIA *decumbens* Decand. — D. racemosimplici, gluma exteriori mutica trifida, vaginis pilosis.

G. 26. ELEUSINE.

Cal. 5-5-florus *valvulis* carinatis, obtusis: majori 5-7-nervia. *Cor.* imbricatæ *gluma* ext. carinata obtusa. (*Panicula* spiciformis).

1. ELEUSINE *dura* Lam. — El. panicula spiciformi rigida secunda, spiculis sub-

trifloris alternis subsessilibus adpressis.

G. 27. SESLERIA.

Cal. bivalvis, 2-5-florus, subaristatus. *Cor.* gluma ext. obtusa, 5-5-dentata. (*Panicula* spicata, bracteata.)

1. SESLERIA *cærulea* Scop. — S. panicula spicata oblonga bracteata, spiculis subtrifloris, gluma exteriori 5-5-aristata, aristis brevibus.
2. SESLERIA *elongata* Host. — S. panicula spicata subcylindrica, spiculis subtrifloris, valvulis aristatis corollas superantibus *).

G. 28. POA.

Cal. multiflorus. *Spiculæ* basi rotundatæ. *Cor.* glumis ovatis, acutiusculis, muticis. *Axis* teres, plerumque lævis.

I. *Spiculis glaberrimis.*

* Cespitibus vaginisque complanatis.

1. POA *sudetica* Schrad. — P. foliorum fasciculis complanatis vaginis compressis

*) Vide infra ad conspectus calcem hujusce speciei nuper in Helvetia observatæ descriptionem.

carinatis, gluma exteriori 5-nervia.

** Panicula rigida.

2. *POA rigida* L. — P. panicula secunda lanceolato-coarctata, spiculis subdecemfloris linearibus rigidis, corollis teretiusculis distichis distinctis.

*** Panicula dense spicata.

3. *POA disticha* Jacq. — P. panicula spicata ovato-disticha, spiculis compressis quadrifloris sessilibus.

**** Pili patentes ad vaginæ orificium.

4. *POA pilosa* L. — P. pilis vaginalibus oppositifoliis, spiculis linearibus sub-8-floris, pedunculis primariis basi pilosis.

5. *POA megastachys* N. — P. pilis vaginalibus oppositifoliis, pedunculis basi glanduloso-pubescentibus, spiculis lanceolatis sub-20-floris, corollis trinerviis.

6. *POA Eragrostis* L. — P. pilis vaginalibus oppositifoliis, spiculis lineari-lanceolatis serratis sub-10-floris, glumis trinerviis, pedunculis basi nudis.

***** Corollæ obtusæ.

7. *POA aquatica* L. — P. panicula erecta amplissima ramosissima, spiculis 6-floris, foliis latissimis basi maculatis.

8. *POA distans* L. — P. panicula demum divaricata, spiculis linearibus sub-5-floris, glumis obsoletè nervosis.
9. *POA fluitans* Smith. — P. panicula divaricata, spiculis subteretibus oblongis multifloris adpressis, corollis sub-7-nerviis obtusis.

II. *Spiculis pubescentibus.*

* Ligulis truncatis, subnullis.

10. *POA nemoralis* L. — P. ligulis subnullis, foliis basi plicatis vagina latioribus longioribusque, panicula elongata, corollis subnervosis pubescentibus.

- I. *Vulgaris.* — P. panicula nutante pauciflora, calyce spicas ovatas subtrifloras æquante, culmo debili, corollis liberis.

β. *cirrhosa.*

- II. *Firmula.* — P. panicula pyramidaliter erecta, calyce spiculis subtrifloris breviori, corollis liberis, culmo firmulo.

- III. *Montana.* — P. panicula pauciflorante, spiculis grandiusculis sub-5-floris coloratis, culmo debili, corollis subconstrictis.

- IV. *Glanca.* — P. panicula spiciformi stricta, spiculis subtrifloris, glumis

obtusis villosis, culmis rigidis fasciculatis.

V. *Cæsia*. — P. panicula pyramidali multiflora, spiculis ellipticis acutis subquinquefloris, culmo folisque glaucis, corollis constrictis.

VI. *Coarctata*. — Panicula multiflora elongata coarctata, spiculis ellipticis acutis subtrifloris, corollis constrictis, culmis cespitosis.

β. *Schœnosperma*.

** Corollis basi liberis (nec priorum.)

11. *POA annua* L. — P. panicula secunda, pedunculis geminis divaricatis, culmo obliquo compressiusculo, radice annua.

I. *Vulgaris*.

II. *Varia*. — P. panicula secunda, pedunculis alternis patentis-erectis, corollis subsenis glabriusculis carina subpubescentibus.

12. *POA alpina* L. — P. panicula diffusa, spiculis ovatis subsexflores, ligulis infimis truncatis brevissimis, superioribus lanceolatis.

β. *Vivipara*.

γ. *Frigida*. — Spiculis 3-4 floris.

II. *Brevifolia*. — P. panicula angusta

patenti ovata, spiculis subquadrifloris, foliis culmeis brevissimis *).

*** Corollis constrictis : culmis basi bulbosis (nec priorum).

13. *POA bulbosa* L. — P. panicula ovata subsecunda, pedunculis subgeminis, spiculis ovato-lanceolatis turgidiusculis subquadrifloris.

β. Vivipara.

14. *POA concinna* N. — P. panicula ovata, spiculis ovato-acutis disticho-compressis subdecemfloris, corollis dorso sericeis.

**** Corollis constrictis : pedunculis geminis (nec priorum).

15. *POA aspera* N. — P. panicula coarctata flexuosa, corollis obsolete nervosis, culmis cespitosi superne scabris.

16. *POA distichophylla* N. — P. radice repente, foliis culmorum sterilium distichis, panicula flexuosa, spiculis subtrifloris, corollis sericeis.

17. *POA pallens* Hall. fil. — P. radice repente, panicula capillari apice mutante pau-

*) Brevifolia nostra a plantis austriacis quae sub nominibus *collinae* Host et *badensis* Jacq. innotuerunt saltem corollis liberis differt videtur. Crediderim has duas stirpes et inter se et ab omnibus *Poa alpinae* varietatibus omnino distinctas esse.

ciflora, corollis obsolete nervosis pubescentibus.

18. *Poa laxa* Willd. — *P.* panicula subramosa mutante flexuosa, spiculis subtrifloris late ovatis pubescentibus, corollis liberis contractisve.

19. *Poa minor* N. — *P.* panicula subramosa contracta capillari mutante pauciflora, spiculis oblongis, subseffloris sericeis.

20. *Poa compressa* L. — *P.* radice repente, culmo obliquo compresso, panicula coarctata, spiculis lanceolatis subseffloris pubescentibus.

***** Corollis constrictis; pedunculis semiverticillatis.

21. *Poa serotina* Ehrh. — *P.* radice fibrosa, foliis superioribus vaginam subæquantibus, panicula pyramidalis, spiculis ovato-acutis subtrifloris.

22. *Poa trivialis* L. — *P.* radice fibrosa, foliis vaginis culmoque scabris, ligulis elongatis acutis, panicula pyramidalis.

23. *Poa pratensis* Smith. — *P.* panicula diffusa, radice repente, foliis superioribus vagina multo brevioribus, ligula abbreviata truncata.

I. Vulgaris. — *P.* panicula pyramidalis, pedunculis demum divaricatis, foliis

omnibus planis, radicalibus ceteris
vix angustioribus.

II. *Angustifolia*. — *P.* panicula demum
subdivaricata, foliis radicalibus an-
gustissimis longissimis.

III. *Strigosa*. — *P.* panicula strigosa,
foliis omnibus angustis glaucescen-
tibus demum convolutis.

IV. *Anceps*. — *P.* culmo ancipiti, foliis
latis, spiculis coloratis subquinque-
floris.

24. *Poa hybrida* N. — *P.* culmo vaginisque
compressis, panicula elongata, spi-
culis subpubescentibus, glumis acu-
minatis nervosis. *)

G. 29. *BRIZA*.

Cal. bivalvis, multiflorus. *Spiculæ*
ovatæ, ventricosæ, distichæ. *Cor.*
bivalvis ventricosa, glumis cordatis
obtusis. *Semen* corollæ adnatum, de-
pressum.

1. *BRIZA media* L. — *Br.* spiculis ovatis sep-
temfloris, calyce corollis breviori,
ligula brevissima obtusa.

*) In observatione descriptioni hujus speciei adfixæ diximus
cespites s. fasciculos foliorum una cum culmis complanatos huic
omnino deesse, quod veritati contrarium est. Sed cespites hi ple-
rumque multo minus conspiciuntur quam in *P. sudetica* et cum
cito emarcescant, eos nemini hoc anno (1811) videre potuit.

G. 50. CYNOSURUS.

Cal. 2-5-florus. *Spiculæ* omnes bracteatae: *bracteæ* monophyllæ, multifidæ.

1. CYNOSURUS *cristatus* L. — C. bracteis pin-
nato-distichis muticis, racemo spicato
simplici lineari.
2. CYNOSURUS *echinatus* L. — C. bracteis pin-
natis scariosis longissime aristatis, pa-
nicula ovata, glomerata.

G. 51. FESTUCA.

Cal. bivalvis, multiflorus. *Spiculæ*
compressæ, distichæ, utrinque acutæ.
Gluma ext. acuminata plerumque
aristata: *arista* terminalis. *Axis* hinc
scaber. *Semen* corollæ adnatum.

I. *Ligula subtruncata.*

* *Ligula* biaurita: folia omnia
setacea.

1. FESTUCA *ovina* L. — F. panicula coarctata,
spiculis ovatis subquadrifloris, corollis
teretiusculis, foliis tenuissimis.
 - a. Aristata.
 - β. Mutica.
2. FESTUCA *vivipara* Smith. — F. panicula
secunda coarctata, flosculis compresso-
carinatis muticis calyceque pubes-
centibus, culmo tetragono, foliis se-
taceis levibus.

5. *FESTUCA paludosa* N. — *F.* panicula subpatente, spiculis ovatis subsexfloris muticis corollis compressis subearinatis imbricatis, foliis glaucescentibus.
4. *FESTUCA violacea* N. — *F.* panicula, subpatente ramosa, aristis brevibus, foliis capillaceis mollibus: culmeis brevissimis complicato-capillaceis.
5. *FESTUCA alpina* N. — *F.* panicula stricta subramosa, aristis breviusculis, foliis culmoque capillaceis mollibus.
6. *FESTUCA aurata* N. — *F.* panicula subpatente ramosa; spiculis denum dilatatis distichis, foliis capillaceis mollibus: culmeis complicatis.
7. *FESTUCA Halleri* Vill. — *F.* racemo spicato simplici, pedunculis spicula brevioribus, aristis glumam subequantibus, foliis culmeis complicato-setaceis.
8. *FESTUCA stricta* Host. — *F.* culmis strictis levibus, foliis erectis rigidiusculis, panicula ramosa patente, spiculis ellipticis subquadrifloris.
 β . Spiculis minoribus pubescentibus.
9. *FESTUCA curvula* N. — *F.* panicula ramosa coarctata, spiculis subquadrifloris, cul-

mis strictis lævibus , foliis rigidiusculis curvulis.

10. *FESTUCA glauca* Lam. — F. panicula patente , spiculis oblongo - ellipticis , culmo angulato , foliis rigidis lævibus glaucescentibus.
 11. *FESTUCA valesiaca* N. — F. panicula coarctata , culmo teretiusculo , foliis filiformibus strictis scaberrimis glaucescentibus.
 12. *FESTUCA Myurus* L. — F. monandra , panicula spiciformi elongata subnutante , aristis longissimis , foliis angustis involutis.
 13. *FESTUCA bromoides* L. — F. monandra , panicula spiciformi erecta pauciflora , aristis longissimis , foliis angustis involutis.
- ** Ligula binaurita : folia radicalia setacea , culmea planiuscula , latiora.
14. *FESTUCA rubra* L. — F. panicula patenti-erecta , foliis glaucescentibus , culmeis facie incanis , radice repente.
 15. *FESTUCA heterophylla* Juss. — F. panicula laxa patula nutante , foliis radicalibus tenuissimis longissimis , radice repente.
 16. *FESTUCA duriuscula* L. — F. panicula patenti-erecta , corollis arista longioribus , radice fibrosa.

α. Oliganthos.

β. Polyanthos.

γ. Lævigata.

δ. Grandiflora.

ε. Dumetorum.

17. *FESTUCA nigrescens* Lam. — F. panicula patente ramosa, aristis glumam subæquantibus, foliis culmeis glabriusculis, radice fibrosa.

*** Ligula baurita: folia omnia plana.

18. *FESTUCA arundinacea* Schreb. — F. panicula ramosissima patula, spiculis paucifloris, aristis brevissimis nullisve, culmo erecto, foliis sulcatis.

19. *FESTUCA pratensis* Huds. — F. panicula erecta, spiculis linearibus multifloris, corollis teretiusculis obsolete nervosis, aristis brevibus nullisve.

20. *FESTUCA loliacea* Huds. — F. spiculis omnibus subsessilibus alternis remotis distichis submuticis subsolitariis.

21. *FESTUCA laxa* Host. — F. panicula laxa patente mutante, spiculis lanceolatis compressis subquadrifloris, corollis nervosis carinatis subaristatis.

22. *FESTUCA serotina* L. — F. spiculis paucifloris, corollis remotis subaristatis, culmo vaginis tecto, foliis patentibus brevibus.

23. *FESTUCA sylvatica* Vill. — *F.* panicula patente mutica, valvulis corollae multo brevioribus, glumis exterioribus trinerviis, foliis ensiformibus.

24. *FESTUCA Scheuchzeri* N. — *F.* panicula mutica, valvulis corollae aequantibus, gluma exteriori 5-nervia, foliis linearibus, radice repente.

II. *Ligula exserta nec truncata.*

25. *FESTUCA spadicea* L. — *F.* panicula coarctata patente, spiculis ovatis compressis muticis, corollis nervosis, pedunculis laevibus.

26. *FESTUCA acuminata* N. — *F.* panicula subpatente ramosa, spiculis teretiusculis oblongis submuticis, foliis setaceis durissimis pungentibus *).

27. *FESTUCA pumila* Vill. — *F.* panicula subpatente, pedunculis subsolitariis, spi-

*) Haec est species quam parte priori huius operis ob opinionem falsam, quae nescio quomodo inter omnes Helvetiae botanicos prevaluerat, sub nomine *Festucæ flavescentis* BELIARDI temere proposui. *F. flavescentis* quam hoc anno Augustae Taurinorum apud Cl. BALBIS vidi, a nostra praecipue foliis tenuissimis, late viridibus toto caelo differt. Nostra forte ad *Festucam Eskiam* RAMOND in Dec. Fl. fr. 1589 spectat. Sed hoc nomen ideo adoptare non ausus sum, quia celeb. CANDOLLUS in syn. Fl. gall. p. 129. *F. Eskiae* iachin spicularum s. axin pilosum tribuit quod in *acuminata* nunquam occurrit. Nostra utique ad *flavescentem* HORTII pertinere videtur.

culis teretiusculis, aristis brevibus; foliis setaceo-angulosis.

28. *FESTUCA pilosa* Hall. fil. — F. panicula semiverticillata flexuosa, spiculis ovatis subtrifloris subaristatis, axi infra corollas piloso *).

G. 52. BROMUS.

Cal. 2-valvis, multiflorus. *Spiculæ* oblongæ distichæ, compressæ. *Gluma ext.* plerumque bifida, obtusa, infra apicem aristata; *interior* nervis flexuræ pectinato-ciliatis.

* Arista terminalis; racemus spicatus.

1. *BROMUS sylvaticus* Poll. — Br. racemo disticho simplici, aristis supremis gluma longioribus, glumis acuminatis.

α. Spiculis hirsutis.

β. Spiculis glaberrimis.

2. *BROMUS pinnatus* L. — Br. racemo spicato simplici disticho, aristis gluma brevioribus, flosculis obtusiusculis.

** Valvula inferior subnervia.

5. *BROMUS inermis* L. — Br. panicula erecta, spiculis subteretibus nudis muticis subaristatisque, radice repente.

*) Hanc speciem observavit Cl. BELLARDI etiam in Pedemontio, et *Poa violaceam* appellavit, quod ex speciminibus cognovi quæ Cl. BALEIS humaniter mecum communicavit.

4. *BROMUS erectus* Huds. — Br. panicula erecta semiverticillata, spiculis erectis, foliis radicalibus angustissimis ciliato-pilosis.
5. *BROMUS giganteus* L. — Br. panicula nutante secunda laxa, aristis gluma longioribus, spiculis foliisque glaberrimis.
6. *BROMUS asper* L. — Br. panicula nutante secunda, spiculis teretiusculis pubescentibus, glumis arista longioribus, vaginis hispidis.
β. Montanus.
7. *BROMUS sterilis* L. — Br. panicula patula, spiculis oblongis distichis dilatatis glabris, aristis gluma longioribus.
8. *BROMUS tectorum* L. — Br. panicula nutante subsecunda semiverticillata, spiculis linearibus pubescentibus, aristis glumam subæquantibus.
 *** Valvula inferior 5 vel pluribus nervis instructa.
9. *BROMUS simplex* N. — Br. panicula simpliciuscula cernua, spiculis ovato-oblongis, corollis imbricatis depressis glabris, culmo scabriusculo.
10. *BROMUS mollis* L. — Br. panicula erecta contracta, pedunculis ramosis, spi-

culis ovatis, corollis imbricatis depressis nervosis pubescentibus.

11. *BROMUS arvensis* L. — Br. panicula patente, pedunculis elongatis ramosis, spiculis oblongis, corollis ellipticis imbricatis depressis glabris.

12. *BROMUS grossus* Desf. — Br. panicula nutante, spiculis ventricosus demum distinctis, corollis depressis, aristis rectis.

α. Spiculis hirsutis.

β. Spiculis glabris.

13. *BROMUS secalinus* N. — Br. panicula nutante, spiculis subellipticis, corollis turgidis demum distinctis, arista recto-flexuosa.

14. *BROMUS elongatus* N. — Br. panicula erecto-patente, pedunculis elongatis, spiculis oblongis glaberrimis, corollis imbricatis depressis.

15. *BROMUS squarrosus* L. — Br. panicula nutante simplicissima subsecunda, aristis divaricatis, foliis angustis.

α. Spiculis glaberrimis.

β. Spiculis hirsutis.

G. 55. AVENA.

Cal. bi-tri-multiflorus. *Cor.* gluma ext. lanceolata, teretiuscula, ex dorso aristata. *Arista* geniculata, contorta.

Semen plerumque corolla corticatum.

1. *AVENA fatua* L. — Av. paniculata, spiculis subtrifloris, corollis omnibus aristatis inferne pilosis.
2. *AVENA sativa* L. — Av. paniculata, spiculis subbifloris, corollis basi subpilosis : altera mutica.
3. *AVENA orientalis* Schreb. — Av. panicula coarctata, pedunculis erectis, spiculis bifloris, corollis glabris : altera mutica.
4. *AVENA fragilis* L. — Avena spicata, spiculis subquinquefloris adpressis alternis approximatis sessilibus.
5. *AVENA pratensis*. L. — Av. subracemosospicata elongata, spiculis subquinquefloris, axi piloso, foliis involutis scabris.
β. Alpina.
6. *AVENA versicolor* Vill. — Av. panicula abbreviata, spiculis subquinquefloris, axi villosa, foliis planis læviusculis.
7. *AVENA distichophylla* Vill. — Av. paniculata, spiculis subtrifloris, axi barbato, culmo basi ramoso, foliis ramorum distiche patentibus.
8. *AVENA pubescens* L. — Av. panicula erecta subsimplici, spiculis elongatis subtri-

floris, axi barbato, culmo simplici, foliis subpubescentibus.

β. Foliis vaginisque glaberrimis.

γ. Raccmo simplicissimo.

9. *AVENA flavescens* L. — Av. panicula ramosissima, spiculis subtrifloris, axi piloso, gluma exteriori apice biaristata, foliis pubescentibus.

β. Alpestris.

γ. Paniculata, capillaris.

10. *AVENA tenuis* Moench. — Av. paniculata, spiculis subtrifloris : corolla infima uniaristata, ceteris arista dorsali apiceque biaristatis.

11. *AVENA lœflingiana* L. — Av. panicula spiciformi, gluma exteriori apice biaristata, foliis vaginisque incano-pubescentibus.

G. 54. LOLIUM.

Flores spicati. *Cal.* univalvis, multiflorus, rachis oppositus. *Cor.* distichæ. *Semen* corolla corticatum.

1. *LOLIUM perenne* L. — L. spiculis calyce longioribus, corollis lanceolatis compressis muticis, culmo levi.

β. Tenue.

γ. Spica ovata compressa.

δ. Culmis basi ramosis.

2. *LOLIUM temulentum* L. — L. spica aristata, spiculis calyce brevioribus, corollis ellipticis, culmo superne scabro.
3. *LOLIUM arvense* With. — L. spica submutica, spiculis calycem subæquantibus, corollis distinctis, breviter ellipticis.
4. *LOLIUM rigidum* N. — L. spica mutica, spiculis calyce multo longioribus, corollis elongatis, culmo superne scaberrimo *).

G. 55. TRITICUM.

Flores spicati. *Cal.* bivalvis, multiflorus, solitarius, subsessilis, valvulis rachi parallelis.

* Culta.

1. *TRITICUM sativum* Lam. — Tr. spiculis quadrifloris glabriusculis imbricatis, rachi margine pilosa.
 α . Æstivum.
 β . Hybernum.
2. *TRITICUM turgidum* L. — Tr. spiculis turgido-ventricosus villosis aristatis.
3. *TRITICUM compositum* L. — Tr. spiculis quadrifloris turgido-ventricosus villosis, spica composita.
4. *TRITICUM Spelta* L. — Tr. spica aristata disticha, spiculis lævibus subquadrifloris, rachi margine glaberrima.

*) Culmi tamen sæpius omnino læves deprehenduntur.

5. *TRITICUM monococcon* L. — Tr. spica compresso-disticha, spiculis monospermis subtrifloris : corolla fertili aristata, ceteris muticis.

6. *TRITICUM polonicum* L. — Tr. spica inordinata, spiculis subtrifloris elongatis longissime aristatis.

★★ Spontanea.

7. *TRITICUM repens* L. — Tr. spica disticha, valvulis glumaeque exteriori acuminatis aristatisve, radice repente.

8. *TRITICUM intermedium* Host. — Tr. spica disticha, calyce corollisque obtusis carinatis, foliis apice involuto-pungentibus, radice repente.

β. Foliis planioribus.

γ. Aristatum.

9. *TRITICUM caninum* Schreb. — Tr. calycibus acuminatis subquinquefloris, corollis aristatis, foliis planis, radice fibrosa.

10. *TRITICUM Halleri* Viv. — Tr. spiculis multifloris muticis, valvulis glumis-que obtusiusculis, foliis subsetaceis, radice annua.

β. Spica basi ramosa.

11. *TRITICUM Nardus* Dec. — Tr. spica secunda, spiculis sub-4-floris aristatis,

flosculis subulatis, foliis subsetaceis,
radice annua.

G. 56. *ÆGILOPS*.

Flores spicati. *Spicula* subtriflora.
Cal. bivalvis, valvulis cartilagineis,
aristatis. *Cor.* intermedia mascula;
laterales hermaphroditæ.

1. *ÆGILOPS cylindrica* Host. — Aeg. spica
elongata cylindrica, valvulis unia-
ristatis, corollis submuticis.

CYPERACEÆ.

G. 57. *SCHÆNUS*.

Cal. glumæ fasciculato-congestæ;
exteriores steriles, quandoque bractei-
formes. *Cor.* o. *Semen* nudum vel
villis cinctum. *Flores* hermaphroditi.
Stam. 5. *Stigma* 2-5-fidum.

1. *SCHÆNUS compressus* L. — Sch. culmo
teretiusculo, spica composita disticho-
compressa, foliis planis.
2. *SCHÆNUS Mariscus* L. — Sch. culmo tereti,
foliis carina margineque aculeatis.
5. *SCHÆNUS albus* L. — Sch. culmo trigono
diviso, foliis carinatis angustissi-
mis, spiculis fasciculatis, radice
fibrosa.

4. *SCHÆNUS fuscus* L. — Sch. culmo teretiusculo diviso, foliis canaliculatis setaceis, spiculis fasciculatis, radice repente.
5. *SCHÆNUS nigricans* L. — Sch. culmo subnudo tereti, capitulo ovato, spiculis numerosis, involucrio diphylo.
6. *SCHÆNUS ferrugineus* L. — Sch. culmo tereti nudo, capitulo lineari-elliptico subdistachyo, involucrio subdiphylo capitulum æquante.

G. 58. *SCIRPUS*.

* Spica unica.

Cal. Glumæ undique imbricatæ, plerumque omnes fertiles. *Cor.* o. *Semen* nudum vel setis cinctum brevibus.

1. *SCIRPUS acicularis* L. — Sc. culmo tetragono vagina aphylla instructo, spica ovata acuta, glumis inferioribus paulo majoribus.
2. *SCIRPUS cespitosus* L. — Sc. culmo tereti striato basi multiplici-squamoso, vaginis mucronatis, glumis exterioribus maximis.
3. *SCIRPUS Bæothryon* L. — Sc. culmo tereti basi vagina aphylla instructo, glumis inferioribus spica brevioribus, radice viticulosa.

4. *SCIRPUS palustris* L. — Sc. culmo tereti basi vagina aphylla instructo, spica oblonga imbricata, radice repente.
5. *SCIRPUS ovatus* Roth. — Sc. culmo tereti basi vagina aphylla instructo, spica ovata, floribus diandris, radice fibrosa.
6. *SCIRPUS lacustris* L. — Sc. culmo tereti nudo, panicula decomposita corymbosa, spiculis ovatis.
7. *SCIRPUS Holoschoenus* L. — Sc. culmo tereti nudiusculo, panicula subumbellata simplicissima, capitulis globosis, involuero diphylo.
8. *SCIRPUS setaceus* L. — Sc. culmo setaceo nudiusculo, spicis subternis sessilibus, involuero monophyllo erecto culmo multo breviori.
9. *SCIRPUS supinus* L. — Sc. culmo nudo tereti, spicis subternis sessilibus, involuero monophyllo erecto culmo vix breviori.
*** Spicæ una plures: culmi triquetri.
10. *SCIRPUS sylvaticus* L. — Sc. culmo trigono folioso, panicula terminali supradecomposita corymbosa foliacea, spicis confertis.
11. *SCIRPUS maritimus* L. — Sc. culmo triquetro folioso, panicula cymosa sim-

plici foliacea, spicis sessilibus subternis terminalibus.

12. *SCIRPUS annuus* All. — Sc. culmo longinundo triquetro, panícula corymbosa terminali foliacea, foliis setaccis pubescentibus.

13. *SCIRPUS triqueter* L. — Sc. culmo trigononudo, spicis lateralibus pedunculatis sessilibusve, stigmatibus duobus, radice repente.

14. *SCIRPUS mucronatus* L. — Sc. culmo triquetro apice demum reflexo, spicis sessilibus lateralibus, stigmatibus tribus, radice fibrosa.

G. 59. ERIOPHORUM.

Cal. glumæ undique imbricatæ.
Cor. o. Semen setis numerosis longissimis lævissimis cinctum.

1. *ERIOPHORUM vaginatum* L. — Er. culmis vaginatis trigonis, spica unica ovata, antheris linearibus elongatis.

2. *ERIOPHORUM capitatum* Hoffm. — Er. culmis vaginis teretibus, spica unica subglobosa, antheris cordato-ovatis brevibus.

3. *ERIOPHORUM alpinum* L. — Er. culminodiensculo triquetro scabro, spica unica erecta: pappo rariori crispo.

4. *ERIOPHORUM polystachyon* L. — Er. foliis planis apice triquetris, culmo tereti, spicis nutantibus, pedunculis scabris subdivisis.
5. *ERIOPHORUM angustifolium* Roth. — Er. foliis canaliculatis superne triquetris, culmo tereti, spicis nutantibus, pedunculis lævissimis simplicissimis.

G. 40. CYPERUS.

Cal. glumæ distiche imbricatæ.

Cor. o. *Semen* unicum imberbe.

1. *CYPERUS flavescens* L. — C. umbella triphylla subcomposita, spicis confertis lanceolatis, glumis obtusis, stigmatibus duobus, culmo nudo.
β. Setaceus.
2. *CYPERUS fuscus* L. — C. umbella triphylla subcomposita, spicis confertis linearibus, glumis acutiusculis, stigmatibus tribus.
3. *CYPERUS longus* L. — C. culmo folioso, umbella foliosa decomposita, pedunculis nudis, spiculis linearibus compressis, glumis imbricatis.
4. *CYPERUS Monti* L. — C. umbella decomposita foliosa, spicis compresso-teretiusculis, glumis demum distinctis, radice viticulosa.

G. 41. ELYNA.

Flosculi hermaphroditi. *Cal.* univalvis. *Cor.* 2-valvis. *Semen* nudum. *Stigmata* tria.

1. ELYNA *spicata* Schrad. — El. spica stricta lineari.

G. 42. CAREX.

Glumæ univalves, undique imbricatæ. *Masculis stamina* tria; *fœmineis pistillum* unicum, 2 vel 5. *Semen* urceolo proprio cartilagineo, apice perforato nec dehiscente tectum.

* *Spica unica simplicissima.*

A. *Stigmata* 2.

1. CAREX *dioica* L. — C. spica dioica, fructibus adscendentibus ovatis mucronatis striatis, radice repente.
2. CAREX *davalliana* Smith — C. dioica polygamæ, fructibus oblongo-subulatis lævisculis patulis demum reflexis.
5. CAREX *pulicaris* L. — C. spica simplici androgyna superne mascula, fructibus divaricatis retroflexis utrinque acuminatis.

B. *Stigmata* tria.

4. CAREX *pauciflora* Lightf. — C. foliis pla-

minusculis, spica unica androgyna paniciflora, fructibus distantibus subulatis divaricatis.

5. *CAREX microglochin* Wahlenb. — C. foliis setaceis, spica androgyna submultiflora, fructibus reflexis subulatis, stylis lateralibus.

6. *CAREX petrea* Wahlenb. — C. spica androgyna superne longe mascula, glumis obtusissimis fructu obovato longioribus, culmo acutangulo.

** *Spiculæ androgynæ, apice masculæ. Stigmata duo.*

7. *CAREX intermedia* Good. — C. spiculis congesto-imbricatis, suprema infimisque masculis, intermediis foemineis.

8. *CAREX chordorhiza* L. fil. — C. spica composita, spiculis glomeratis, bracteis ovato-acutis subæquantibus muticis, culmo basi subramoso.

9. *CAREX fœtida* All. — C. spica composita conglomerata subrotunda, bracteis aristatis, foliis planis.

10. *CAREX juncifolia* All. — C. spica subrotunda, glumis late scariosis, foliis setaceo-canaliculatis, culmo teretiusculo, radice repente.

11. *CAREX paniculata* L. — C. spica panicu-

lata, fructibus oblongo-rostratis hinc convexis inde planiusculis, culmo acute trigono.

12. *CAREX teretiusecula* Good. — *C.* spica sub-supradecomposita coarctata, fructibus hinc gibbis, culmi faciebus convexis.

13. *CAREX paradoxa* Willd. — *C.* spica sub-supradecomposita laxiuscula, fructibus utrinque gibbis, culmi faciebus convexis.

14. *CAREX vulpina* L. — *C.* spica sub-supradecomposita compacta, fructibus divergentibus, culmo angulis complanatis acutissimis.

15. *CAREX muricata* L. — *C.* spica interrupta, subcylindrica squarrosa, fructibus scabris divergentibus, culmo trigono.

β. Spiculis paucis simplicibus.

γ. Alpina, spica pauciflora.

16. *CAREX divulsa* Good. — *C.* spicula elongata subdecomposita basi subramosa: spiculis inferioribus remotis compositis, fructibus patentibus.

*** *Spiculæ androgynæ, apice fæmineæ. Stigmata 2.*

17. *CAREX bicolor* All. — *C.* spicis subternis: terminali basi mascula, inferioribus

foemineis subpedunculatis, fructibus obovatis obtusissimis mucronulatis.

18. *CAREX remota* L. — C. spiculis solitariis remotis subsessilibus, foliis culmum superantibus.

19. *CAREX stellulata* Good. — C. spica interrupta, spiculis paucis, fructibus stellatim divergentibus, foliis canaliculatis.

20. *CAREX brizoides* L. — C. spica composita subdisticha nuda, spiculis contiguis subcylindricis acutiusculis curvulis, fructibus marginatis subdivergentibus.

21. *CAREX elongata* L. — C. spiculis numerosis nudis cylindricis multifloris, glumis coloratis, fructibus subdivergentibus.

22. *CAREX leporina* L. — C. spiculis subnudis ovalibus obtusis alternis approximatis, fructibus marginatis, culmo fistuloso.

23. *CAREX approximata* Hoppe. — C. spiculis subternis contiguis, bractea aristata, glumis concinne imbricatis fructum apice integrum æquantibus.

24. *CAREX Schreberi* Willd. — C. spiculis contiguis nudiusculis teretiusculis, glumis fructus bidentatos æquantibus, foliis angustissimis, radice repente.

25. *CAREX curta* Good. — C. spiculis subsenis ovatis remotiusculis nudis, glumis pallidisscariosis, fructibus ovatis apice indiviso.
 β. *Brunnascens*.
 **** *Spiculæ androgynæ. Stigmata tria.*
26. *CAREX curvula* All. — C. spica composita oblonga: spiculis oblongis congesto-imbricatis apice masculis, glumis acuminatis.
27. *CAREX atrata* L. — C. spicis paucis ovatis pedunculatis androgynis apice fœmineis, fructibus compressis muricatis.
 β. *Dubia*.
 γ. *Nigra*.
 ***** *Spicæ sexu distinctæ. Stigmata duo.*
28. *CAREX mucronata* All. — C. spica fœminea subsolitaria approximata sessili brevissima, glumis lanceolatis, fructibus oblongo-ovatis rostratis.
29. *CAREX cespitosa* L. — C. spicis obtusis, foliorum floralium auriculis subrotundis minimis, fructibus ovatis compressis persistentibus.
50. *CAREX stricta* Good. — C. spicis acutis, foliorum floralium auriculis clon-

gatis , fructibus ovatis compressis deciduis.

51. *CAREX acuta* L. — Spicis masculis una pluribus, foemineis subnutantibus filiformibus, glumis pellucido-lineatis, fructibus subangulatis.

***** *Spicae sexu distinctae. Stigmata tria.*

I. Spica mascula unica.

A Fructus pubescentes , villosi vel tomentosi.

52. *CAREX lasiocarpa* Ehrh. — C. spica mascula subsolitaria longissima , foemineis brevioribus remotis axillaribus , fructibus hirsutis, foliis canaliculatis.

53. *CAREX tomentosa* L. — C. spicis distantibus cylindricis axillaribus, fructibus subrotundis incano-tomentosis, foliis carinatis.

54. *CAREX montana* Vill. — C. spica mascula ovata , foemineis approximatis sessilibus , fructibus ovato-trigonis utrinque mucronatis.

β. Conglobata.

55. *CAREX praecox* Jacq. — C. bracteis foliolisve vaginantibus , spica mascula subclavata , foemineis approximatis sub-

pedunculatis, fructibus obovatis pubescentibus.

β. Umbrosa.

36. *CAREX ciliata* Willd. — C. spica mascula obovata, foemineis approximatis sessilibus, vaginis subnullis, fructibus obovatis pubescentibus.

37. *CAREX pilulifera* L. — C. spicis foemineis sessilibus approximatis subrotundis, glumis margine scariosis, fructibus subrotundis pubescentibus.

38. *CAREX hispidula* N. — C. spica foeminea infima axillari subpedunculata, fructibus hispidulis, setis appressis, culmo triquetro scabro.

39. *CAREX gynobasis* Vill. — C. spicis foemineis subsessilibus paucifloris masculae approximatis : ima radicali longissime pedunculata, fructibus obovatis.

40. *CAREX clandestina* Good. — C. bracteis scariosis vaginantibus aphyllis, spicis foemineis remotis paucifloris vagina inclusis, foliis canaliculatis.

41. *CAREX digitata* L. — C. bracteis vaginantibus subaphyllis : infima foliolosa, spicis foemineis masculam superantibus : inferiori remota.

42. *CAREX ornithopoda* Willd. — C. spicis

linearibus : fœminicis digitatis subsessilibus masculam æquantibus , bracteis aphyllis vaginantibus.

* *Carex sempervirens.*

B. Fructus glabri vel tantum ad angulos scabri.

43. *CAREX alba* Scop. — C. spicis fœminicis distantibus masculam subæquantibus scariosis pedunculatis paucifloris , foliis setacco-canaliculatis.

44. *CAREX flava* L. — C. spica mascula lineari : fœminicis subsessilibus confertis subrotundis , fructibus globosis rostratis recurvis.

β. Patula.

γ. Oederi.

45. *CAREX fulva* Good. — C. vaginis inferioribus subdimidiatis , superioribus subæquantibus , spicis subremotis ovato-oblongis , fructibus ovatis rostratis.

46. *CAREX distans* L. — C. vaginis elongatis pedunculo longioribus , spicis fœminicis remotissimis axillaribus , fructibus angulosis acutis.

47. *CAREX punctata* N. — C. vaginis elongatis pedunculo longioribus , spicis fœminicis remotis , fructibus rostratis lævibus pellucido-punctatis.

48. *CAREX pendula* Huds. — C. vaginis elongatis subæquantibus, spicis cylindricis longissimis : fœmineis pendulis , fructibus confertis apice integerrimis.
49. *CAREX pallescens* L. — C. spicis fœmineis pedunculatis concinne imbricatis , vaginis subnullis , fructibus confertis obtusis , culmo pubescente.
50. *CAREX limosa* L. — C. vaginis subnullis , spicis fœmineis obesis ovatis pendulis pedunculatis , fructibus ovatis muticis lævibus.
51. *CAREX panicea* L. — C. spicis fœmineis pedunculatis distantibus cylindricis axillaribus , vaginis subdimidiatis , fructibus ovato-obtusis truncatis.
52. *CAREX pilosa* All. — C. foliis margine pilosis , spicis fœmineis distantibus , fructibus remotis apice bifidis , vaginis dimidiatis.
53. *CAREX nitida* Host. — C. spica mascula gracili , fœminea ima pedunculata , vagina subdimidiata , fructibus subglobosis lævibus nitidis.
54. *CAREX firma* Host. — C. foliis brevibus firmis patulis , spicis fœmineis paucifloris , fructibus oblongis rostratis apice vaginantibus.

55. CAREX *sempervirens* Vill. — C. vaginis subdimidiatis, spicis erectiusculis : mascula subovata, fructibus rostratis angulis exasperatis apice scarioso.
56. CAREX *Scopolii* N. — C. vaginis subdimidiatis, spica mascula oblonga, foemineis nutantibus, fructibus apice colorato emarginato suberistato.
57. CAREX *brachystachys* Schrank. — C. spicis foemineis pedunculatis linearibus nutantibus, fructibus elongatis gracilibus levissimis, foliis canaliculato-setaceis.
58. CAREX *frigida* All. — C. vaginis subdimidiatis, spicis numerosis, supremis subsessilibus, fructibus angulis scabris gluma duplo longioribus.
59. CAREX *sylvatica* Huds. — C. vaginis abbreviatis, pedunculis elongatis pendulis, fructibus rostratis apice bifidis.
60. CAREX *Pseudo-cyperus* L. — C. spicis cylindricis, pedunculis pendulis, vaginis subnullis, glumis aristatis, fructibus rostratis squarrosis.
61. CAREX *capillaris* L. — C. spicis foemineis paucifloris masculam superantibus, fructibus distantibus utrinque acuminatis.

II. Spicæ masculæ una plures.

62. *CAREX hirta* L. — C. vaginis æquantibus, spicis fœmineis erectis remotis, foliis vaginis glumis fructibusque hirsutis.

63. *CAREX glauca* Scop. — C. glumis obtusis, spicis fœmineis nutantibus, fructibus obtusissimis muticis, culmo teretiusculo, foliis glaucis.

β. Nigro-lutea.

64. *CAREX paludosa* Good. — C. spicis masculis subventricosis, fœmineis erectis subsessilibus gracilibus, glumis mucronatis, fructibus emarginatis.

65. *CAREX riparia* Curt. — C. vaginis nullis, spicis oblongis acutis obesis: infima pedunculata, glumis elongatis aristatis.

66. *CAREX ampullacea* Good. — C. spicis fœmineis erectis cylindricis, fructibus inflatis subglobosis, rostro filiformi bifurco, culmis teretiusculis.

67. *CAREX vesicaria* L. — C. spicis fœmineis erectis cylindricis, fructibus oblongis inflatis conicis, culmo triquetro.

***** Dubiæ.

68. *CAREX hirsuta* Sut. — C. spica unica ovata, foliis planis, fructibus rotundis hirsutis.

69. *CAREX lobata* Schkultsch. — *C. spica unica* composita lobata : spiculis subternis.
70. *CAREX fusca* All. — *C. spicis foemineis* ternis erectis petiolatis folio insidentibus, capsulis ovatis breviter mucronatis.
71. *CAREX foliosa* All. — *C. spicis foemineis* sessilibus : ima petiolata, glumis perangustis.
72. *CAREX strigosa* All. — *C. foliis cespitosis* brevibus, spicis foemineis paucifloris : suprema sessili.

TYPHACEÆ.

G. 45. TYPHA.

MASC. *Amentum cylindricum*. *Cal.* obsoletus, triphyllus. *Cor.* o. *Stam.* 5.

FEM. *Amentum* densissimum, infra masculinum. *Cal.* o. *Cor.* o. *Semen* pedicellatum, pedicelli basi pilis longis cincta.

1. *TYPHA latifolia* L. — *T. foliis subensiformibus*, amento masculino foemineoque contiguo.
2. *TYPHA angustifolia* L. — *T. foliis linearilanceolatis* dorso convexiusculo, amentis remotis.
3. *TYPHA minima* Moris. — *T. culmo nudo* basi vaginato, foliis linearibus cana-

liculatis, amentis remotis: fœmineo abbreviato incrassato.

G. 44. SPARGANIUM.

Amenta globosa, monoica. MASC. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. FÆM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Drupa* exsucca, monosperma.

1. SPARGANIUM *ramosum* Huds. — Sp. foliis (opacis) erectis basi triquetris lateribus concavis, pedunculo communi ramoso, stigmatē lineari.
2. SPARGANIUM *simplex* Huds. — Sp. foliis (opacis) basi triquetris lateribus planis, pedunculo communi simplici, stigmatē lineari.
3. SPARGANIUM *nataans* L. — Sp. foliis decumbentibus planis subpellucidis reticulatis, stigmatē brevissimo ovato, amento masculino unico.

J U N C E Æ.

G. 45. ACORUS.

Amentum hermaphroditum, cylindraceum, tessellatum. *Cal.* glumaceus, 6-phyllus. *Stamina* 6. *Cap-sula* 3-locularis, 3-sperma?

1. ACORUS *Calamus* L. — Ac. scapi mucrone longissimo foliaceo.

G. 46. JUNCUS.

* Culmus nudus.

Cal. hexaphyllus, glutinaceus, persistens. *Cor.* o. *Stam.* 6. *Stigm.* 3. *Caps.* 3-valvis, 3-locularis, polysperma. (*Folia teretia glabra.*)

1. JUNCUS *glaucus* Ehrh. — J. culmo nudo stricto glauco, panicula laterali erecta (rigida), capsulis ollipticis acutis.
2. JUNCUS *effusus* L. — J. culmo nudo stricto (molli), panicula laterali effusa, capsulis obtusis.
3. JUNCUS *conglomeratus* L. — J. culmo nudo stricto, panicula laterali conglomerata, capsulis retusis, floribus triandris.
4. JUNCUS *filiformis* L. — J. culmo nudo filiformi, panicula laterali bracteata pauciflora, capsulis subglobosis obtusis.
5. JUNCUS *arcticus* Willd. — J. culmo nudo rigido, apice acuminato pungenti, umbella laterali sessili simpliciuscula, capsulis obtusis.
6. JUNCUS *trifidus* L. — J. culmo nudo, foliis subternis terminalibus erectis.
7. JUNCUS *squarrosus* L. — J. culmo subnudo stricto, foliis setaceo-canaliculatis,

panicula terminali composita glomerata.

8. *JUNCUS capitatus* Weig. — *J.* culmo nudo filiformi, capitulo terminali subsolitario involucreto.

★★ *Culinus foliosus.*

9. *JUNCUS obtusiflorus* Ehrh. — *J.* culmo erecto, foliis fistuloso-articulatis teretiusculis, panicula supradecomposita, foliolis calycinis obtusiusculis.

10. *JUNCUS acutiflorus* Ehrh. — *J.* culmo ascendente, foliis fistuloso-articulatis compressis, calycibus acutis.

β. *Alpinus.*

11. *JUNCUS affinis* N. — *J.* foliis obsolete articulatis, capitulis terminalibus in culmo subsolitariis.

12. *JUNCUS supinus* Roth. — *J.* foliis capillaceo-canaliculatis, glomerulis subtrifloris subproliferis, floribus subtrian-drin, culmo radicante diviso.

13. *JUNCUS bulbosus* L. — *J.* foliis linearibus canaliculatis, culmo basi folioso, corymbo terminali, capsulis obovatis obtusissimis.

14. *JUNCUS bufonius* L. — *J.* foliis canaliculatis, culmo superne dichotomo, flo-

ribus solitariis subsessilibus, capsulis oblongis calyce brevioribus.

15. *JUNCUS Tenageja* L. fil. — J. foliis canaliculatis, culmo superne dichotomo, floribus solitariis sessilibus, capsulis subrotundis calycem æquantibus.
16. *JUNCUS triglumis* L. — J. foliis semiteretibus, culmo basi folioso, capitulo terminali subtrifloro aphylo bracteato.
17. *JUNCUS Jacquini* L. — J. culmo monophyllo, folio erecto, capitulo terminali, capsulis superne alato-triquetris.

G. 47. *LUZULA*.

Cal. 6-phyllus, glumacens, persistens. *Cor.* 6. *Stam.* 6. *Stigm.* 5. *Caps.* trivalvis, unilocularis, trisperma. (*Folia* plana, plerumque villosa).

1. *LUZULA pilosa* N. — L. corymbo demum divaricato composito, floribus solitariis, capsulis obtusis.
2. *LUZULA Forsteri* Decand. — L. corymbo subcomposito irregulari erecto, floribus solitariis, capsulis acutis.
3. *LUZULA flavescens* N. — L. corymbo umbellato erecto paucifloro, pedunculis

subnullifloris subæqualibus , capsulis acuminatis.

4. *LUZULA sylvatica* N. — *L.* corymbo decomposito laxo , floribus subternis aristatis , calyce capsulam superante.
5. *LUZULA spadicea* Decand. — *L.* foliis culmicis subglabris , corymbo composito , floribus approximatis mucronatis , capsulis subrotundis calycem superantibus.
6. *LUZULA albidæ* Decand. — *L.* folio corymbum decompositum laxum superante , floribus subternis ovatis muticis , foliolis calycinis subæqualibus.
7. *LUZULA nivea* Decand. — *L.* folio corymbum fasciculatum superante , floribus subternis elongatis muticis , foliolis calycinis valde inæqualibus.
8. *LUZULA campestris* Decand. — *L.* foliis subpilosis , spicis subumbellatis pedunculatis sessilibusque , capsulis obtusis calyce brevioribus.
 β . Alpina , calycibus obtusioribus.
9. *LUZULA spicata* Decand. — *L.* spica composita subtereti mutante , bracteis aristatis spica partiali longioribus , capsulis calycem subæquantibus.

10. *LUZULA lutea* Decand. — *L.* foliis vaginisque glaberrimis, spicis pedunculatis laxiusculis subcorymbosis, floribus muticis.

G. 48. TRIGLOCHIN.

Cal. 6-phyllus ; *foliola* 5 superiora cum 5 inferioribus alternantia, decidua. *Cor.* o. *Stam.* 6 , foliolis calycinis opposita. *Styli* nulli. *Stigmata* 5 , radiantia. *Caps.* basi dehiscentes.

1. TRIGLOCHIN *palustre* L. — *Tr.* capsulis trilocularibus linearibus basi attenuatis.

G. 49. TOFIELDIA.

Perigon. 6-phyllum , basi involu-
cratum , persistens : *involucrum*
subtriphyl-*lum*, minimum. *Stamina*
6. *Pistilla* 5. *Stigm.* subsessilia.
Caps. 5 , appressæ , polyspermæ.

1. TOFIELDIA *palustris* Huds. — *T.* foliis planis ensiformibus , cespitibus basi compresso-complanatis.

G. 50. SCHEUCHZERIA.

Perigon. basi nudum 6-phyllum ,
simplex , deciduum. *Stamina* 6. *Pis-*

Stilla 5, 4, 5, 6. *Stigm.* sessilia.
Caps. totidem, subinflatae, acuminatae, polyspermæ.

1. *SCHEUCHZERIA palustris* L. — Sch. foliis
canaliculatis setaceis, racemo erecto
paucifloro.



A P P E N D I X

ad pag. 160 voluminis prioris.

2. *SESLERIA elongata* Host. — S. panicula spicata subcylindrica, spiculis subtrifloris, valvulis aristatis corollas superantibus. N. (Gall. *Seslérie à long épi.*)

S. elongata Schrad. germ. 1. p. 127.

~~~~~

*Host Gram. austr.* 2. tab. 97.

RADICEM, auctore Cl. HOST, «substoloniferam» non vidi.

CULMI erecti vel adscendentes, teretes, foliosi, superne nudi, lævissimi, obiter striati, nodis paucis inferne instructi, infra nodos pilis appressis brevissimis pubescentes, pedales et cubitales.

FOLIA longissima, 2-3 lineas lata, erecta, plana, sed acute carinata, ad margines scaberrima et aculeato-serrulata, acutissima, pallide virentia vel fere glaucescentia. *Vaginæ* tubulosæ, nec nisi apice fissæ, pallidæ, læves glabræque. *Ligula* brevissima, truncata.

PANICULA spicata, densa, gracilis, subcylindrica, 2-4 uncias longa. *Rachis* angulosa, subscabra. *Pedunculi* adpressi, plerique brevissimi et uniflori, rarius 2-3ve lineas longi, 2- vel triflori, subsemi-verticillati. *Bractea* universalis, amplexicaulis, lata, obtusa, irregularis, carinata, scariosa.

SPICULÆ imbricatæ, undique rachin tegentes, oblongæ, versus basin incrassatæ, aristatæ, 2-4-floræ.

VALVULÆ scariosæ, albidæ, parum inæquales, ovato-acuminatæ, carinatæ, uninervic, nervo scabro in aristam scabriusculam, 1-2ve lineas longam, corollasque et earum aristas superantem producto.

COROLLÆ (aristis valvularum hand computatis) calycem fere æquantes, ex luteo, viridi et cœruleo variegatæ. *Axis* articulis brevissimis, teretibus, glabris.

GLUMA *exterior* ovato-oblonga, concava, quinquenervia, apice obtuso subtrifido, nervo dorsali scabro in aristam brevem producto: nervi laterales et nonnunquam intermediï in aristam adhuc breviorē excurrunt. GLUMA *interior* paulo brevior, angusta, ad angulos ciliata, apice eximie bifida. *Antheræ* lutæ, oblongæ. *Stigmata* elongata. (D.s.)

Planta in Helvetia nuper detecta in pratis udis circa *Michelsfelden* ab ornatiss. ZEHER reperta et ad Cl. SCHLEICHERUM missa est, qui eam nobiscum benigne communicavit. — Perennis. « Fl. Junio et Julio. » Host.





## I N D E X.

|                   |                        |            |                                   |         |
|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| <b>A</b>          | <b>CORUS</b> G. 45.    | p. 204     | <b>CAREX</b> <i>brunnascens</i> . | p. 111  |
| —                 | Calamus.               | 204        | — <i>canescens</i> .              | 90. 111 |
| <i>Anthericum</i> | <i>calyculatum</i> .   | —          | — <i>capillaris</i> .             | 177     |
|                   |                        | 254        | — <i>capillaris</i> .             | 174     |
| <b>CAREX</b> .    | G. 42.                 | 57         | — <i>capitata</i> .               | 70      |
| —                 | <i>acuta</i> .         | 123        | — <i>cespitosa</i> .              | 119     |
| —                 | <i>acuta</i> .         | 121. 181   | — <i>chordorhiza</i> .            | 82      |
| —                 | <i>acutiformis</i> .   | 182        | — <i>ciliata</i> .                | 133     |
| —                 | <i>æthiostachya</i> .  | 115        | — <i>clandestina</i> .            | 140     |
| —                 | <i>agastachys</i> .    | 154        | — <i>collina</i> .                | 129     |
| —                 | <i>alba</i> .          | 145        | — <i>compressa</i> .              | 121     |
| —                 | <i>alpestris</i> .     | 138 et 140 | — <i>conglobata</i> .             | 129     |
|                   | Obs. 162. 163          | —          | — <i>crassa</i> .                 | 184     |
|                   | Obs. et 166.           | —          | — <i>curta</i> .                  | 110     |
| —                 | <i>alpina</i> .        | 119        | — <i>curvula</i> .                | 113     |
| —                 | <i>ampullacea</i> .    | 185        | — <i>davalliana</i> .             | 71      |
| —                 | <i>androgyna</i> .     | 97         | — <i>decumbens</i> .              | 135     |
| —                 | <i>approximata</i> .   | 107        | — <i>diandra</i> .                | 88      |
|                   | et Obs.                | —          | — <i>digitata</i> .               | 142     |
| —                 | <i>arenaria</i> .      | 80 et 81   | — <i>dioica</i> .                 | 70      |
|                   | Obs.                   | —          | — <i>dioica</i> .                 | 71      |
| —                 | <i>argentea</i> .      | 140. 145   | — <i>distans</i> .                | 151     |
| —                 | <i>atrata</i> .        | 114        | — <i>distans</i> (Host gram. r.   |         |
| —                 | <i>Bellardi</i> .      | 55         | austr. tab. 77)                   |         |
| —                 | <i>bicolor</i> .       | 97         | — — — 149. 152                    |         |
| —                 | <i>brachystachys</i> . | 170        | — <i>disticha</i> .               | 80      |
| —                 | <i>bracteata</i> .     | 117        | — <i>diversiflora</i> .           | 139     |
| —                 | <i>brizoides</i> .     | 102        | — <i>divulsa</i> .                | 95      |

|                        |            |                          |           |
|------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| CAREX <i>drymeja</i> . | p. 173     | CAREX <i>hispidula</i> . | p. 136    |
| — <i>dubia</i> .       | 115        | — <i>incurva</i> .       | 85        |
| — <i>echinata</i> .    | 100        | — <i>inflata</i> .       | 187       |
| — <i>elata</i> .       | 121        | — <i>intermedia</i> .    | 80        |
| — <i>elongata</i> .    | 103        | — <i>intermedia</i> .    | 182       |
| — <i>elongata</i> .    | 111        | — <i>juncifolia</i> .    | 85        |
| — <i>emarcida</i> .    | 175 Obs.   | — <i>Lachenalii</i> .    | 108       |
| — <i>erecta</i> .      | 136. 166   | — <i>lasiocarpa</i> .    | 125       |
| — <i>ericetorum</i> .  | 133        | — <i>leporina</i> .      | 105       |
| — <i>ferruginea</i> .  | 166. 168   | — <i>leporina</i> .      | 107. Obs. |
| — <i>filiformis</i> .  | 125. 127   |                          | et 107    |
|                        | 131 et 135 | — <i>leucoglochin</i> .  | 74        |
| — <i>finbriata</i> .   | 137        | — <i>limosa</i> .        | 157       |
| — <i>firma</i> .       | 164        | — <i>limosa</i> .        | 181       |
| — <i>flacca</i> .      | 180        | — <i>linneana</i> .      | 70        |
| — <i>flava</i> .       | 147        | — <i>lobata</i> .        | 189       |
| — <i>foetida</i> .     | 83         | — <i>loliacea</i> .      | 93 et 95  |
| — <i>foliosa</i> .     | 191        | — <i>lucida</i> .        | 57 Obs.   |
| — <i>frigida</i> .     | 172        | — <i>maxima</i> .        | 154       |
| — <i>fuliginosa</i> .  | 172        | — <i>microglochin</i> .  | 76        |
| — <i>fulva</i> .       | 149        | — <i>Mielichhoferi</i> . | 168       |
| — <i>fusca</i> .       | 190        | — <i>montana</i> .       | 129       |
| — <i>Gebhardi</i> .    | 104 Not.   | — <i>mucronata</i> .     | 117       |
| — <i>Gesneri</i> .     | 140        | — <i>multiceps</i> .     | 103       |
| — <i>glaucia</i> .     | 180        | — <i>multiculmis</i> .   | 104       |
| — <i>globularis</i> .  | 133        | — <i>muricata</i> .      | 93        |
| — <i>gracilis</i> .    | 123        | — <i>muricata</i> .      | 100       |
| — <i>gynobasis</i> .   | 138        | — <i>myosuroides</i> .   | 55        |
| — <i>helvetica</i> .   | 152        | — <i>nigra</i> .         | 115       |
| — <i>hirsuta</i> .     | 188        | — <i>nigro-lutea</i> .   | 180       |
| — <i>hirta</i> .       | 178        | — <i>nitida</i> .        | 162       |
| — <i>hirta</i> .       | 125        | — <i>obesa</i> .         | 120       |
| — <i>hirtæformis</i> . | 126        | — <i>obtusangula</i> .   | 186       |

|                   |                 |                     |               |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| CAREX Oederi.     | p. 147          | CAREX saxatilis.    | p. 166        |
| — ornithopoda.    | 144             | — scariosa.         | 140. 146      |
| — ovalis.         | 105 et 107 Obs. | — Schreberi.        | 109           |
| — pallescens.     | 156             | — scopoliana.       | 168           |
| — paludosa.       | 182             | — Scopoli.          | 168           |
| — palustris.      | 182             | — sempervirens.     | 165           |
| — panicea.        | 159             | — spadicea.         | 168. 172      |
| — paniculata.     | 86              | — sphaerocarpa.     | 128           |
| — paniculata.     | 90              | — stellulata.       | 100           |
| — paradoxa.       | 90              | — stricta.          | 121           |
| — parviflora.     | 109 Obs.        | — strigosa.         | 164. 193      |
|                   | 117 Obs.        | — sylvatica.        | 173           |
| — patula.         | 147. 173        | — tenella.          | 109           |
| — pauciflora.     | 74              | — teretiuscula.     | 88            |
| — pedata.         | 144. 145 Obs.   | — tomentosa.        | 127           |
| — pendula.        | 154             | — trigona.          | 150           |
| — petræa.         | 78              | — tripartita.       | 107 Not.      |
| — pilosa.         | 160             | — valesiaca.        | 170           |
| — pilulifera.     | 135             | — varia.            | 166           |
| — præcox.         | 131             | — variegata.        | 166           |
| — præcox.         | 109             | — verna.            | 131. 162. 180 |
| — prostrata.      | 140             | — vesicaria.        | 187           |
| — Pseudo-cyperus. | 175             | — vesicaria.        | 173. 185.     |
| — pubescens.      | 129             |                     | 186           |
| — pulicaris.      | 73              | — uelliaca.         | 191           |
| — punctata.       | 152             | — umbrosa.          | 131           |
| — recurva.        | 180             | — uliginosa.        | 6 et 80       |
| — reflexa.        | 71              | — vulpina.          | 91            |
| — remota.         | 99              | Cladium germanicum. | 7             |
| — rigida.         | 190. 191 Obs.   | CYPERUS G.          | 40.           |
| — riparia.        | 184             | — flavescens.       | 48            |
| — rufa.           | 182             | — fuscus.           | 50            |
| — rupestris.      | 78 et 79 Not.   | — longus.           | 51            |

|                            |          |                              |             |
|----------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| CYPERUS Monti.             | p. 53    | JUNCUS conglomeratus.        |             |
| —— <i>serotinus</i> .      | 53       |                              | p. 211      |
| ELYNA G. 41.               | 55       | —— <i>effusus</i> .          | 210         |
| —— <i>spicata</i> .        | ib.      | —— <i>ericetorum</i> .       | 219         |
| ERIOPHORUM G. 39.          | 39       | —— <i>filiformis</i> .       | 212         |
| —— <i>alpinum</i> .        | 42       | —— <i>flavescens</i> .       | 239         |
| —— <i>angustifolium</i> .  | 46       | —— <i>fluitans</i> .         | 227 Obs.    |
| —— <i>capitatum</i> .      | 41       | —— <i>Forsteri</i> .         | 238         |
| —— <i>cespitosum</i> .     | 40       | —— <i>glaucus</i> .          | 208         |
| —— <i>latifolium</i> .     | 44. 48   | —— <i>glomeratus</i> .       | 211         |
| —— <i>polystachyum</i> .   | 44       | —— <i>inflexus</i> .         | 208         |
| —— <i>Scheuchzeri</i> .    | 41       | —— <i>Jacquini</i> .         | 233         |
| —— <i>vaginatum</i> .      | 39       | —— <i>Jacquini</i> .         | 214         |
| —— <i>vulgare</i> .        | 44       | —— <i>luteus</i> .           | 250         |
| FESTUCA acuminata.         | 287      | —— <i>luzulinus</i> .        | 237         |
| —— <i>Eskia</i> .          | ib.      | —— <i>luzuloides</i> .       | 244         |
| —— <i>flavescens</i> .     | ib.      | —— <i>maximus</i> .          | 241         |
| <i>Helonias borealis</i> . | 254      | —— <i>monanthos</i> .        | 216         |
| JUNCUS G. 46.              | 206      | —— <i>montanus</i> .         | 241. 242    |
| —— <i>acuminatus</i> .     | 214      | —— <i>mutabilis</i> .        | 226         |
| —— <i>acutiflorus</i> .    | 222      | —— <i>nemorosus</i> .        | 237. 247    |
| —— <i>adscendens</i> .     | 223      | —— <i>niveus</i> .           | 244. 245    |
| —— <i>affinis</i> .        | 224      | —— <i>obtusiflorus</i> .     | 221         |
| —— <i>albidus</i> .        | 244      | —— <i>pauciflorus</i> .      | 214         |
| —— <i>alpinus</i> .        | 223      | —— <i>pediformis</i> .       | 250 Obs.    |
| —— <i>aquaticus</i> .      | 222      | —— <i>pilosus</i> .          | 241. 244    |
| —— <i>arcticus</i> .       | 214      | —— <i>setaceus</i> .         | 226         |
| —— <i>articulatas</i> .    | 221. 222 | —— <i>spadiceus</i> .        | 242         |
| —— <i>atratus</i> .        | 233      | —— <i>spicatus</i> .         | 247. 248    |
| —— <i>bufonius</i> .       | 219      | —— <i>squarrosus</i> .       | 218         |
| —— <i>bulbosus</i> .       | 227      | —— <i>subverticillatus</i> . | 225         |
| —— <i>campestris</i> .     | 246 et   |                              | Obs. et 226 |
|                            | 250      | —— <i>sudeticus</i> .        | 247. 250    |
| —— <i>capitatus</i> .      | 219      |                              | Obs.        |

|                                |            |                      |                              |
|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <i>Juncus supinus.</i>         | p. 226     | <i>Poa violacea.</i> | p. 288 Not.                  |
| — <i>sylvaticus.</i>           | 221        | <i>Scheuchzeria.</i> | G. 50. 256                   |
| — <i>sylvaticus.</i>           | 241        | — — — — —            | <i>palustris</i> 256         |
| — <i>Tenageja.</i>             | 230        | — — — — —            | <i>Pseudo-aspho-</i>         |
| — <i>Tenageja.</i>             | 231 Obs.   |                      | <i>delus.</i> 254.           |
| — <i>trifidus.</i>             | 216        | <i>Schœnus</i>       | G. 37. 5                     |
| — <i>triglumis.</i>            | 232        | — — — — —            | <i>albus.</i> 9              |
| — <i>vernalis.</i>             | 236        | — — — — —            | <i>compressus.</i> 6         |
| — <i>verticillatus.</i>        | 226        | — — — — —            | <i>ferrugineus.</i> 14       |
| — <i>uliginosus.</i>           | 225 Obs.   | — — — — —            | <i>ferrugineus.</i> 219      |
| <i>Kobresia scirpina.</i>      | 55         | — — — — —            | <i>fuscus.</i> 11            |
| <i>Lolium rigidum.</i>         | 293 Not.   |                      |                              |
| <i>Luzula</i>                  | G. 47. 235 | — — — — —            | <i>Mariscus.</i> 7           |
| — <i>albida.</i>               | 243        | — — — — —            | <i>nigricans.</i> 12         |
| — <i>campestris.</i>           | 245        | <i>Scirpus</i>       | G. 38. 15                    |
| — <i>flavescens.</i>           | 239        | — — — — —            | <i>acicularis.</i> 17        |
| — <i>Forsteri.</i>             | 238        | — — — — —            | <i>annuus.</i> 34            |
| — <i>lutea.</i>                | 250        | — — — — —            | <i>australis.</i> 26 Not.    |
| — <i>maxima.</i>               | 241        | — — — — —            | <i>Bæothryum.</i> 19         |
| — <i>nivea.</i>                | 245        | — — — — —            | <i>campestris.</i> 19, 20 et |
| — <i>pilosa.</i>               | 236        |                      | 21 Obs.                      |
| — <i>spadicea.</i>             | 242        | — — — — —            | <i>caricinus.</i> 6          |
| — <i>spicata.</i>              | 248        | — — — — —            | <i>caricis.</i> 6            |
| — <i>sylvatica.</i>            | 240        | — — — — —            | <i>cespitosus.</i> 18        |
| — <i>vernalis.</i>             | 237        | — — — — —            | <i>dichotomus.</i> 34        |
| <i>Narthecium calyculatum.</i> |            | — — — — —            | <i>Halleri.</i> 20           |
|                                | 254        | — — — — —            | <i>Holoschoenus.</i> 26      |
| — <i>iridifolium.</i>          | 254        | — — — — —            | <i>laeustris.</i> 24         |
| <i>Phleum commutatum.</i>      | 264        | — — — — —            | <i>maritimus.</i> 32         |
|                                | Not.       | — — — — —            | <i>mucronatus.</i> 37        |
| — <i>Gerardi.</i>              | 264 Not.   | — — — — —            | <i>mucronatus.</i> 36        |
| <i>Poa badensis.</i>           | 276 Not.   | — — — — —            | <i>multicaulis.</i> 25 Not.  |
| — <i>collina.</i>              | 276 Not.   | — — — — —            | <i>ovatus.</i> 23            |
| — <i>hybrida.</i>              | 282 Not.   | — — — — —            | <i>palustris.</i> 21         |

|                              |          |                            |               |
|------------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| SCIRPUS <i>pauciflorus</i> . | p. 20.   | STIPA <i>pennata</i> .     | 265 Not.      |
| ————                         | 23 Obs.  | TOFIELDIA G. 49.           | 254           |
| ———— <i>romanus</i> .        | 26 Not.  | ———— <i>palustris</i> .    | 254           |
| ———— <i>setaceus</i> .       | 28       | TRIGLOCHIN G. 48.          | 252           |
| ———— <i>supinus</i> .        | 29       | ———— <i>palustre</i> .     | 252           |
| ———— <i>sylvaticus</i> .     | 31       | TYPHA G. 43.               | 194           |
| ———— <i>triqueter</i> .      | 35       | ———— <i>angustifolia</i> . | 196           |
| SESLERIA <i>elongata</i> .   | 276 Not. | ———— <i>latifolia</i> .    | 194           |
|                              | et 320   |                            |               |
| SPARGANIUM G. 44.            | 199      | ———— <i>media</i> .        | 197 et 198    |
| ———— <i>erectum</i> .        | 200. 201 |                            | Obs.          |
| ———— <i>natans</i> .         | 202      | ———— <i>minima</i> .       | 197           |
| ———— <i>ramosum</i> .        | 199      | ———— <i>minor</i> .        | 197. 198 Obs. |
| ———— <i>simplex</i> .        | 201      |                            |               |

*Finis.*

---

## C O R R I G E N D A

ad partem priorem.

P. VI. l. 3. 5. a calce : Hujusque l. Hucusque

P. VII. l. 5-6 diagnosum l. diagnose

P. XIV. l. 13. fractus l. faretus

P. 15. l. 3. a calce : rugosis l. rugosis

P. 24. l. 17. 100 l. 160.

P. 98. l. 19. æquantæ l. æquante

P. 147. l. 15. subtriflorus l. subtriflorus.

P. 200. l. *ultima* : nostra l. nostra.

P. 229. l. 18. plana l. plane.

P. 284. l. 11. gluberrimas l. glaberrimas.

Ad partem posteriorem.

P. 103. l. 21. *Treso* l. *Tresa*.

P. 143. l. 6. viridia l. virides

P. 163. l. 5. a calce : tolerendum l. tolerandum

P. 188. l. 7. a calce : *vesicariam* ad veram *vesicariam*  
l. ad veram *vesicariam*

P. 225. l. 12. a calce : innudatis l. inundatis.





